

XI. 281

7.13





ИЗВѢСТІЯ

ИМПЕРАТОРСКАГО

Ботаническаго Сада Петра Великаго.

Томъ XIII.

Съ 5 таблицами и 76 рисунками и 1 картой въ текстѣ.

Изданъ подъ редакціей

А. А. Финнера-фонъ-Вальдгейма и Г. А. Надсона.

BULLETIN

DU JARDIN IMPÉRIAL BOTANIQUE


DE PIERRE LE GRAND.

Tome XIII.

Avec 5 planches et 76 figures et 1 carte dans le texte.

Publié sous la rédaction de

A. A. Fischer de Waldheim et G. A. Nadson.



LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1912. [1413]

This "1912" is evidently a typographical error; each number, even 512, has "1913" or lower, and contains abundant internal evidence that it could not have been printed in 1912. — H.B.

1287
1288

Печатано по распоряженію Императорскаго Ботаническаго Сада Петра Великаго.

Тип. К. Матисена въ Юрьевѣ, Лифл.

Содержаніе XIII-го тома „Извѣстій Императорскаго Ботаническаго Сада Петра Великаго“ 1913 года.

Выпускъ 1-й и 2-й.

Съ 61 рисункомъ въ текстъ и 4 таблицами.

Къ біологіи сибирскаго кедра. <i>Р. Р. Поле</i>	1
О клубенькахъ на корняхъ <i>Tribulus terrestris</i> L. <i>Б. Л. Псаченко</i>	23
О новыхъ дрожжевыхъ грибахъ: <i>Nadsonia</i> (<i>Guilliermondia</i>) <i>elongata</i> и <i>Debaryomyces tyrosola</i> . <i>А. Г. Копокотин</i>	32
Плоскость для собранія донной микро-флоры и фауны. <i>Б. В. Перифильева</i> .	47
<i>Dianthus barbatus</i> L. \times <i>D. superbus</i> L. = <i>Dianthus Courtoisii</i> Rehb. въ Костромской губерніи. <i>К. Косинский</i>	52
Сообщенія изъ Императорскаго Ботаническаго Сада. <i>А. А. Фишера-фонъ-Вальштейна</i>	55

Выпускъ 3-й.

Съ 14 рисунками въ текстъ и 1 таблицей.

Новый паразитъ <i>Gloeosporium polystigmaticolum</i> на <i>Polystigma rubrum</i> . <i>А. Бондарцева</i>	59
Десмидіевыя водоросли, собранныя лѣтомъ 1912 года въ Холмскомъ уѣздѣ Псковской губерніи. <i>А. И. Лобика</i>	65
Сообщенія изъ Императорскаго Ботаническаго Сада. <i>А. А. Фишера-фонъ-Вальштейна</i>	87

Выпускъ 4-й.

Два новыхъ вида <i>Buddleia</i> изъ Гербарія Императорскаго С.-Петербургскаго Ботаническаго Сада. <i>Ф. Кренцлина</i>	89
Критическія замѣтки относительно <i>Bomarea denticulata</i> Herb. <i>Ф. Кренцлина</i> .	95
„ <i>Onobrychis supina</i> “ въ Бессарабіи. <i>Б. А. Федченко</i>	97
Изслѣдованія надъ пспареніемъ кактусовъ. <i>И. Л. Бедельяни</i>	99
О сѣрныхъ микроорганизмахъ Гапсальскаго залива. <i>Г. А. Падсона</i> . .	106
Сообщенія изъ Императорскаго Ботаническаго Сада. <i>А. А. Фишера-фонъ-Вальштейна</i>	113

Выпускъ 5-й и 6-й.

Съ 1 рисункомъ въ текстъ и 1 картой.

Къ флорѣ Костромской губерніи. <i>К. К. Косинскаго</i>	119
Къ изученію лишайниковыхъ формаций и лишайниковъ Восточнаго Болотнаго района Псковской губерніи. <i>В. П. Савича</i>	132

Sommaire du tome XIII du „Bulletin du Jardin Impérial botanique de Pierre le Grand“, 1913.

Livraison 1—2.

Avec 61 figures dans le texte et 4 planches.

Zur Biologie der sibirischen Arve (<i>Pinus sibirica</i> Mayr.). <i>Richard Pohle</i> . .	20
Ueber die Wurzelknöllchen bei <i>Tribulus terrestris</i> L. <i>B. L. Issatschenko</i> . .	30
Ueber die neuen Hefepilze mit heterogamer Kopulation — <i>Nadsonia</i> (<i>Guillermundia</i>) <i>elongata</i> und <i>Debaryomyces tyrocola</i> . <i>A. G. Konokotina</i> . .	45
Ein Schlamm-sauger zur Gewinnung der Boden-Mikro-Flora und Fauna. <i>B. Perfilov</i>	50
<i>Dianthus barbatus</i> L. \times <i>D. superbus</i> L. = <i>Dianthus Courtoisii</i> Rehb. au gouvernement de Kostroma. <i>C. Kossinsky</i>	54
Communications du Jardin Impérial botanique. <i>A. A. Fischer de Waldheim</i>	56

Livraison 3.

Avec 14 figures dans le texte et 1 planche.

Ein neuer Parasit <i>Gloeosporium polystigmaticolum</i> auf <i>Polystigma rubrum</i> . <i>A. Bondarzew</i>	63
Desmidiaceae im Gouv. Pskov, Kreis Cholm im Jahre 1912 gesammelt. <i>A. J. Lohik</i>	86
Communications du Jardin Impérial botanique. <i>A. A. Fischer de Waldheim</i> . .	88

Livraison 4.

Zwei neue <i>Buddleia</i> -Arten aus dem Herbarium des St.-Petersburger Kaiserl. Botanischen Gartens. <i>Fr. Kränzlin</i>	92
Kritische Bemerkungen über <i>Bomarea denticulata</i> Herb. <i>Fr. Kränzlin</i> . . .	96
„ <i>Onobrychis supina</i> “ in Bessarabien. <i>B. A. Fedtschenko</i>	98
Untersuchungen über die Transpiration der Kakteen. <i>J. L. Bedelian</i>	104
Ueber Schwefelmikroorganismen des Hapsaler Meerbusens. <i>G. A. Nadson</i> .	112
Communications du Jardin Impérial botanique. <i>A. A. Fischer de Waldheim</i>	117

Livraison 5—6.

Avec 1 figure dans le texte et 1 carte.

Note sur la flore du gouvernement de Kostroma. <i>C. Kossinsky</i>	130
Zum Studium der Flechten und der Flechtenformationen im östl. Sumpfbereich des Gouv. Pskow. <i>V. P. Savicz</i>	147

ИЗВѢСТІЯ

ИМПЕРАТОРСКАГО

С.-Петербургскаго Ботаническаго Сада.

Томъ XIII, выпускъ 1—2.
Съ 61 рисункомъ и 4 таблицами.

Содержаніе.

Къ биологін сибирскаго кедра. *Р. Р. Поле.*
О клубенькахъ на корняхъ *Tribulus terrestris* L. *Б. Л. Исаченко.*
О новыхъ дрожжевыхъ грибахъ: *Nadsonia* (Guilliermondia) *elongata* и *Debaryomyces tyrocola*. *А. Г. Конокоотиной.*
Плоскошь для собиранія донной микро-флоры и фауны. *Б. В. Перфильева.*
Dianthus barbatus L. \times *D. superbus* L. = *Dianthus Courtoisii* Rehb. въ Костромской губерніи. *К. Косинскаго.*
Сообщенія изъ Императорскаго Ботаническаго Сада. *А. А. Фишера-фонъ-Вальдгейма.*

BULLETIN

DU JARDIN IMPÉRIAL BOTANIQUE

de ST.-PÉTERSBOURG.

Tome XIII, livraison 1—2.
Avec 61 figures et 4 planches.

Sommaire.

Zur Biologie der sibirischen Arve (*Pinus sibirica* Mayr.). *Richard Pohle.*
Über die Wurzelknöllchen bei *Tribulus terrestris* L. *B. L. Issatschenko.*
Über die neuen Hefepilze mit heterogamer Kopulation — *Nadsonia* (Guilliermondia) *elongata* und *Debaryomyces tyrocola*. *A. G. Konokotina.*
Ein Schlammseiger zur Gewinnung der Boden-Mikro-Flora und Fauna. *B. Perfiliev.*
Dianthus barbatus L. \times *D. superbus* L. = *Dianthus Courtoisii* Rehb. au gouvernement de Kostroma. *C. Kossinsky.*
Communications du Jardin Impérial botanique. *A. A. Fischer de Waldheim.*

Р. Поле.

Къ біологіи сибирскаго кедра. *)

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

Съ кедромъ познакомился я лѣтомъ 1905 и 1907 годовъ въ предѣлахъ Печорскаго края Архангельской и Вологодской губ., будучи командированъ Лѣснымъ Департаментомъ для изслѣдованія типовъ насажденій сѣверныхъ лѣсовъ. Въ этихъ губерніяхъ кедръ встрѣчается въ восточной части Вычегодскаго и въ Печорскомъ краѣ. Западной границей его служитъ Тиманскій кряжъ, довольно низкая преграда. Замѣтно рѣдѣя къ сѣверу, онъ все таки тянется вдоль предгорій Урала до средней Усы. Что касается до самаго Урала, то кедръ растетъ по моимъ наблюденіямъ на склонахъ хребта Тельпоса, достигая верхней границы горнаго лѣса.¹⁾ Своего южнаго предѣла въ Европѣ дерево достигаетъ въ Пермской губ.

Вологжане охотно сажаютъ кедръ и въ западной части губерніи, гдѣ это красивое дерево своею темною зеленью и густою кроною особенно около бѣлыхъ стѣнъ церквей служитъ прекраснымъ и своеобразнымъ украшеніемъ ландшафта. Въ Сольвыгечодскомъ уѣздѣ имѣется даже цѣлая роща. Тутъ монахи Коря-

*) Докладъ, читанный въ Лѣсномъ Обществѣ 19-го января 1913 года.

1) На сѣверозападномъ склонѣ горный лѣсъ доходитъ до 460 метр. абсол. высоты. Здѣсь растутъ *Abies sibirica* Ledeb., *Picea obovata* Ledeb., *Pinus sibirica* Mayr., *Betula tortuosa* Ledeb. съ подлѣскомъ изъ *Alnus fruticosa* Rupr., *Pirus aucuparia* Gaertn., *Lonicera coerulea* L., *Prunus padus* L. v. *borealis* Schübeler. Въ почвенномъ покровѣ преобладаютъ высокія травы родъ *Aconitum excelsum* Rehb., *Archangelica officinalis* Hoffm., *Paeonia anomala* CAM., *Thalictrum kemense* Fr., *Actaea rubra* Bigel. Поясъ горнаго лѣса кончается сплошною стѣною, переходя внезапно въ субальпійскій лиственничный лѣсъ, гдѣ кедръ попадается единично въ видѣ мелкихъ экземпляровъ. На хребтѣ Саблѣ я его не видѣлъ. По Коржинскому кедръ на Пермскомъ Уралѣ поднимается болѣе высоко, чѣмъ остальные деревья. См. Tentamen Florae Rossiae orientalis. Зап. Имп. Акад. Наукъ. VIII, т. VII, № 1, 1898, стр. 493.

жемскаго монастыря развели кедръ для того, чтобы продавать орѣхи и отъ этой продажи получаютъ значительный доходъ.¹⁾

Извѣстный своимъ культурами чужестранныхъ деревьевъ баварскій лѣсоводъ Майръ выдѣляетъ наше дерево въ особый видъ, *Pinus sibirica* Mayr.²⁾ Хотя альпійскій и сибирскій кедръ два брата изъ одной семьи, но это все таки не близнецы. Совершенно различнымъ климатическимъ и почвеннымъ условіямъ соответствуетъ у сибирскаго дерева рядъ біологическихъ и морфологическихъ отличительныхъ признаковъ. Наиболѣе важными являются: высокій стройный ростъ³⁾ и болѣе тонкая скорлупа стѣмни. Последнее обстоятельство, какъ мы увидимъ впоследствии, для нашего кедръ имѣетъ особенное значеніе.

При какихъ почвенныхъ условіяхъ произрастаетъ сибирскій кедръ?

Въ сосновыхъ лишаишниковыхъ борахъ, которые я видѣлъ близъ Пермской границы по теченію рѣки Палью, притока Илыча, взрослыхъ кедровъ нѣтъ. Объясненіе для этого явленія дамъ послѣ. Но кедровый подростъ имѣется повсюду. Молоднякъ отличается очень медленнымъ ростомъ. По измѣреніямъ В. В. Гумана, кедръ вышиною въ полметра было 20 лѣтъ. Экземпляры отъ 30—50 лѣтъ достигаютъ только высоты одного или, самое большее, полутора метра. Болѣе крупныхъ размѣровъ я не нашелъ. Деревья эти оказывались пораженными грибомъ *Lophodermium Pinastri* (Schrad.) Cev.⁴⁾; тамъ были и желтые, совсѣмъ мертвые экземпляры. Между прочимъ, этотъ грибокъ попался

1) Устное сообщеніе доктора А. А. Сняtkова, знатока флоры Вологодской губ.; по его словамъ около рощъ кедръ распространяется самосѣвомъ; ежегодный доходъ опредѣляется приблизительно въ 300 рубл.

2) Въ „Naturwissenschaftliche und forstliche Studien im nordwestlichen Russland“. Allgem. Forst- und Jagdzeitung. 76. Jahrg. p. 81—91, 117—131, 156—160. Здѣсь имѣется только голое названіе. Главные отличительные признаки приводятся Майромъ въ работѣ: *Fremdländische Wald- und Parkbäume für Europa*. Berlin 1906, p. 388. Синонимы: *Pinus cembra* L var. *sibirica* Loudon Arbor. et Frut. Brit. IV, 2274 (1838). — *P. cembra* L. var. *sibirica* Rupr. in *Flora Boreali-Uralensis* (Der nördliche Ural und das Küstengebirge Paechoi. St. Petersburg 1856.) p. 43. — *P. cembra* L. subsp. *typica* Rikli var. *subaretica* Rikli in: *Die Arve in der Schweiz*. Neue Denkschr. Schweiz. naturf. Gesellsch. XLIV, 1909, p. 382. Замѣчу кетати, что тщательное изученіе отличительныхъ признаковъ альпійскаго и сибирскаго кедровъ на основаніи гербарнаго и живого матеріала было бы благодарной темою для отдѣльной работы.

3) По даннымъ Рикли альпійскій кедръ въ общемъ не превышаетъ высоты 20 метровъ (= 30 аршинъ).

4) По любезному опредѣленію В. А. Траншеля. Въ одномъ мѣстѣ на Палью я нашелъ еще другой грибокъ на мелкомъ кедрѣ: *Dasysecypha fuscousanguinea* Rehm. var. *calyciformis* (Willd.) Rehm.

нерѣдко и въ другихъ мѣстахъ, напр. на Шугорѣ, правомъ притока Печоры.

На мало питательномъ субстратѣ сфагновыхъ торфяниковъ кедръ, повидимому, не растеть; встрѣчается онъ только по краямъ такихъ болотъ, примыкающимъ, напримѣръ, къ сосновымъ борамъ, опять-таки только въ видѣ мелкихъ экземпляровъ. То же самое можно наблюдать у елей; имъ, вѣроятно, неблагоприятны особенныя физическія свойства сфагновыхъ торфяниковъ.

Лучше всего кедръ себя чувствуетъ на свѣжихъ почвахъ, которыя приурочены въ Печорскомъ краѣ исключительно или къ склонамъ холмовъ и береговъ рѣкъ, или-же къ поймамъ. Чѣмъ богаче почва минеральными веществами, тѣмъ лучше ростъ. Близъ села Троицко-Печорскаго склонъ холма на свѣжей суглинистой почвѣ покрытъ великолѣпнымъ стройнымъ елово-пихтово-кедровымъ насажденіемъ средняго возраста; ели и пихты здѣсь достигаютъ 40 аршинъ вышины; кедръ уступаетъ имъ въ ростъ, но они нѣсколько моложе. Это было на югѣ Печорскаго края и лучшее насажденіе въ томъ родѣ, что я видѣлъ. Конечно, оптимума своего развитія въ Европейской Россіи наше дерево должно достигать въ предѣлахъ Пермской губ. По Н. Г. Батуеву ¹⁾ кедръ въ насажденіяхъ Колвинскаго лѣсничества на лучшихъ почвахъ доходитъ въ своихъ размѣрахъ до 50 аршинъ, въ типѣ „оль“, сырыхъ низинахъ, достигаетъ 35 аршинъ. Въ Печорскомъ краѣ, однако, средняя высота его въ наилучшихъ условіяхъ держится около 40 аршинъ, ²⁾ не больше. При этомъ имѣются въ виду склоны береговъ Печоры и ея притока Щугора, гдѣ почва бываетъ или суглинистая или же является продуктомъ вывѣтриванія известняковъ и болѣе или менѣе известковистыхъ песчаниковъ. Почвы пойменныхъ участковъ то бываютъ илисто-песчаныя, то, у рѣкъ Запечорья, съ очень значительной примѣсью галечника; кедръ здѣсь уже не достигаетъ тѣхъ размѣровъ, что по склонамъ; но это зависитъ очевидно отъ менѣе благоприятныхъ климатическихъ условій рѣчныхъ долинъ.

Главный запасъ кедръ, однако, имѣется по междурѣчнымъ пространствамъ Запечорья. Здѣсь параллельно съ Ураломъ тянется рядъ невысокихъ кряжей, промежутки между которыми заняты болотистыми равнинами. Почвы, обыкновенно тяжелые суглинки, сырые и холодные, безъ дренажа и вентиляціи, покрытые толстымъ слоемъ сырого перегноя, остатками *Polytrichum com-*

1) Краткій очеркъ Колвинскаго лѣсничества (Пермской губ.). Лѣсной Журналъ 1902, вып. 3, стр. 487—534.

2) См. Неврли, Н. Лѣса сѣвера Европейской Россіи. Изъ кабинета Общаго Лѣсоводства. Изв. Имп. Лѣсного Института 1912 г.

mine L., разныхъ видовъ *Dicranum* и *Sphagnum*. Здѣсь обитаютъ насажденія рѣдкія, низкорослыя, изъ ели, пихты, кедра и березы. ¹⁾ Вотъ и тутъ кедръ не только не уступаетъ въ ростѣ, какъ это бываетъ обыкновенно на свѣжихъ почвахъ, другимъ хвойнымъ, но даже почти всегда превышаетъ ихъ, хотя очень часто пораженъ сердцевинною гнилью. Здѣсь онъ является единственнымъ деревомъ, представляющихъ нѣкоторую цѣнность, между тѣмъ какъ суковатая ель даже не годится на древесную массу. То же самое сообщаетъ Н. Глушковъ ²⁾ въ своей работѣ о Пермскомъ Нераздѣльномъ Лѣснѣ; онъ говоритъ: „кедръ среди елей и пихты рѣзко выдѣляется своимъ роскошнымъ ростомъ“.

Подводя итоги сказаннаго, мы видимъ, что сибирскій кедръ требуетъ отъ почвы извѣстнаго количества влаги, избытокъ которой ни въ коемъ случаѣ не можетъ служить препятствіемъ для его существованія; напротивъ онъ его переноситъ лучше другихъ хвойныхъ. За то онъ совсѣмъ не переноситъ сухости субстрата; поэтому въ лишайниковомъ бору не выходитъ изъ состоянія жалкого подроста. Прочтя литературу о кедрѣ, я не нашелъ ни одного намека на то, чтобъ онъ встрѣчался въ сухомъ бору въ видѣ взрослого дерева. Подтверждается такой взглядъ и наблюденіями садовода Лѣсного Института, Э. Л. Вольфа, произведенными въ паркѣ Лѣсного Института. По его словамъ сибирскіе кедръ тамъ въ засушливое лѣто замѣтно страдаютъ отъ недостатка почвенной влаги. ³⁾

Но бываютъ все таки случаи, что кедръ растетъ на боровой почвѣ, достигая болѣе крупныхъ размѣровъ. Таковыя наблюдались мною на Печорѣ, далеко отъ села Усть-Щугора. Здѣсь попадаются едивичные экземпляры кедръ и ели на краю боровъ, но только непосредственно у самой рѣчки, на склонѣ старой рѣчной террасы, гдѣ земля отъ частыхъ вечернихъ и утреннихъ тумановъ получаетъ все же нѣкоторое количество влаги. При такихъ условіяхъ измѣняется также почвенный покровъ; вмѣсто лишайниковъ встрѣчаются вѣтвистые мхи (разные виды *Hypnum*), но только въ предѣлахъ узкой береговой зоны.

Можно, однако, возразить, что причину отсутствія кедръ въ сухихъ борахъ слѣдовало бы искать въ бѣдности субстрата минеральными веществами. Для опроверженія такого взгляда приведу слѣдующій примѣръ: въ близкомъ отъ Урала разстояніи тянется параллельно хребту Тельпосу горный кряжъ Овинъ

1) Таблица II.

2) Лѣсной Журналъ 1906, вып. 7, стр. 695.

3) См. также нижепривед. цитаты изъ работъ Сонин (стр. 8) и Холодковского (стр. 8).

Парма, отдѣльныя вершины котораго поднимаются надъ поясомъ горныхъ лѣсовъ. На сѣверномъ Уралѣ, гдѣ среди горныхъ породъ господствуютъ динамометаморфическіе сланцы, вездѣ за поясомъ горнаго лѣса идетъ зона субальпійскихъ лиственничныхъ лѣсовъ, съ богатымъ почвеннымъ покровомъ изъ довольно крупныхъ широколиственныхъ травъ и злаковъ. Овинъ Парма, напротивъ, слагается изъ весьма бѣднаго кварцита, поэтому и отсутствуетъ лиственница съ ея спутниками-травами, между тѣмъ какъ кедръ имѣется повсюду и въ почвенномъ покровѣ преобладаютъ растенія вересковые; на камняхъ растетъ крайне характерный лишайникъ — *Parietina centrifuga* (L.) Ach.¹⁾

Данныхъ, касающихся почвенныхъ условий, при которыхъ произрастаетъ кедръ, въ литературѣ почти совсѣмъ нѣтъ. Одинъ очень короткій намекъ имѣется въ работѣ Н. К. Высоцкаго,²⁾ который освѣщаетъ „рѣзкое разграниченіе лѣсныхъ формаций въ зависимости отъ смѣны горныхъ породъ“ въ горахъ Пермскаго Урала. Среди лѣсныхъ деревьевъ упоминается и о кедрѣ. Но, къ сожалѣнію, свѣдѣнія о лѣсахъ, топографіи ихъ и влажности почвы до того отрывочны и не полны, что обсудить поднятый вопросъ о зависимости лѣсныхъ формаций отъ почвы какъ продуктъ вывѣтриванія горныхъ породъ, не представляется возможнымъ.

Въ связи съ тѣмъ, что было сказано объ условіяхъ произрастанія кедра, можно еще освѣтить вопросъ о кедровникахъ, о чистыхъ кедровыхъ насажденіяхъ. Хотя я самъ когда-то писалъ, что въ Пермской губ. имѣются прекрасныя чистыя насажденія³⁾, но, познакомившись лучше съ надлежащей литературой, я ду-

Поправка.

Въ статьѣ „Къ біологіи сибирскаго кедра“ (Извѣстія ИМПЕРАТОРСКАГО С-Петербургскаго Ботаническаго Сада, т. XIII, вып. 1—2, стр. 5), вмѣсто *Parietina centrifuga* (L.) Ach., слѣдуетъ читать *Parmelia centrifuga* (L.) Ach.

пермской губерніи, въ сѣверныхъ ихъ частяхъ. Лѣсной журналъ 1912, вып. 4—5, стр. 502—512.

5) Кедровники въ Пермской губ. Лѣсопромышленный Вѣстникъ 1930, № 14.

мине L., разныхъ видовъ Dicranum и Sphagnum. Здѣсь обитаютъ насажденія рѣдкія, низкорослыя, изъ ели, пихты, кедра и березы. ¹⁾ Вотъ и тутъ кедръ не только не уступаетъ въ ростъ, какъ это бываетъ обыкновенно на свѣжихъ почвахъ, другимъ хвойнымъ, но даже почти всегда превышаетъ ихъ, хотя очень часто пораженъ сердцевинною гнилью. Здѣсь онъ является единственнымъ деревомъ, представляющихъ нѣкоторую цѣнность, между тѣмъ какъ суковатыя ели даже не годятся на древесную массу. То же самое сообщаетъ Н. Глушковъ ²⁾ въ своей работѣ о Пермскомъ Нераздѣльномъ Имѣніи; онъ говоритъ: „кедръ среди елей и пихты рѣзко выдѣляется своимъ роскошнымъ ростомъ“.

Подводя итоги сказаннаго, мы видимъ, что сибирскій кедръ требуетъ отъ почвы извѣстнаго количества влаги, избытокъ которой ни въ какомъ случаѣ не можетъ служить препятствіемъ для его существованія; напротивъ онъ его переноситъ лучше другихъ хвойныхъ. За то онъ совсѣмъ не переноситъ сухости субстрата; поэтому въ лишайниковомъ бору не выходитъ изъ состоянія жалкого подроста. Прочтя литературу о кедрѣ, я не нашелъ ни одного намека на то, чтобъ онъ встрѣчался въ сухомъ бору въ видѣ взрослого дерева. Подтверждается такой взглядъ и наблюденіями садовода Лѣсного Института, Э. Л. Вольфа, произведенными въ паркѣ Лѣсного Института. По его словамъ сибирскіе кедръ тамъ въ засушливое лѣто замѣтно страдаютъ отъ недостатка почвенной влаги. ³⁾

Но бываютъ все таки случаи, что кедръ растетъ на боровой

— разнотравъ. Такие наблюде-

1) Таблицы ...

2) Лѣсной Журналъ 1906, вып. 7, стр. 695.

3) См. также нижепривед. цитаты изъ работъ Сонни (стр. 8) и Холодковского (стр. 8).

Парма, отдѣльныя вершины котораго поднимаются надъ поясомъ горныхъ лѣсовъ. На сѣверномъ Уралѣ, гдѣ среди горныхъ породъ господствуютъ динамометаморфическіе сланцы, вездѣ за поясомъ горнаго лѣса идетъ зона субальпійскихъ лиственничныхъ лѣсовъ, съ богатымъ почвеннымъ покровомъ изъ довольно крупныхъ широколиственныхъ травъ и злаковъ. Овинъ Парма, напротивъ, слагается изъ весьма бѣднаго кварцита, поэтому и отсутствуетъ лиственница съ ея спутниками-травами, между тѣмъ какъ кедръ имѣется повсюду и въ почвенномъ покровѣ преобладаютъ растенія вересковыя; на камняхъ растетъ крайне характерный лишайникъ — *Parietina centrifuga* (L.) Ach.¹⁾

Данныхъ, касающихся почвенныхъ условій, при которыхъ произрастаетъ кедръ, въ литературѣ почти совсѣмъ нѣтъ. Одинъ очень короткій намекъ имѣется въ работѣ Н. К. Высоцкаго,²⁾ который освѣщаетъ „рѣзкое разграниченіе лѣсныхъ формаций въ зависимости отъ смѣны горныхъ породъ“ въ горахъ Пермскаго Урала. Среди лѣсныхъ деревьевъ упоминается и о кедрѣ. Но, къ сожалѣнію, свѣдѣнія о лѣсахъ, топографіи ихъ и влажности почвы до того отрывочны и не полны, что обсудить поднятый вопросъ о зависимости лѣсныхъ формаций отъ почвы какъ продуктъ вывѣтриванія горныхъ породъ, не представляется возможнымъ.

Въ связи съ тѣмъ, что было сказано объ условіяхъ произрастанія кедровыхъ насажденій, можно еще освѣтить вопросъ о кедровникахъ, о чистыхъ кедровыхъ насажденіяхъ. Хотя я самъ когда-то писалъ, что въ Пермской губ. имѣются прекрасныя чистыя насажденія³⁾, но, познакомившись лучше съ надлежащей литературою, я думаю, что въ Европейской Россіи и, даже въ западной Сибири кедровники или отсутствуютъ или-же они составляютъ большую рѣдкость. Гдѣ они есть, тамъ они созданы человекомъ, а не самой природою. Н. П. Гуторовичъ⁴⁾ говоритъ, что они рѣдко встрѣчаются на высокихъ мѣстахъ. П. М. Холодковскій⁵⁾, напротивъ, пишетъ, что „Верхотурскій уѣздъ изобилуетъ“ чистыми

1) По любезному опредѣленію А. А. Еленкина; по его словамъ *P. centrifuga* обитаетъ на гранитахъ и гнейсахъ, однимъ словомъ, на твердыхъ породахъ съ незначительнымъ содержаніемъ извести; на известнякахъ онъ не встрѣчается.

2) Нѣсколько гео-ботаническихъ наблюденій на Сѣв. Уралѣ. Почвовѣдѣніе VI, 1904, стр. 153—155.

3) О лѣсахъ сѣверной Россіи. Предварительный отчетъ объ изслѣдованіи типовъ насажденій въ предѣлахъ Архангельской и Вологодской губ. лѣтомъ 1904 и 1905 гг. Труды Опытныхъ Лѣсничествъ, 1906 г.

4) Краткое описаніе типовъ насажденій, встрѣчаемыхъ въ Вятской и Пермской губерніяхъ, въ сѣверныхъ ихъ частяхъ. Лѣсной Журналъ 1912, вып. 4—5, стр. 502—512.

5) Кедровники въ Пермской губ. Лѣсопромышленный Вѣстникъ 1900, № 14.

насажденіями. По Б. Н. Городкову¹⁾, въ Кондинскомъ краѣ (Тобольской губ.) кедръ обитаетъ главнымъ образомъ въ урманнахъ, т. е. въ тѣхъ-же сырыхъ лѣсахъ изъ ели, пихты и кедра, которыя я описалъ изъ Печорскаго края. Имѣющіеся тамъ кедровники парочно созданы человѣкомъ путемъ вырубанія другихъ урманныхъ породъ ради орѣховаго промысла. Другой исследователь этихъ странъ Соммье²⁾ сообщаетъ, что кедръ — обыкновенное дерево въ лѣсахъ междурѣчныхъ пространствъ, но никогда не образуетъ чистыхъ насажденій. Кедровники, какъ естественное образованіе самой природы, такъ рѣдки вѣроятно потому, что 1) кедръ тутъ оптимума³⁾ своего развитія еще не достигаетъ, 2) возобновленіе его происходитъ далеко не такъ просто, есть дѣло болѣе сложное, чѣмъ у другихъ нашихъ хвойныхъ породъ.

Но прежде, чѣмъ перейти къ вопросу о возобновленіи, посмотримъ вкратцѣ, какъ совершается кругъ жизненныхъ функций у нашего дерева. Цвѣтетъ онъ, подобно альпійскому кедрю, поздно, позднѣе другихъ нашихъ лѣсныхъ деревьевъ. По Печорѣ и Щугору въ 1905 году кедръ въ концѣ іюня и началѣ іюля мѣсяцевъ при ударѣ по стволу дали цѣлыя тучи пыльцы, т. е. они были въ полномъ цвѣту.

Сѣмена, какъ извѣстно, созрѣваютъ на другой годъ послѣ опыленія. Созрѣваніе происходитъ въ теченіе августа мѣсяца. 16 іюля 1905 года я остановился въ деревнѣ Оранцѣ на Печорѣ, около южной границы Архангельской губерніи. Тамъ дѣти играли съ шишками, уже довольно крупными. Но скорлупа сѣмянъ оказалась еще совсѣмъ бѣлой и мягкой. 23 августа того-же года я находился на средней Усѣ, почти подъ полярнымъ кругомъ. Въ 10 верстахъ къ югу отъ рѣки, отдѣленная отъ нея огромными болотами, на древнемъ аллювіи рѣки стоитъ маленькая кедровая роща. Благодаря отсутствію человѣка здѣсь сохранилось большое количество шишекъ, которыя были совершенно спѣлы. Въ концѣ іюля 1907 года на рѣкѣ Палью (около Пермской границы) шишки оказались уже довольно хорошо развитыми, окрашенными въ характерный темнофіолетовый цвѣтъ. 5 августа я находился уже на 300 верстъ сѣвернѣе Палью; здѣсь неоднократно мы собирали на берегахъ Щугора совсѣмъ развитыя крупныя шишки, опавшія съ деревьевъ, растущихъ на скалистыхъ

1) Очеркъ растительности низовьевъ рѣки Конды. Ежегодникъ Тобольскаго Губернскаго Музея, XX. вып., Тобольскъ 1912.

2) Sommier, Flora dell'Ob inferiore. Firenze 1896.

3) Этотъ оптимумъ вѣроятно находится въ Енисейскомъ краѣ или, по крайней мѣрѣ, ближе къ Енисею. Такого мнѣнія держится и Б. Н. Городковъ.

обрывахъ берега. Плоды, легко раскрывающіеся у огня, содержали спѣлыя сѣмена съ плотной бурой скорлупой. Не будучи въ состояніи указать съ точностью по собственнымъ наблюденіямъ, когда опадаютъ шишки въ Печорскомъ краѣ, все-таки могу дать нѣкоторыя свѣдѣнія изъ литературы по сосѣднимъ областямъ. П. Крыловъ¹⁾ говоритъ, что въ Пермской губ. сѣмена поспѣваютъ съ половины августа. Для Тавдинско-Пелымскаго края Н. Словцовъ²⁾ сообщаетъ, что шишки поспѣваютъ, когда созрѣетъ рожь; орѣховый промыселъ начинается немного позднѣе перваго августа. По устному сообщенію Б. Н. Городкова, въ Кондинскомъ краѣ сборъ начинается около 1 августа, а шишка опадаетъ въ началѣ сентября. Подробное описаніе орѣховаго промысла имѣется у С. К. Патканова³⁾ для Тобольскаго округа. Начинается промыселъ въ концѣ іюля, хотя шишки вполне поспѣваютъ въ серединѣ или даже въ послѣдней трети августа. Опадаютъ они въ сентябрѣ или октябрѣ мѣсяцахъ. Изъ приведеннаго матеріала становится яснымъ что опаденіе шишекъ происходитъ немного раньше или какъ разъ во время первыхъ снѣгопадовъ.

Нѣсколько иначе эти процессы протекаютъ въ Альпахъ. Рикли, написавшій объемистую монографію „Die Arve in der Schweiz“, говоритъ, что цвѣтеніе начинается въ серединѣ іюля, въ нѣжномъ Энгадинѣ даже въ началѣ августа. Въ началѣ августа слѣдующаго года шишки еще не совсѣмъ спѣлы; опадаютъ-же онѣ въ январѣ или февралѣ мѣсяцахъ. Въ книгѣ Henspel и Wilhelm⁴⁾ значится, что шишки вполне созрѣваютъ съ конца октября до середины ноября, опадаютъ-же онѣ только передъ весною подъ вліяніемъ вѣтровъ и нагрѣванія солнцемъ. Другого мнѣнія, очевидно, держится М. Турскій⁵⁾, который выражается такимъ образомъ: „въ теченіе двухъ зимъ на Уралѣ я не находилъ на кедрѣ ни одной шишки зимою, и ни на Уралѣ, ни на

1) Матеріаль къ флорѣ Пермской губ. Вып. II. Труды Казанск. Общ. Естест. т. IX, в. 6, стр. 303.

2) У Словцова имѣются двѣ работы, мною использованныя: 1) Въ странѣ кедра и соболя (очеркъ Тавдинско-Пелымскаго края). Зап. Западно-Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. книжка XIII, вып. 1, 1892. (41 стр.) и 2) О распространеніи и урожаяхъ сибирскаго кедра (*Pinus sibirica*); тамъ-же, 10 стр.

3) Экономическій бытъ государственныхъ крестьянъ и инородцевъ Тобольскаго округа Тобольской губ. Матеріалы для изученія экономическаго быта государственныхъ крестьянъ и инородцевъ западной Сибири. Вып. X, Спб. 1891 и вып. XIX, Спб. 1893.

4) Die Bäume und Sträucher des Waldes. I. Abt. Wien 1889.

5) Изъ наблюденій и изслѣдованій въ лѣсномъ питомникѣ. Изв. Петровской Земл. и Лѣсной Академіи, годъ IV, вып. I, Москва 1881.

Альпахъ не встрѣтилъ человѣка, который бы своими глазами видѣлъ на кедрѣ лишки зимою.“

Но какъ бы то ни было, результатъ будетъ одинъ и тотъ же. Сѣмена могутъ давать всходы только послѣ весны, конечно при исключеніи какого нибудь дѣйствія постороннихъ факторовъ.

Остается еще рѣшить вопросъ о сѣменныхъ годахъ. Для Печорскаго края мы въ этомъ отношеніи положительныхъ данныхъ не имѣемъ. Въ виду того, что я проѣзжалъ громадныя разстоянія въ сравнительно короткое время, мои личныя наблюденія могутъ носить лишь болѣе или менѣе случайный характеръ. Скажу только, что въ 1905 году шишекъ было немного, а въ 1907 году ихъ было гораздо больше. Если бы населеніе этого края занималось настоящимъ орѣховымъ промысломъ, тогда возможно было бы посредствомъ разспросовъ добыть данныя о сѣменныхъ годахъ. Приходится опять-таки обратиться къ литературѣ сосѣднихъ странъ, гдѣ крестьяне и инородцы искони пользуются названнымъ промысломъ, получая не мало дохода отъ него. Относительно Верхотурскаго уѣзда Валуевскій¹⁾ пишетъ, что одинъ урожайный годъ наступаетъ въ два, чаще въ три года. О томъ же уѣздѣ Холодковскій говоритъ слѣдующее: „урожай кедровыхъ орѣховъ наступаетъ черезъ 3—4 года, совпадая большею частью съ теплою весною и отсутствіемъ лѣтнихъ засухъ.“ Сонинъ²⁾ о Чердынскомъ уѣздѣ даетъ такія свѣдѣнія: „плодоносное время бываетъ не каждагодно, но черезъ два года въ третій, и то если не было засухъ.“ Въ Тобольскомъ округѣ, по словамъ Патканова, въ общемъ, въ каждое четырехлѣтіе бываетъ одинъ хорошій, два среднихъ и одинъ плохой урожай. Какъ мнѣ указываетъ Б. Н. Городковъ, такой взглядъ слѣдуетъ считать болѣе правдоподобнымъ. Замѣчу кстати, что, по-видимому, Паткановъ наблюденій въ природѣ не производилъ и вотъ почему. Онъ объясняетъ приведенный имъ фактъ, что полный урожай наступаетъ каждый четвертый годъ тѣмъ, что лишка для своего развитія требуетъ цѣлыхъ четыре года. Кажется, что онъ имѣлъ въ виду примѣръ развитія майскаго жука.

Перейду теперь къ наиболѣе важному вопросу: какъ возобновляется и какъ распространяется сибирскій кедръ. Это единственное дерево тайги, у котораго сѣмена сравнительно тяжелыя, крупныя; единственное дерево, у котораго совершенно отсутствуетъ летательный аппаратъ, приспособленіе, при помощи кото-

1) О добываніи шишекъ сибирскаго кедра (*Pinus sibirica*) въ Верхотурскомъ у. Пермской губ. Лѣсной Журналъ 1875, вып. 4, стр. 94—102.

2) Нѣкоторыя свѣдѣнія о господствующихъ древесныхъ породахъ и употребленіи оныхъ въ Чердынскомъ уѣздѣ. Лѣсной Журналъ 1839, № 8.

раго сѣмя могло бы продержаться хоть нѣкоторое время въ воздухѣ. Но такой аппаратъ никакого смысла не имѣлъ бы, потому что тяжелая шишка падаетъ прямо на землю, чтобы послѣ зимы раскрыться для разсынанія сѣмянъ.

Далѣе, это единственная порода тайги, у которой сѣмена содержать значительное количество питательнаго матеріала. Вотъ это лакомое содержимое и является приспособленіемъ для распространенія породы.

Если бы возобновленіе происходило въ природѣ прямо безъ всякаго дѣйствія постороннихъ факторовъ, то мы видѣли бы въ лѣсу, вѣроятно, приблизительно такую картину: около каждаго сѣменнаго дерева имѣется густой подсѣдъ, распределяющійся сравнительно правильными кругами молодняка, отличающагося другъ отъ друга, соответственно своему возрасту, только ростомъ и развитіемъ. Но, мнѣ кажется, такого страннаго зрѣлища никто не видѣлъ. А вотъ почему. У каждаго дерева есть свои любители сѣмянъ изъ мира животныхъ, но у кедровъ ихъ всего больше.¹⁾ Есть крупныя и мелкія звѣри и птицы, которыя для своего питанія снимаютъ ихъ съ дерева или поднимаютъ съ земли, иногда далеко унося ихъ отъ материнскаго дерева. Упомянутся въ литературѣ какъ истребители сѣмянъ кедровъ слѣдующія животныя: медвѣдь, соболь, бѣлка,²⁾ бурундукъ, полевые мыши, ронжа или сойка, т. е. кедровка, рябчикъ, кукушка и желна. Каково вліяніе названныхъ животныхъ? Коснусь только дѣйствія

1) Промышленники Запечорья ставятъ въ прямую связь урожайные годы и богатый промыселъ рябчиковъ и бѣлки.

2) Два вида, обыкновенный *Sciurus vulgaris* L. и болѣе рѣдкій, *Pteromys volans* L. Последній, какъ и бурундукъ (*Tamias striatus* (L.) Wagn.), по моимъ наблюденіямъ распространены до восточнаго побережья Бѣлаго моря. По словамъ А. А. Дунинъ-Горкавича (Сѣверъ Тобольской губерніи. Ежегодн. Тобольск. Губ. Музея VIII, 1897), бѣлка запасовъ на зиму не дѣлаетъ, но пользуется орѣхами, собранными ронжею, между тѣмъ, какъ родственныя бѣлкѣ бурундуки заготавливаютъ себѣ запасы. Соболь приводится какъ истребитель Валевскимъ; но врядъ ли можно приписать этому хищнику-птицеѣду такую роль. Авторъ чуть ли не выдѣляетъ рябчика, питающагося кедровымъ орѣхами, въ особую расу. Противъ такого взгляда совершенно справедливо обращается О. Мицкевичъ (Замѣтка по поводу статьи г. Валевскаго „о собираніи шишекъ сибирскаго кедровъ“. Лѣсной Журналъ 1876, вып. IV, стр. 46—48.); ставя вопросительный знакъ за соболемъ, онъ пишетъ дальше: „на основаніи собранныхъ мною данныхъ, въ Верхотурскомъ уѣздѣ питаются кедровымъ орѣхами изъ птицъ, одна лишь кедровка, называемая также ронжа или пуйжа“. Относительно желны (чернаго дятла) мнѣ извѣстно еще одно сообщеніе изъ средней Германіи. Дятлы уничтожаютъ въ Вѣрлицкомъ паркѣ (близъ г. Дессау) орѣхи культивируемыхъ альпійскихъ кедровъ до полнаго ихъ созрѣванія. (Herre in: Mitteilungen d. Deutsch. Dendrologischen Gesellschaft 1910, p. 60.)



Рис. 1. „Кедръ-всадникъ“ на моренномъ валунѣ (кристаллическій сланецъ) въ долину р. Арасанъ-Кода. Южные склоны хребта Южный Алтай, 1850 метр. надъ уровнемъ моря. Снято 16 іюля 1910 г. Вл. В. Рѣзниченко. Сѣмя кедрѣ попало на скалу, вѣроятно, благодаря вліянію кедровки. Подобные примѣры приводятся для Альпъ въ монографіи Рикли. Снимокъ этотъ любезно предоставилъ мнѣ Д. Н. Литвиновъ, только что установившій новый видъ. Работа — „О горномъ сибирскомъ кедрѣ (*Pinus coropans* Litw.)“ — печатается въ Тр. Бот. Муз. Имп. Акад. Наукъ (т. XI, 1913). По мнѣнію Д. Н., показанное здѣсь дерево принадлежитъ, вѣроятно, также къ горному кедрѣ, на что указываетъ болѣе короткая, повидимому, хвоя. Кедровка, конечно, будетъ дѣйствовать на шишки *P. coropans* такимъ-же образомъ, какъ на *P. sibirica* Mayr.

наиболѣе важныхъ изъ нихъ, кедровки и бѣлки, и затѣмъ еще человѣка.

Мы видѣли уже, что скорлупа сѣмянъ сибирскаго кедра гораздо тоньше, чѣмъ у альпійскихъ орѣховъ. Какую важную роль должна играть кедровка въ жизни дерева, о томъ свидѣтельствуетъ слѣдующее обстоятельство. Клювъ сибирской кедровки гораздо тоньше, нежели клювъ европейской кедровки. Поэтому первая выделяется зоологами въ особую расу, *Nucifraga caryocatactes* Briss. var. *leptorhynchus* Nehring. Такое приспособленіе одного органа птицы къ другому органу дерева указываетъ на многовѣковую совместную жизнь обоихъ и на тѣснѣйшія взаимоотношенія. И дѣйствительно, дѣятельность кедровки отражается наиболѣе чувствительно на судьбѣ нашего дерева. Многіе писатели, въ особенности Слобцовъ, Паткановъ, Холодковский и Рикли, болѣе или менѣе подробно говорятъ объ истребляющей роли птицы; дѣятельность ея начинается еще въ іюлѣ мѣсяцѣ, до созрѣванія шишекъ, продолжаясь до глубокой осени. Но только немногіе изъ авторовъ признаютъ полезную роль птицы. Совершенно справедливо замѣчаетъ Рикли, что дѣйствіе ея въ неурожайные годы является губительнымъ, между тѣмъ какъ она при избыткѣ сѣмянъ оказываетъ много пользы, распространяя орѣхи и расширяя область распространенія дерева. Другой швейцарецъ, Эблинъ,¹⁾ полагаетъ, что безъ кедровки многія изъ населенныхъ кедрами мѣстъ въ Альпахъ остались бы безлѣсными. Но онъ считаетъ дѣйствіе кедровки только интереснымъ въ ботанико-географическомъ смыслѣ, не придавая ему большого практическаго значенія для лѣсоводства.

Когда я въ срединѣ іюля проѣзжалъ черезъ волокъ, раздѣляющій верховья Вычегды отъ Печоры, при первомъ появленіи возлѣ тракта взрослыхъ кедровъ, сейчасъ и показалась кедровка. То-же самое наблюдалось на р. Палю. Мы поднимались по этой рѣкѣ съ 21 по 28 іюля. Шишекъ было достаточно, такъ что рабочіе-зыряне обрадовались, намѣреваясь по окончаніи экскурсіи пріѣхать туда для сборовъ. Однако, чѣмъ дальше мы поднимались, тѣмъ больше показались кедровки. Было интересно смотрѣть, какъ сравнительно не крупныя птицы вертѣлись съ громкимъ криканіемъ около вершинъ деревьевъ, улетаая затѣмъ съ тяжелой шишкой въ клювъ. Въ результатъ совместной работы птицъ и звѣрей (бѣлки) оказалось въ послѣднихъ числахъ іюля, когда мы спускались по рѣкѣ, что шишекъ на кедрахъ уже больше не было.

1) Eblin, B. Über die Waldreste der Averser Oberthales. Ber. Schweiz. Bot. Gesellsch. 1895, V, p. 28—81. Въ работѣ имѣются рисунки подобные нашему рис. 2.

Когда я, во второй половинѣ августа, вернувшись съ Тельноса, спускался внизъ по Щугору, повсюду въ лѣсахъ лежали




Рис. 2. Работа бѣлки и кедровки; послѣдняя оставила въ шишкѣ 20 сѣмянъ.
Шишки собраны мною по бассейну Щугора въ августъ 1907 г.

пишкы, обработанныя бѣлкою и кедровкою. Работа бѣлки состоитъ въ томъ, что она, снимая толстые чешуи и верхнюю половину скорлупы, выѣдаетъ сѣмена, не оставляя ни одной

сѣмени; остаются только пустыя половинки скорлупы. Кедровка дѣйствуетъ совершенно иначе. Раскрывая чешуи, она вынимаетъ сѣмена цѣликомъ, оставляя однако всегда часть цѣльныхъ, невредимыхъ орѣховъ въ обработанной шишкѣ. Такимъ образомъ, бѣлка¹⁾ вліяетъ, вѣроятно, только истребляюще; кедровка, напротивъ, сохраняя часть сѣмянъ, дѣйствуетъ распространяющимъ образомъ, если только удовлетворено одно условіе: нѣкоторый избытокъ въ шишкахъ. Въ неурожайные годы запасъ плодовъ уничтожается до созрѣванія сѣмянъ. Какимъ образомъ это происходитъ у кедровки, что остается часть орѣховъ въ шишкѣ, я не могу объяснить. Но это фактъ. Б. Н. Городковъ полагаетъ, что птица для болѣе удобной работы, клипываетъ шишку между стволомъ и сукомъ дерева, не будучи, поэтому, въ состояніи, вынуть всѣ сѣмена. Весьма возможно, что это такъ.

Вотъ, теперь и понятно, почему въ сосновыхъ борахъ, гдѣ взрослыхъ кедровъ не было, повсюду показался подростъ. Только благодаря кедровкѣ. Доказательствомъ того можетъ послужить другое наблюденіе. Во всѣхъ лѣсахъ, не только въ борахъ, сѣянцы въ болѣе молодыхъ стадіяхъ очень часто растутъ по нѣсколько вмѣстѣ, тѣсно прижатые другъ къ другу. Бываетъ по 3, по 5 и даже по 20, образуя густой пучокъ. И дѣйствительно, въ обработанныхъ кедровкою плодахъ можно найти такое же количество, иногда до 20, сѣмянъ, вполне годныхъ для распространенія породы. Интересно, что даже на западномъ склонѣ Тельпоса, далеко за верхнимъ предѣломъ древесныхъ породъ, былъ собранъ моимъ спутникомъ такой пучокъ молодыхъ кедровъ.

Другого мнѣнія держится Холодковский; онъ пишетъ²⁾: „Нельзя не отмѣтить замѣчательнаго инстинкта, съ которымъ ронжа выбираетъ орѣхи. Найдя кедровую шишку съ нѣсколькими оставленными ронжою орѣхами, можно смѣло ручаться, что изъ нихъ нѣтъ ни одного годнаго“. По моимъ наблюденіямъ Холодковский не правъ; онъ, вѣроятно, слишкомъ обобщаетъ одно случайное наблюденіе. Распространять сѣмена кедровка можетъ еще другимъ образомъ, потерявъ случайно орѣхи во время перелета съ одного мѣста въ другое. Дѣло въ томъ, что въ

1) Въ своей работѣ: *Vegetationsbilder aus Nordrussland* (Vegetationsbilder, herausgegeben von Karsten und Schenk, V. Reihe, Heft 3—5, Taf. 17., Jena 1907), которая была написана послѣ перваго путешествія по Печорскому краю, я упоминаю о распространяющей роли бѣлки. Теперь долженъ признать, что значеніе послѣдней въ этомъ отношеніи можетъ проявляться только путемъ случайно потерянныхъ сѣмянъ или шишекъ.

2) О поврежденіи ронжою кедровыхъ лѣсовъ. Лѣсной Журналъ 1891, вып. I, стр. 60—61.

зобѣ помѣщается большое число орѣховъ; по словамъ Чуди¹⁾ она уноситъ до сорока штукъ сразу; по Холодковскому это число доходить даже до 80.



Рис. 3. Молодые кедры, выросшіе въ альпійской области г. Тельпоса изъ занесенной кедровкою шишки; собралъ проф. Медгеръ 14 августа 1907 г.

Теперь освѣтимъ еще одно изъ жизненныхъ функцій сибирскаго кедра — прорастаніе. Какъ извѣстно, рядъ цѣнныхъ

1) Стр. 67 работы P. Vogler: Über die Verbreitungsmittel der schweizerischen Alpenpflanzen. Flora, Bd. 89, стр. 1—137, 1901.

опытовъ надъ различными породами производилъ Турскій; по его словамъ „сѣмена всходятъ черезъ 3—4 недѣли; чѣмъ свѣжѣе сѣмена, тѣмъ они всходятъ быстрѣе“. Это подтверждается однимъ изъ моихъ наблюденій: 20 августа 1907 года я поднялъ на низкомъ берегу Щугора шишку, свѣже обработанную кедровкою. Шишка эта лежала въ травѣ, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ воды. Въ ней осталось около десятки сѣмянъ, которыя сильно разбухли, у нѣкоторыхъ уже стали показываться бѣлые кончики всходовъ. Если мы предположимъ, что шишка была снята кедровкою съ дерева около 1 августа, тогда еще не прошло не полныхъ три недѣли. Мнѣ можно сдѣлать упрекъ, что, можетъ быть, шишка тамъ пролежала съ прошлаго года, или-же, что она была принесена весною половодіемъ. Но надо имѣть въ виду, что Щугоръ мощная горная рѣка, очень стремительная, съ большимъ паденіемъ, текущая съ Урала. Вода ея не только весною поднимается очень высоко, но и лѣтомъ, послѣ дождей сразу прибываетъ на 1—2 аршина. Между тѣмъ на Щугорѣ съ 4 августа стояла чудная погода. Кромѣ того, шишка, послѣ обработки кедровкою дѣлается слабою, рыхлою; она едва-ли въ состояніи выдержать транспортъ водою и остаться въ цѣломъ видѣ.

Изъ приведеннаго факта можно вывести еще одно заключеніе. Кедровка совершаетъ немаловажный переворотъ въ жизни сибирскаго кедра. Надо думать, что значительное количество сѣмянъ изъ плодовъ, подверженныхъ дѣятельности этой птицы, даютъ всходы той-же осенью, въ тотъ-же вегетаціонный періодъ, въ теченіи котораго созрѣвали сѣмена.

У альпійскаго кедра относительно прорастанія дѣло обстоитъ совсѣмъ иначе. По литературнымъ свѣденіямъ, сѣмя лежитъ на землѣ больше одного года. Рикли говоритъ, что всходы появляются лишь на вторую весну. Норвежскій ботаникъ F. C. Schübeleg¹⁾, производившій рядъ опытовъ надъ сѣменами альпійскаго кедра, растущаго въ Христианіи, сообщаетъ, что, если сѣютъ осенью, то сѣмя пролежитъ полтора года, если же сѣютъ весною, то даже два года. Тутъ видно какое важное значеніе имѣетъ для нашего дерева болѣе тонкая скорлупа орѣха. Можно сказать, что у сибирскаго кедра возобновленіе самой природою обезпечено гораздо лучше, нежели у альпійскаго. Ясно, что у послѣдняго изъ сѣмянъ, лежащихъ на землѣ больше года, значительное количество станетъ добычею разныхъ животныхъ до прорастанія.

1) Die Pflanzenwelt Norwegens. Ein Beitrag zur Natur- und Kulturgeschichte Nord-Europas. Christiania 1873—1875. (стр. 154).

Остается рассмотреть дѣйствіе еще одного истребителя — человѣка, вырубающаго безжалостно деревья для болѣе удобнаго сбора плодовъ. По пути изъ большаго села Троицко-Печорскаго въ деревню Усть-Плычъ, на поимѣ и по склонамъ береговъ Печоры кедръ встрѣчается большею частью въ видѣ молодыхъ экземпляровъ, старыхъ почти не было. Чтобы найти кедръ въ окрестностяхъ Оранца, пришлось сперва спуститься по Печорѣ, затѣмъ переправиться черезъ рѣку на лѣвый берегъ. Входя въ лѣсъ, мы сначала наткнулись только на молоднякъ; лишь по дальше отъ рѣки попались взрослыя деревья. Въ этихъ явленіяхъ ясно сказывается вліяніе человѣка. Самая глухая мѣстность на Печорѣ, это — пространство между дер. Берездыкосомъ и Н. Щугоремъ. Тутъ могучая рѣка, прорѣзываясь черезъ горный кряжъ, суживается; скалистые берега становятся высокими, красивыми. Поименныхъ пространствъ и покосовъ имѣется очень мало. Склоны береговъ покрыты лѣсомъ изъ всѣхъ породъ тайги, со значительной примѣсью старыхъ кедровъ. Объясняется это тѣмъ, что весьма немногочисленное населеніе здѣсь занимается брусянымъ промысломъ, добывая точильный камень при устьи рѣки Соплеси. Поднимаясь лѣтомъ 1907 года передъ нами по рѣкѣ Щугору, партія зырянъ-рыбопромышленниковъ оставила свой слѣдъ въ видѣ нѣкотораго количества свѣже срубленныхъ, для сбора шишекъ, кедровъ. Въ Печорскомъ краѣ, гдѣ нѣтъ кедровниковъ, принадлежащихъ крестьянскимъ обществамъ, существуетъ только вольный промыселъ, носящій болѣе случайный характеръ. Отправляются въ урожайные годы мелкими партіями въ предгорья Урала или на самый Камень, гдѣ мѣстами по склонамъ горъ имѣются группы кедровыхъ деревьевъ. Мой проводникъ по Щугору рассказалъ мнѣ, что въ одномъ изъ предыдущихъ годовъ отправилось нѣсколько человѣкъ вмѣстѣ на восточный склонъ хребта Тельпоса, гдѣ въ короткое время собрали очень много шишекъ. На вопросъ, какимъ образомъ достались имъ эти шишки, онъ не стѣняясь отвѣтилъ, что просто рубили деревья. Во время моего проѣзда черезъ село Устькуломъ завѣдующій Устьнемскимъ лѣсничествомъ сообщилъ мнѣ, что въ 1906 году, который считался для Вычегодскаго края урожайнымъ, имъ было найдено 290 срубленныхъ деревьевъ и отобрано у крестьянъ большое количество орѣховъ. Истребленіе кедровъ ради орѣховъ также отмѣчается А. Битрихомъ¹⁾ для Помоздин-

1) Битрихъ и Гулюшкинъ: Къ характеристикѣ насажденій Помоздинскаго лѣсничества. Лѣсной Журналъ 1910, вып. 3, стр. 241. — Это лѣсничество расположено въ верховьяхъ Вычегды и Ижмы; въ работѣ упоминается еще для кедра „сравнительно быстрый ростъ въ молодости“.

скаго лѣсничества и С. А. Грюперомъ¹⁾ для Чердынскаго уѣзда. О самовольныхъ порубкахъ для добыванія орѣховъ и вредъ ими причиняеомъ говоритъ уже Латкинъ.²⁾

Другой способъ истребленія, менѣе вредный, упоминается П. Крыловымъ.³⁾ Въ одномъ изъ лѣсовъ Оханскаго уѣзда, въ 25 верстахъ отъ города Перми не удалось найти молодыхъ деревьевъ потому, что крестьяне вырываютъ ихъ съ корнемъ для продажи въ городѣ. Практикуется это, очевидно и въ другихъ мѣстахъ; въ Котласѣ, гдѣ сливаются рѣки Малая Двина и Вычегда, и кромѣ того кончается вѣтка желѣзной дороги, бурлаки на мѣхъ глазахъ торговали молодыми кедрами, привезенными ими съ верховьевъ Вычегды.

Человѣкъ, однако, въ иныхъ случаяхъ могъ бы способствовать распространенію породы, хотя, конечно не слѣдуетъ придавать этому какого либо практическаго значенія. Приведу примѣры для Кольскаго полуострова, интересные только съ теоретической стороны. Кедровыя сѣмена потребляются и населеніемъ крайняго сѣвера; они даже вывозятся въ Норвегію, гдѣ искони извѣстны подъ названіемъ „русскихъ орѣховъ“. На сѣверномъ Ледовитомъ океанѣ лежитъ пограничное съ Норвегіей мѣстечко Борисъ Глѣбъ. Вотъ и тамъ, въ тундрѣ, германскій лѣсоводъ Менгеръ, по его разсказу, нашелъ молодые кедръ около дороги, выросшіе конечно изъ брошенныхъ или потерянныхъ пробѣжками орѣховъ. Въ сѣверо-западномъ углу Бѣлаго моря, рядомъ съ деревней Кандалакшей, возвышается гора Крестовая. На безлѣсной вершинѣ этой горы, я собралъ лѣтомъ 1911 года цѣлый рядъ молодыхъ кедровъ, длиною до 10 сантиметровъ; росли они въ защищенномъ отъ вѣтровъ, дующихъ съ моря, мѣстѣ, среди мховъ и стелющихся полкустарниковъ. Объясняется эта находка такимъ образомъ, что жители деревни въ праздники при хорошей погодѣ охотно поднимаются на гору, чтобы любоваться красивымъ видомъ Кандалакшейской губы. Такія находки кедровыхъ сѣянцевъ далеко за предѣлами естественнаго распространенія, при томъ въ совѣтъ не подходящей обстановкѣ, имѣютъ все таки нѣкоторое значеніе.

1) Очеркъ флоры сѣверной части Чердынскаго уѣзда Пермской губ. Записки Ур. Общ. Люб. Естествозн. т. XXV, 1905, стр. 104. — Въ работѣ, содержащей кѣтати очень много сомнительнаго, говорится еще, что „дѣти ѣдятъ мужскіе цвѣты, для чего сбиваютъ ихъ палками“; кромѣ того имѣется указаніе на плодоношеніе, начинающееся у кедра при возрастѣ 70—80 лѣтъ.

2) Дневникъ Василія Николаевича Латкина, во время путешествія на Печору, въ 1840 и 1843 г. Часть I. Зап. И. Р. Геогр. Общ., книжка № 7, 1853, стр. 14 и 76.

3) Предварительный отчетъ о ботанической экскурсіи въ Пермскую губ. въ 1875 году. Труды Казанск. Общ. Естест. т. V, в. 4, стр. 15.

Они свидѣтельствуютъ о жизнеспособности сибирскаго кедра, указывая вмѣстѣ съ тѣмъ, до какой степени сѣмена сохраняютъ свою всхожесть.

Въ заключеніе скажу еще нѣсколько словъ по поводу культуры сибирскаго кедра. Культивируется это дерево во многихъ мѣстахъ, но все же больше въ садахъ около домовъ и жилыхъ мѣстъ. Имѣется даже цѣлая роща, не используемая какъ доходная статья. Въ пользу посадки его въ болѣе широкихъ размѣрахъ уже давно говорили и писали такіе лѣсоводы, какъ Турскій и Майръ. *Имѣя въ виду, что сибирскій кедръ способенъ расти, давать плоды и возобновляться при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ, почвенныхъ и климатическихъ, мы должны признать, что это — наиболѣе цѣнное дерево тайги.*

При нынѣ существующихъ путяхъ сообщенія уже не трудно будетъ достать осенью цѣлыя шишки изъ Вологодской, Пермской или даже Тобольской губ. Лучше всего посѣять орѣхи возможно скорѣе послѣ урожая той-же осенью, еще до перваго снѣгопада. Рекомендуются это вотъ по какимъ соображеніямъ: во первыхъ, не слѣдуетъ сѣменамъ давать возможности высохнуть, что задержало бы проростаніе совершенно напрасно, во вторыхъ: надо дать орѣхамъ хорошо промерзнуть. Послѣднее обстоятельство особенно важно; наши садоводы давно пользуются такимъ пріемомъ для разведенія сѣверныхъ и полярныхъ растений, нарочно подвергая сѣмена дѣйствію мороза; оказывается, что такимъ путемъ значительно увеличивается процентъ всхожести. Окончу свое сообщеніе словами Турскаго¹⁾: „за прекрасныя во многихъ отношеніяхъ качества древесины кедра, за цѣнные плоды его, за способность акклиматизироваться далеко за предѣлами своего отечества и за отѣненіе почвы кедръ заслуживалъ бы большаго вниманія со стороны лѣсоводовъ, чѣмъ какое ему удѣляется“.

Объясненіе карты. (Табл I.)

Граница распространенія сибирскаго кедра составлена мною на основаніи весьма скудныхъ данныхъ. Для Пермской губ. она взята цѣликомъ изъ приведенной выше (стр. 1) работы Коржинскаго. О нахожденіи кедра въ дикомъ видѣ въ предѣлахъ Вятской губ. мнѣ кажется, положительныхъ данныхъ пока нѣтъ. Очень трудно провести линію по Вологодской губерніи. Лучшіе знатоки Вологодской флоры, А. А. Снятковъ и покойный Иванцкій, не нашли дерева на западѣ отъ Тимана. Послѣдній изслѣдователь указываетъ прямо на Тиманъ, какъ на западную границу. („Списокъ растений Вологодской губ.“ Тр. Общ. Ест. Каз. Унив. XII, вып. 5, 1883; „Catalogue des plantes croissant dans les gouvernements de Wologda et d'Archangel“. Extr. du Monde des Plantes.

1) Изъ наблюденій и изслѣдованій въ лѣсномъ питомникѣ, стр. 17.

Paris 1895). Среди путешественниковъ послѣдняго времени В. Д. Андреевъ, приводя кедръ въ своемъ отчетѣ, все-таки никакихъ указаній о мѣстонахожденіи не даетъ. („Устьысоольскій уѣздъ. Раіонъ Устьысоольскаго и части Вычегодскаго лѣсничествъ. Ботаническій очеркъ“. Тр. Экспед. по изслѣдованіи земель Печорскаго края. Вологодской губ. т. II, отд. 4, Спб. 1910.). Въ коллекціи Андреева имѣется только одинъ экземпляръ, собранный въ самомъ горѣ Устьысоольскѣ. Стало бытъ, этотъ авторъ не наблюдалъ дикихъ деревьевъ. Итакъ, пришлось провести линію по Вычегодскому краю, основываясь на указаніяхъ для Устьынемскаго (стр. 16) и Помоздинскаго лѣсничествъ (стр. 17). Самъ я, пройдя по тракту изъ села Устьыкулома на Печору, первые кедръ встрѣтилъ только въ самыхъ верховьяхъ Вычегды, въ двухъ верстахъ отъ зимовки Зеленицы. Послѣ сказаннаго выше о вліяніи человѣка становится понятнымъ, что истребленіе около тракта идетъ усиленнымъ темпомъ. Вообще надо полагать, что въ предѣлахъ Вологодской губерніи, особенно по бассейнамъ р. Вычегды и, можетъ быть, даже р. Сухоны, уже вѣками идетъ борьба между человѣкомъ и нашимъ интереснымъ деревомъ, борьба, усиливающаяся съ каждымъ годомъ, соотвѣтственно съ расселеніемъ жителей и постояннымъ приливомъ поселенцевъ. Единственный, хотя довольно слабый, факторъ, противодействующій истребленію, это — кедровка. Можетъ быть, еще не очень давно кедръ водился въ Яревскомъ, Сольвычегодскомъ и даже Устюгскомъ уѣздахъ. Цѣлый рядъ данныхъ, приводимыхъ Кеппеномъ, говоритъ въ пользу такого мнѣнія, высказаннаго этимъ авторомъ. („Географическое распространеніе хвойныхъ деревъ въ Европейской Россіи и на Кавказѣ“. Зап. Имп. Акад. Наукъ т. L, 1885.). Къ сожалѣнію, большинство этихъ данныхъ состоитъ изъ свѣдѣній, добытыхъ изъ устъ третьихъ лицъ. Такъ напримѣръ, пишетъ П. Богословскій: „кедръ спбирскій пронзростааетъ въ Устюгскомъ уѣздѣ еще рѣже лиственницы“... „впрочемъ, мнѣ не довелось быть въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ встрѣчается“. („Нѣкоторыя свѣдѣнія о корабельныхъ лѣсахъ въ Вологодской губерніи“. Лѣсной Журналъ 1843, ч. I, кн. II, стр. 132.). По любезному сообщенію Н. Шенникова, кедръ, по разсказамъ крестьянъ будто и по нынѣ растетъ въ лѣсахъ Устюгскаго уѣзда. Перейдя теперь къ Архангельской губерніи, мы видимъ, что сѣверная граница пересѣкаетъ Печору недалеко отъ впаденія въ нее р. Усы. По наведеннымъ мною въ 1905 и 1907 годахъ при проѣздѣ справкамъ, послѣдніе кедръ стоятъ близъ деревни Соколовы. Наибольше сѣверное мѣстонахожденіе, наблюдаемое мною (стр. 6), лежитъ близъ Усы недалеко отъ поселка Уева-Щеля-Вѣжъ, въ 7 верстахъ отъ устья р. Адзвы. По словамъ моего проводника-самоѣда, кедръ не рѣдко встрѣчается между р.р. Заостренной и Шарью, на склонахъ низкаго хребта, тянущагося между р.р. Усою и Печорою и Ураломъ, параллельно съ послѣднимъ. Хребетъ этотъ есть ничто иное, какъ отрогъ цѣлага ряда известковистыхъ кражей, прорѣзываемымъ подъ прямымъ угломъ правыми притоками Печоры — Плычемъ, Подчеремомъ, Щугоремъ и Оранцемъ; онъ носитъ названіе „Адакъ-Талбей“. (А. В. Журавскій: Результаты изслѣдованій „приполярнаго“ Запечорья въ 1907 и 1908 годахъ. Изв. И. Р. Геогр. Общ. XLV, 1909, вып. I—III.). На сѣверъ отъ Усы Адакъ-Талбей тянется вдоль лѣваго берега Адзвы, и, постепенно понижаясь, теряется въ Большеземельской тундрѣ. Интересно, что въ Бот. Муз. Имп. Акад. Наукъ есть экземпляры кедръ съ плодами, собранные А. Журавскимъ въ 1905 году на р. Адзвѣ. Если наше дерево встрѣчается по бассейну Адзвы, то вѣроятно на склонахъ Адакъ-Талбея; слѣдую общему закону, дерево, по мѣрѣ приближенія къ его сѣверному предѣлу, выбираетъ себѣ болѣе хорошо дренированныя мѣста. Такимъ образомъ, область распростра-

ненія кедра тянется длиннымъ языкомъ до полярнаго круга, пользуясь, повидимому, тѣми благопріятными условіями (дренаж!), которыя связаны съ рельефомъ ландшафта. Въ какомъ мѣстѣ сѣверная граница переходитъ черезъ Ураль, сказать трудно; вѣроятно между хребтами Саблею и Тельпосомъ. О растительности Урала между 65 градусомъ и полярнымъ кругомъ мы почти ничего не знаемъ. Въ работахъ Гофмана и Гурскаго указаній для нашего дерева не имѣется. (Гофманъ: Сѣверный Ураль и береговой хребетъ Пай-хой. Т. II, Спб. 1856 и Гурскій: Поѣздка на Сѣверный Ураль. Ежег. Tob. Губ. Музея, вып. I, 1893.). Въ Обскомъ краѣ линія опять поднимается до полярнаго круга; по любезному сообщенію В. Н. Сукачева, кедръ былъ найденъ имъ у Обдорска. Причина повидимому та-же самая; близъ Урала преобладаютъ болота и тундры, поближе къ рѣкѣ — лучше дренированныя почвы.

Richard Pohle.

Zur Biologie der sibirischen Arve (*Pinus sibirica* Mayr.).

Résumé.

Die Arve habe ich bei Gelegenheit zweier Reisen im Petschoraland kennen gelernt. Die Verbreitung des Baumes ist aus der Karte ersichtlich; westlich vom Timanrückен dürfte derselbe heute wohl kaum mehr in wildem Zustande vorkommen. Ihr bestes Wachstum zeigt die Arve auf frischem mineralkräftigen Boden; indessen begnügt sie sich auch mit sehr ungünstigen Bodenverhältnissen. Zwischen Petschora und Ural breiten sich weite sumpfige Ebenen aus, auf denen sehr räumige Bestände von *Picea obovata* Ledeb., *Abies sibirica* Ledeb. und *Betula pubescens* Ehrh. stocken. Der Boden ist meist schwerer Lehm, kaltgründig und schlecht durchlüftet; in der Bodendecke herrschen *Polytrichum commune* L. und *Sphagna* vor, die eine dicke Schicht von Rohhumus bilden. Hier gedeiht die Arve besser als die andern Bäume (Taf. II); sie repräsentiert immerhin noch einen gewissen Nutzwert. In sandigen Kiefernheidewäldern mit Flechtendecke des südlichen Petschoralandes fand ich die Arve stets, jedoch nur als Unterwuchs. Stämmchen von 1—1,5 m. Höhe zeigten ein Alter von 30—50 Jahren; dabei waren sie häufig von *Lophodermium Pinastri* (Schr.) Cev. befallen. Auf dem relativ trocknen Sande wächst sie nie zum fruchttragenden Baum heran. Ein grosses Bedürfnis nach Feuchtigkeit im Boden zeichnet die sibirische Arve aus; in der Umgebung von Petersburg auf frischem leichten Boden angepflanzte Bäume leiden in trocknen Sommern. Reine Arven-Bestände fehlen im Petschoraland; wenn sie in der Provinz Perm und in West-

sibirien vorkommen, so wahrscheinlich nur dank menschlichem Einfluss. Wo das Sammeln der Nüsschen ein organisiertes Gewerbe ist, pflegt man stellenweise die anderen Bäume herauszunehmen, um der Arve zur besseren Ausbildung der Krone und reicherem Zapfensatz zu verhelfen.

Die Samenreife tritt im Laufe des August ein; im September oder Oktober, noch vor oder während des ersten Schnees, fallen die Zapfen vom Baum. Man kann annehmen, dass jedes dritte, eher noch jedes vierte Jahr ein Samenjahr wird. Sommerliche Dürre beeinträchtigt den Zapfensatz.

Als Liebhaber der Arvennüsschen werden in der russischen Literatur folgende Tiere genannt: Bär, Zobel (höchst fraglich!), Eichhorn und Flugeichhörnchen, der „Burunduk“ (*Tamias striatus* (L.) Wagn.), Mäuse, Haselhuhn, Unglücksheher (*Garrulus infaustus* L.), Schwarzspecht und endlich der Nussheher (*Nucifraga caryocatactes* v. *leptorhynchus* Nehring.). Unter diesen kommt der Nussheher, der viel Schaden stiften kann, als nützliches Tier wohl nur allein in Betracht. Er trägt am meisten zur Samenverbreitung bei. In Zapfen, die vom Heher bearbeitet waren, habe ich stets Samen (bis zu 20) gefunden (Abb. 2 mit Frassformen von Eichhörnchen und Nussheher). Daher kommt es, dass Arvenkeimlinge fast immer zu mehreren, von 3—20, zuweilen in dichten Büschchen, bei einander wachsen. Prof. Metzger fand in der Alpinregion des Töllpos (nördl. Ural) solch' einen aus verschlepptem Zapfen hervorgegangenen Busch, weit über der oberen Grenze der Arve. (Abb. 3; Taf. III zeigt den Töllposs mit Arven, Resten eines ehemaligen Sumpfwaldes, im Vordergrund; Abb. 1 einen Felsblock im südlichen Altai mit einem aus verschlepptem Samen erwachsenem Baum). Aus der Tätigkeit des Hehers lässt sich auch die Tatsache erklären, dass die Arve in den trocknen Kiefernheidewäldern wohl als Unterwuchs, nicht aber als mannbarer Baum zu finden ist.

Nach Versuchen von Turski keimen Arvensamen in 3—4 Wochen; je frischer die Samen, desto schneller keimen sie. Am 20. August 1907 fand ich am Ufer des Schtschugor einen frisch vom Heher bearbeiteten Zapfen, dessen Samen zum Teil gequollen waren, zum Teil bereits Keimspitzen zeigten. Er lag unmittelbar neben dem Wasser, wies jedoch keinerlei Spuren von Wassertransport auf. Seit Anfang August hatte der Fluss auch gar kein Hochwasser geführt. Nehmen wir an, dass der Zapfen um den 1. August herum an der Stelle vom Heher deponiert worden war, so würde sich eine Keimungsdauer von etwa 3 Wochen ergeben. Es mag überhaupt häufig sein, dass Samen von solchen „Heherzapfen“ noch in der Vegetationsperiode ihrer Reife zur Keimung gelangen. Jedenfalls


ist der sibirische Baum mit seinen dünnchaligen Nüsschen für den Kampf um das Dasein bedeutend besser ausgerüstet, als die Arve der Alpen, deren Samen länger als ein Jahr auf dem Boden liegen, ehe sie keimen.

Der schlimmste Feind der Arve im Petschoraland ist der Mensch, der den Baum schonungslos fällt, um leicht zu den Zapfen zu gelangen.

Im Jahre 1911 fand ich gut entwickelte Arvenkeimlinge auf dem waldlosen Gipfel eines Berges bei Kandalakscha auf der Halbinsel Kola — zwischen Moosen und niederliegenden Kleinsträuchern typischer skandinavischer Fjeldvegetation. Prof. Metzger teilte mir einen ähnlichen Fund mit, den er an der Küste des Eismeerces nahe der norwegischen Grenze gemacht hatte. Arvennüsschen sind für die gesamte Bevölkerung des Nordens eine beliebte Leckerei. Derartige Funde legen Zeugnis ab für die Lebensfähigkeit der sibirischen Arve.

Ich stehe nicht an diesen Baum als den wertvollsten der Taigá (meines Erachtens die beste Benennung der Nadelwaldzone in ihrem nördlichen Teile) zu bezeichnen, weil er zugleich Nutzholz und Samen erzeugt, die einen hohen Marktpreis erzielen. Denn diese Arve gedeiht noch unter denkbar ungünstigen klimatischen und Bodenverhältnissen.

Gleich Turski, Mayr und andern befürworte ich den Anbau der sibirischen Arve, der ohne Mühe bis an das Schwarzerdegebiet betrieben werden kann. Es empfiehlt sich, den Samen in demselben Herbst gleich nach der Reife, noch vor dem ersten Schnee zu säen und ihn nicht austrocknen zu lassen. Er kann dann im Winter noch durchfrieren: auf diese Weise werden bekanntlich bei borealen und polaren Pflanzen höhere Keimprozente erzielt.



Граница распространения *Pinus sibirica* Mayr.



„Сырая каренга“ — болотистый лѣсъ изъ ели, пихты, кедра и березы близъ дер. Оранца на Печорѣ; 24. VI. 1905 г.



Два кедра у подножі хр. Тельпоса — остатки вирубанного кочующими самобдами ліса, місце которого теперъ
занимає сфагновий торфяникъ; 12. VIII. 1907 г.

Б. Л. Исаченко.

О клубеньках на корнях *Tribulus terrestris* L.

Если позднимъ лѣтомъ или въ началѣ осени пройтись по тѣмъ пескамъ, которые, едва прикрытые выгорѣвшей травой, находятся среди небольшихъ рощицъ на правомъ берегу Южнаго Буга возлѣ Варваровки, то можно замѣтить, что почти повсюду на песчаной почвѣ зеленѣтъ лишь *Tribulus terrestris* L. Это невольно бросается въ глаза и кажется, что только это растение со своими колючими плодами не чувствуетъ ни въ чемъ недостатка и зеленѣтъ, покрывая въ концѣ лѣта пески своими длинными стелющимися побѣгами.

Впервые на яркую зелень *Tribulus terrestris* я обратилъ вниманіе въ августѣ 1909 года и причину яркой окраски растенія, казалось, естественнѣе всего искать въ корневой системѣ или уходящей глубоко въ почву или обладающей какими нибудь особыми приспособленіями.

Разсматривая корни *Tribulus*, выкопанные осторожно изъ земли, я замѣтилъ на нихъ чрезвычайно мелкіе совершенно бѣлые наросты, которые въ видѣ маленькихъ бородавочекъ покрывали корешки, сидя не далеко другъ отъ друга.

Въ слѣдующемъ 1910 году я снова самымъ тщательнымъ образомъ обследовалъ пески Варваровки съ лопатой въ рукѣ, выкапывая чуть не каждый *Tribulus terrestris*, который попался мнѣ на дорогѣ. Это обследованіе оказалось еще плодотворнѣе, такъ какъ на корняхъ у этого растенія были обнаружены не маленькія бѣленькія едва замѣтныя бородавочки, но большія клубеньки совершенно подобныя, клубенькамъ бобовыхъ. Сходство во внѣшнемъ ихъ видѣ было поразительное. Въ нынѣшнемъ 1912 году результатъ былъ иной: я не успѣлъ осмотрѣть большаго количества *Tribulus terrestris*, но растенія выкопанныя мною, правда въ небольшомъ числѣ, были совершенно лишены какого бы то ни было намека на клубеньки. Такимъ образомъ мои поиски клубеньковъ въ этомъ году были безъ результата.

По вѣшнему своему виду клубеньки бываютъ двухъ родовъ: или въ видѣ маленькихъ бѣловатыхъ, едва замѣтныхъ топенкиныхъ бородавочекъ, слегка заостренныхъ, или же въ видѣ болѣе или менѣе шарообразныхъ клубеньковъ, размѣры которыхъ подвержены колебаніямъ въ широкихъ предѣлахъ, какъ это можно видѣть изъ прилагаемыхъ рисунковъ (рис. 1). Клубеньки первого рода я встрѣчалъ главнымъ образомъ въ 1909 году, но попадались они и въ 1910 году. Клубеньки второго рода я находилъ въ 1910 году. Эти клубеньки сидятъ какъ на главномъ, такъ и на придаточныхъ корняхъ, по главнымъ образомъ все же на прида-




Рис. 1.

точныхъ. Сидятъ они то одиночно, то группами, образуя какъ бы сростки изъ трехъ и болѣе клубеньковъ, имѣя видъ бусъ напизанныхъ на нитку. Прилагаемые рисунки дадутъ довольно ясное представленіе о вѣшнемъ видѣ этихъ образований (рис. 2).

Несомѣнно, что маленькія бѣлыя бородавочки весьма напоминаютъ такъ наз. „Kurzwurzeln“ у *Sempervivum*.¹⁾ Образованіе которыхъ во многомъ схоже вообще съ тѣмъ, что я наблюдать у *Tribulus terrestris*. На варваровскихъ пескахъ можно

1) Zach, Fr. Untersuchungen über die Kurzwurzeln von *Sempervivum* und die dasselbst auftretende endotrophe Mykorrhiza. Sitzungsab. der K. Akad. d. Wissensch. Bd. CXVIII., Heft III., 1909. Wien, pag. 185.

найти виды *Sempervivum*, *Sedum* и *Euphorbia*¹⁾, растенія у которыхъ, въ свою очередь, были также найдены выросты или „Kurz-wurzeln“, образованные не безъ участія вѣроятно грибныхъ нитей.




Рис. 2.

Дѣлая бритвой срѣзы изъ только что выкопанныхъ корней, можно видѣть, что, какъ клубеньки, такъ и корни покрыты мѣстами сплетеніемъ, состоящимъ изъ нитей какого то гриба.




Рис. 3.




Рис. 4.

Нити эти буроватаго цвѣта съ ясно выраженными перегородками проходятъ черезъ наружныя клетки коры внутрь первичной коры (рис. 3). Мѣстами на одномъ изъ срѣзовъ прониканіе гифъ гриба внутрь корня можно было особенно хорошо прослѣдить (рис. 4).

1) Gaucher, La racine des Euphorbes cactiformes. Journal de Bot. T. XIII. 1899.

Внутри нитей гриба замѣтны блестящіе капли, повидимому капли масла; мѣстами болѣе густое скопленіе протоплазмы.

Природа организма, вызывающаго образованіе вздутій, не можетъ быть выяснена съ достаточной убѣдительностью однимъ микроскопическимъ изслѣдованіемъ. Какъ бы не говорили за себя наблюдаемые факты, пока остается хотя бы какое нибудь мѣсто для сомнѣнія, вопросъ еще не рѣшенъ. Въ работѣ, посвященной актинomioзоу у растений, Пекло¹⁾ говоритъ, что въ то время какъ препараты говорили за *Nurphomyceten*, чистыя культуры сказали другое. Несомнѣнно, что безъ экспериментально вызваннаго заболѣванія съ помощью чистыхъ культуръ, нѣтъ главнаго доказательства обязательнаго для выясненія причины каждаго инфекціоннаго заболѣванія и растительная патологія не можетъ считать это условіе для себя не обязательнымъ. Я не могъ, исполнить это необходимое условіе для вывода опредѣленнаго заключенія, такъ какъ подъ руками не было лабораторіи, а привезенный въ С.-Петербургъ матеріалъ могъ годиться, и то съ трудомъ, лишь для неполнаго микроскопическаго изслѣдованія.²⁾

На разрѣзахъ, сдѣланныхъ бритвой или съ помощью микро-тома, можно замѣтить, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ клубенька черезъ его клѣтки проходятъ внутри тканей растенія нити грибка. Эти нити тянутся иногда на довольно значительное разстояніе отъ одной клѣтки къ другой; сами по себѣ нити тонки (1—1,2 μ), наполнены зернистой протоплазмой, въ которой видны вакуоли и блестящіе круинки. Мѣстами нити слегка вздуваются, за вздутіемъ начинается новая клѣточка, такъ что размѣры нити не вездѣ одинаковы и утолщеніе ея совпадаетъ, обыкновенно, съ перегородкой. На концахъ нити можно наблюдать небольшія грушевидныя вздутія, достигающія 3—5 μ . въ поперечникъ; такія же точно вздутія встрѣчаются мѣстами и по срединѣ нити, при чемъ здѣсь наблюдается иногда какъ бы скопленіе вздутій. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что эти вздутія представляютъ собой тѣ же самыя образованія, которыя описаны у Надсона, какъ клѣтки своимъ вѣншиимъ видомъ похожія на хламидо-споры грибовъ (Надсонъ называетъ эти клѣтки „псевдо-хламидоспоры“), но своимъ внутреннимъ строеніемъ онѣ скорѣе соотвѣтствуютъ „гетероци-

1) P e k l o, J a r o s l a v. Die pflanzlichen Aktinomykosen. Centr. für Bakt. II Abt. 1910. № 17/21. pag. 451.

2) Не лишнимъ считаю здѣсь отмѣтить, что тамъ, гдѣ я находилъ клубеньки у *Tribulus terrestris*, встрѣчался на пескахъ многочисленные представители рода *Geaster* (ср. N o a c k, Fr. Ueber mykorrhizenbildende Pilze. Botan. Zeit. 1889. pag. 389). Стоять ли въ какомъ нибудь отношеніи между собой эти *Geaster* и микориза на корняхъ *Tribulus*, я не могу еще сказать.

стамъ" или „пограничнымъ клѣткамъ" сине-зеленыхъ водорослей, которыя считаются часто за отмирающія или мертвыя клѣтки¹⁾.

Тѣ гифы, которыя проходятъ внутри растенія свѣтлѣе и тоньше, чѣмъ находящіеся на поверхности клубенька. Слѣдовательно не исключена и смѣшанная инфекція.

Наблюдая тѣсное сожительство (симбіозъ?) растенія и гриба, спрашивается въ какихъ отношеніяхъ стоятъ эти два организма другъ къ другу, какого рода взаимодѣйствіе существуетъ между организмами, питаніе которыхъ происходитъ очевидно, не одинаково. Отвѣтъ на этотъ вопросъ не можетъ быть, какъ мы сказали, точнымъ — безъ опытовъ и наблюденій, при которыхъ экспериментатору предоставляется возможность измѣнять условія существованія организмовъ, исключать второстепенные факторы и производить ихъ сравнительную оцѣнку. Не перейдя отъ наблюденія къ опыту, трудно произвести полный анализъ явленія. Болѣе или менѣе вѣроятныя предположенія, догадки, соображенія — вотъ что можно пока представить въ объясненіе такого, несомнѣнно, сложнаго явленія, какъ сожительство двухъ организмовъ, при чемъ относительно одного изъ нихъ — гриба — вообще точныхъ свѣдѣній у насъ очень не много.

Проще всего казалось и, вѣроятно, ближе всего къ истинѣ причину болѣе успѣшнаго развитія растеній надо было искать, но аналогичъ съ подобными же явленіями, въ тѣхъ организмахъ, вызвали которые образованіе клубеньковъ.

Франкъ²⁾, которому пришлось одному изъ первыхъ обратить вниманіе на существованіе на корняхъ у нѣкоторыхъ растеній нитей гриба — микоризы, высказалъ, какъ извѣстно, мысль, что грибокъ доставляетъ растенію воду съ растворенными въ ней питательными минеральными веществами и органическое вещество изъ гумуса и изъ разлагающихся органическихъ веществъ, въ свою очередь грибокъ беретъ отъ дерева органическія питательныя вещества. Этимъ взаимоотношеніемъ устанавливается „мутуалистическій симбіозъ," одинаково не вредный двумъ сторонамъ.

Съ другой стороны противъ какого бы то ни было симбіоза существуютъ довольно вѣскія соображенія. Такъ Каменскій³⁾ рассматриваетъ микоризу, какъ мутуалистическаго симбіонта на

1) Надсонъ, Г. А. Къ ученію о симбіозѣ. Болѣзни растеній. Т. II. № 1. Спб. 1908. стр. 36.

2) Frank, B. Ueber die auf Wurzelsymbiose beruhende Ernährung gewisser Bäume durch unterirdische Pilze. Berichte der Deutsch. Botan. Ges. Bd. III, 1885. pag. 128. Neue Mittheilungen über die Micorhiza der Bäume und der Monotropa Hypopitys. Ib. pag. XXVII.

3) Каменскій, Ф. Матеріалы для морфологій и біологій Monotropa Нуро-

корняхъ *Monotropa*, на корняхъ же древесныхъ породъ какъ паразита, разрушающаго корень. Того же взгляда держался Воронинъ¹⁾, Гартигъ²⁾, Делакрыа³⁾, Камара-Пестана⁴⁾, наблюденія, описанныя этими изслѣдователями, заставляютъ больше не сомнѣваться въ томъ, что микориза иногда можетъ быть въ роли опаснаго паразита. Делакрыа напр. описываетъ очень опасную болѣзнь каштановыхъ деревьевъ, весьма распространенную во Франціи, Италіи и Испаніи и совершенно опредѣленно считаетъ виновникомъ ея — паразитизмъ микоризы. Г. А. Надсонъ⁵⁾ описываетъ гибель дубовыхъ сѣянцевъ, присланныхъ ему изъ Екатеринбургской губерніи, и причиною гибели считаетъ микоризу, которую различныя причины поставили „въ неблагопріятныя условія существованія“ и „при такихъ обстоятельствахъ, грибокъ не только не могъ исполнять того, что онъ нормально исполняетъ по отношенію къ дереву (снабженіе его водой и питательными веществами изъ почвы), но сдѣлался агрессивнымъ паразитомъ.“

Такимъ образомъ нѣкоторыя наблюденія говорятъ какъ бы за то, что сожительство гриба съ растеніемъ, или бактерій съ растеніемъ, можетъ перейти изъ симбіоза въ паразитизмъ. Слѣдовательно „l'état dit de symbiose est en quelque sorte un état de maladie grave et prolongée.“⁶⁾ Относительно благопріятствующаго вліянія совмѣстной жизни растенія съ грибомъ высказывалось, какъ извѣстно, много предположеній: указывалась роль гриба въ транспираціи, въ поглощеніи питательныхъ солей изъ почвы, тѣхъ или другихъ углеводовъ, превращеніе одного рода питательныхъ веществъ въ другія, непосредственно усвояемыя ра-

pitys L. и нѣкоторыхъ другихъ сапрофитовъ. Записки Новороссійскаго Общества Естествениспытателей. Т. VIII., в. 2, 1883, стр. 5—6.

Каменскій, Ф. М. О симбіотическомъ соединеніи мицелія грибовъ съ корнями высшихъ растеній. Труды С.-Петербургскаго Общества Естествениспытателей. 1886, стр. 34—35.

1) Woronin, M. Über die Pilzwurzel (Mycorhiza) von B. Frank. Berichte der D. Botan. Gesellschaft. Bd. III, 1885, pag. 205—206.

2) Hartig, R. Über die Symbiotischen Erscheinungen im Pflanzenleben. Bot. Centr. Bd. 25. 1886, pag. 380.

3) Delacroix, G. La „maladie des Châtaigniers“ en France. Bulletin de la Société mycologique de France. T. XIII. fasc. 4, 1897, p. 242.

4) Camara-Pestana, J. La „Maladie des Châtaigniers“. Bulletin de la Société Portugaise des Sciences naturelles. Lisbonne. Vol. 1, fasc. 2, 1907 pag. 55.

5) Надсонъ, Г. А. Къ ученію о симбіозѣ. Болѣзни растеній. № 1, 1908, стр. 37—38.

6) Bernard, Noël. Nouvelles espèces d'endophytes d'Orchidées. Compt. rend. hebdom. de l'Ac. d. Sc. T. CXL. 1905, pag. 1272.

степенемъ, усвоеніе газообразнаго азота, наконецъ дѣлались попытки разсматривать грибокъ, какъ безвреднаго сожителя. Недостатка во взглядахъ стало быть не было, не было недостатка и въ наблюденіяхъ, но опытныхъ подтвержденій того или иного взгляда было не много.¹⁾ Несомнѣнно одно, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ присутствіе гриба на корняхъ, видимо, способствуетъ наружно успѣшному развитію растенія, но съ тѣмъ ограниченіемъ, что содѣйствіе развитію превращается въ противодѣйствіе, какъ только растеніе попадаетъ въ условія, понижающія нормальныя его отправленія. Характерный примѣръ этого приводится Надсономъ²⁾, когда излишняя влажность почвы повліяла вредно на дубовыя саженьцы и дубки ощутили весь вредъ отъ опутавшихъ ихъ корни гифъ микоризы.

Въ томъ явленіи, которое мнѣ пришлось наблюдать на песчаныхъ берегахъ Буга, несомнѣнно прежде всего бросалось въ глаза цвѣтущее состояніе *Tribulus terrestris* въ то время, когда большинство растеній замѣтно страдало отъ недостатка воды. Это явленіе находитъ себѣ, можетъ быть, объясненіе въ выводахъ Ноэля Бернара³⁾, который указывалъ на то, что грибокъ повышаетъ въ растеніи концентрацію клеточнаго сока дѣйствіемъ диастатическаго фермента гриба, переводящаго крахмалъ въ сахаръ, что въ свою очередь ведетъ къ поступленію въ клетки большаго количества воды. Въ статьѣ, появившейся въ текущемъ году, Павильаръ⁴⁾ разбираетъ теоретическую сторону вопроса о значеніи эндотрофной микоризы для растенія, отдавая явное предпочтеніе объясненіямъ Сталя⁵⁾ и Ноэль Бернара передъ какими либо другими. Павильаръ не считаетъ, однако, возможнымъ допустить, что эндомикотъ повышаетъ способность растенія поглощать воду и говоритъ, что, наоборотъ, онъ „agit sur la plante en la rendant capable de se passer d'eau“⁶⁾, т. е. дѣлаетъ растеніе способнымъ обойтись безъ воды.

1) Вопросъ о микоризѣ съ изложеніемъ всей литературы по данному предмету подробно разобранъ въ статьѣ А. А. Еленкина. Явленія симбіоза съ точки зрѣнія подвижнаго равновѣсія сожительствующихъ организмовъ. Ботаника растеній. Томъ I. СПб. 1908, стр. 106.

2) Надсонъ, Г. А. I. с.

3) Bernard, Noël. L'évolution dans la Symbiose. Ann. Sc. nat. 9 Série. IX. 1909, pag. 174.

Jd. Recherches expérimentales sur les Orchidées. Revue gen. de bot. T. 16. 1904, pag. 405.

4) Pavillard, M. J. La sécheresse physiologique et la symbiose. Revue scientifique, pag. 492, № 16, 1912.

5) Stahl, E. Der Sinn der Mycorrhizenbildung. (Eine vergleichend-biologische Studie). Jahrbücher f. wiss. Botanik. Bd. 34. 1900.

6) Pavillard, loc. cit. p. 495.

„La symbiose fungique est donc, avant tout, une modalité de l'adaptation xérophile, comme la réduction des parenchymes, l'épaississement des cuticules etc.“

И такъ, приводимыя мнѣнія Бернара и Павііара, говорятъ о роли гриба въ снабженіи растенія водой и о вліяніи его на способность растенія обходиться безъ (значительнаго количества) воды. Какой взглядъ болѣе правильнъ по отношенію къ *Tribulus terrestris* я не могу еще сказать, но думаю, что повышеніе осмотическаго давленія, вслѣдствіе наблюдавшагося и мною растворенія крахмала, несомнѣнно происходитъ, а слѣдовательно возможно допустить такъ же поступленіе большаго количества воды въ клѣтки растенія. Возможно, что это усиленное поступленіе воды оказываетъ и съ своей стороны вліяніе на разростаніе клѣтокъ, такимъ образомъ клубенекъ разростается не только подъ вліяніемъ раздраженія, вызываемаго проникновеніемъ въ ткани посторонняго тѣла, но и подъ вліяніемъ чисто физической причины — увеличившагося тургора.¹⁾ Вліяетъ-ли это увеличеніе тургора, зависящее отъ дѣйствія микоризы на крахмаль, такъ же и на пониженіе транспираціи, т. е. такъ, какъ думаетъ Павііаръ, сказать нельзя, одного наблюденія здѣсь мало.

Лабораторія И. Сиб. Ботаническаго Сада.

B. L. Issatschenko.

Ueber die Wurzelknöllchen bei *Tribulus terrestris* L.

Verfasser beschreibt die Knöllchen, die er an den Wurzeln bei *Tribulus terrestris* L. entdeckte, welches an sandigen Ufern des Süd-Bug, unweit des Dorfes Warwarowka (Gouv. Cherson) wuchs.

Es wurden zweierlei Knöllchen gefunden: kleine weisse an dünnen jungen Wurzeln sitzende, kaum merkbare, und runde grosse, dunklere, die durch ihr Aeusseres an die Knöllchen der Leguminosen erinnerten. Inmitten der durch die Dürre ausgebrannten Sandvegetation hob sich *Tribulus terrestris* durch seine grünen Blätter und Ausläufer hervor, was auch die Aufmerksam-

¹⁾ Laurent. Recherches expérimentales sur la formation d'amidon de la plante. Bull. Soc. Roy. de Bot. d. Belgique. 1888.

Bernard, N. Conditions physiques sur la tubérisation chez les végétaux. Compt. Rend. hebdomadaire de l'Académie des Sciences. T. CXXXV. 1902, pag. 706—708.

Burgeff, H. Die Wurzelpilze der Orchideen. Jena. 1909. pag. 194.

keit des Verfassers auf diese Pflanze lenkte. Auf dem mittels Rasiermesser oder Mikrotom gemachten Querschnitten konnte man dunkle mit deutlich ausgeprägten Scheidewänden versehene Pilzfäden beobachten, welche das Knöllchen von Aussen bedeckten. Stellenweise gelang es sogar das Durchdringen dieser Fäden in das Innere des Knöllchens zu beobachten. In den Zellen der Knöllchen konnten ebenfalls Pilzfäden beobachtet werden; sie waren jedoch dünner und heller. Diese Fäden gehen aus einer Zelle in die andere hinein, wobei sie stellenweise Anschwellungen hervorrufen. Verfasser teilt vollständig die Meinung Peklo's, dass die Erkrankungsursache einer Pflanze nicht immer allein durch mikroskopische Untersuchungen festgestellt werden kann; so zeigt z. B. Peklo, dass man, nach den Präparaten urteilend, hier von Hyphomycetes sprechen könnte; nach Anwendung der Reinkulturenmethode kann man sich jedoch davon überzeugen, dass diese Meinung eine irrige ist. Verfasser konnte zu seinen Versuchen, die hauptsächlich ausserhalb des Laboratoriums gemacht wurden, keine eingehenden Untersuchungen anwenden, weshalb er auch die Knöllchenbildung an *Tribulus terrestris* nur mutmasslich der *Mycorrhiza* zuschreibt. Verfasser nimmt an, dass das verhältnismässig frische Aussehen der Pflanze inmitten des Sandes sich vielleicht durch die wohltuende Wirkung der *Mycorrhiza* auf die Pflanze erklärt. Was jedoch den Tatbestand dieser günstigen Wirkung der *Mycorrhiza* anbelangt, so gibt Verfasser, nachdem er das Auflösen der Stärke in den Knöllchen beobachtete, der Ansicht Noel Bernard's den Vorzug, nach welcher die Lösung der Stärke die Osmose der Zellen und daher auch die Wasserzufuhr erhöht.

Jedoch verliert die neuerdings von Pavillard angeregte Ansicht, dass die Erhöhung der Osmose die Transpiration vermindert, keinesfalls ihre Bedeutung. Wie dem nicht wäre, erscheint der Zusammenhang zwischen der *Mycorrhiza* und der Aufnahme von Wasser durch die Pflanze dem Verfasser für unzweifelhaft.

Laboratorium d. Kaiserl. botan. Gartens.

А. Г. Конокотина.

О новыхъ дрожжевыхъ грибахъ: *Nadsonia* (Guilliermondia) *elongata* и *Debaryomyces tyrocola*.

I. *Nadsonia elongata*.

Въ концѣ апрѣля 1911 г., въ Смоленской губ., мною были собраны пробы слизи, которая встрѣчается весной въ большомъ количествѣ на свѣжихъ березовыхъ пняхъ въ видѣ бѣлой, слегка розоватой, мѣстами коричневатой, пѣнистой массы. Часто также приходилось мнѣ наблюдать такія слизистыя массы на березахъ, подрубленныхъ съ цѣлью собиранія „березовика“. 1) При этомъ часть вытекающаго сладкаго сока расплывается по дереву и служитъ богатымъ источникомъ питанія для микроорганизмовъ, которые и размножаются здѣсь въ изобиліи, особенно къ концу апрѣля, когда становится уже довольно тепло.

Изъ собранныхъ пробъ, въ числѣ другихъ организмовъ, былъ выдѣленъ мною въ чистой культурѣ дрожжевой грибокъ, относящійся къ роду *Nadsonia* и обладающій гетерогамной конуляціей.

Первый представитель этого рода былъ описанъ профессоромъ Г. А. Надсономъ и мною въ 1911 г. подъ названіемъ „*Guilliermondia fulvescens*“. 2) Вскорѣ проф. Н. Sy-

1) Сборъ березовика начинается въ концѣ марта или въ началѣ апрѣля. Для этого береза подрубается или сверлится приблизительно на поларшина отъ земли; въ отверстіе вставляется деревянный желобокъ, по которому и стекаетъ сладкій березовый сокъ въ подставленную посуду. Собранный сокъ, березовикъ, сбраживается живущими въ немъ микроорганизмами и получается квасъ.

2) Надсонъ, Г. А. и Конокотина, А. Г.: „О новомъ родѣ дрожжевыхъ грибовъ, *Guilliermondia*, съ гетерогамной конуляціей.“ — Извѣстія Имп. Сиб. Ботаническаго Сада, т. XI. 1911 г. стр. 117; см. также Nadson, G. A. und Konokotin, A. G.: „*Guilliermondia* — eine neue Gattung von Hefepilzen mit heterogamer Kopulation.“ — „Wochenschrift für Brauerei.“ 1912 г. № 23—24 (дополненный нѣмецкій переводъ).

довъ¹⁾ обратить вниманіе, что этимъ именемъ былъ уже раньше названъ другой грибокъ — изъ группы *Discomyces*, и предложить для нашего грибка новое родовое названіе — *Nadsonia*.

Грибокъ *N. fulvescens* выдѣленъ изъ слизи (слизетеченія) дуба. Его вегетативныя кѣтки овальной или лимоннообразной формы; передъ копуляціей онѣ становятся нѣсколько длиннѣе. Копуляція происходитъ большей частью между материнской кѣткой и ея, только что обособившейся, почкой — явленіе, называемое педогаміей²⁾. Главную особенность этого микроорганизма представляетъ его споруляция. Спора образуется не въ копулирующихъ кѣткахъ — гаметахъ, а въ почкѣ, которая вырастаетъ на макрогаметѣ вслѣдъ за копуляціей. Зрѣлая спора имѣетъ бугорчатую оболочку желтоватаго цвѣта. Поэтому спороносныя культуры отличаются своимъ свѣтлоричневымъ цвѣтомъ отъ бѣлыхъ вегетативныхъ культуръ этого грибка.

Новый, березовый грибокъ, будучи по исторіи развитія весьма сходенъ съ *Nadsonia* (*Guilliermondia*) *fulvescens*, отличается отъ него нѣкоторыми постоянными морфологическими и физиологическими признаками. Поэтому онъ отнесенъ мною къ другому виду того же рода и названъ *Nadsonia elongata*.

Макроскопическое различіе между этими грибами наиболее рѣзко обнаруживается при культивированіи ихъ на щелочной мясо-пептоновой желатинѣ съ 5% глюкозы.³⁾ Въ то время какъ гигантская колонія *N. fulvescens* представляетъ почти гладкую круглую пластинку (табл. IV, рис. 1 и 3), колонія *N. elongata* имѣетъ видъ мелко складчатой волнистой розетки (табл. IV, рис. 2 и 4). Цвѣтъ культуры у того и другого грибка, въ зависимость отъ окраски споръ, свѣтлоричневый, периферическая же часть колоніи въ томъ и другомъ случаѣ бѣлая, такъ какъ тамъ еще не образовались споры (табл. IV, рис. 3 и 4 — спороносныя гигантскія колоніи).

При посѣвѣ на желатину съ 5% сахара чертой мы тоже получаемъ складчатую культуру новаго грибка, отличающуюся отъ гладкой культуры *N. fulvescens*, что хорошо видно на фото-

1) H. Sydow, *Annales mycologici*. T. X, p. 348. 1912. — См. также Guilliermond, A. *Nouvelles observations sur la sexualité des levûres*. — *Archiv für Protistenkunde*. Bd. 28, p. 52. 1912.

2) Надсонъ, Г. А. „Половой процессъ у дрожжей.“ — „Русскій врачъ.“ 1911 г. № 51.

3) Составъ среды: на 100 гр. воды берется 1 гр. мясного экстракта Либиха, 1 гр. пептона, $\frac{1}{2}$ гр. NaCl, соды до слабощелочной реакціи и сюда прибавляется винограднаго сахара — $\frac{1}{4}$, 5 или 10 гр.

графин (табл. IV), гдѣ рядомъ представлены штриховыя культуры *N. fulvescens* (рис. 5) и *N. elongata* (рис. 6 и 7).

На желатинѣ съ $\frac{1}{4}\%$ сахара¹⁾ культуры обоихъ грибовъ почти одинаковы и имѣютъ видъ гладкихъ пластинокъ. На щелочномъ мясо-пептонномъ бульонѣ съ 5% сахара *N. fulvescens* даетъ очень нѣжную пленку, тогда какъ у *N. elongata* пленка довольно плотная и очень морщинистая.

Не такъ рѣзко бросается въ глаза микроскопическое различіе этихъ грибовъ, особенно ихъ вегетативныхъ клѣтокъ. *N. elongata*, также какъ и *N. fulvescens*²⁾, имѣетъ овальныя и лимonoобразныя клѣтки (рис. 2); различаются эти два вида только вели-




Рис. 1—8. Цикль развитія *Nadsonia elongata*.

чиной клѣтокъ: *N. elongata* имѣетъ въ шир. 6—8 μ ., длина достигаетъ 17 μ ., а *N. fulvescens* — шир. 4—7,5 μ ., длина — до 15 μ .

Передъ споруляціей форма клѣтокъ нѣсколько измѣняется — онѣ становятся болѣе вытянутыми; на рисункахъ 3 и 4 мы видимъ уже совсѣмъ цилиндрическія почин. Здѣсь яснѣе выступаетъ различіе между грибами, такъ какъ у *N. fulvescens* не бываетъ такихъ вытянутыхъ клѣтокъ.

1) Городкова, А. А. „О быстромъ полученіи споръ у дрожжевыхъ грибовъ.“ Извѣстія Имп. Сиб. Ботаническаго Сада. Т. VIII. 1908 г. Стр. 165.

2) Надсонъ, Г. А. и Конокотина, А. Г. „О новомъ родѣ дрожжевыхъ грибовъ... и т. д., I с., стр. 124, рис. 37 — цикль развитія *G. fulvescens*.

Далѣе, одна изъ этихъ цилиндрическихъ почекъ (микрогамета, но терминологіи Г. А. Надсона) копулируетъ со своею кѣткой-матерью — макрогаметой (рис. 5: с — микрогамета, b — макрогамета). Вслѣдъ за копуляціей, со стороны материнской кѣтки вырастаетъ новая почка (рис. 6-а), въ которую и переходить все содержимое, какъ микрогаметы, такъ и макрогаметы; почка эта превращается въ сумку и въ ней образуется одна спора (рис. 7-а). Сумки тоже вытянуты (рис. 8, 9) и, вообще, онѣ формой очень отличаются отъ круглыхъ сумокъ *N. fulvescens*. Впрочемъ, у *N. elongata*, наряду съ такими вытянутыми формами спорулирующихъ кѣтокъ, встрѣчаются также иногда сумки округлой формы, равно какъ и микрогаметы грушевидной формы, стало быть сходныя съ *N. fulvescens*.

Это обстоятельство дало мнѣ поводъ сначала даже занодо-




Рис. 9. *Nadsonia elongata* въ споровосной стадіи.

зрить чистоту культуры. Для рѣшенія вопроса культура новаго грибка была тщательно выведена изъ одной кѣтки. Сдѣлано это слѣдующимъ образомъ. Въ расплавленную желатину было внесено немного споръ *N. elongata*; затѣмъ желатина была вылита въ чашку Петри очень тонкимъ слоемъ; тамъ отмѣчена была одна, изолированно лежащая спора, въ сумкѣ типичной для *N. elongata* продолговатой формы. Когда спора проросла и дала цѣлую колонію, то изъ послѣдней была отѣяна въ пробирку новая культура. Но и эта, уже безусловно чистая, изъ одной кѣтки выведенная культура давала тѣ же измѣненія въ формѣ кѣтокъ при споруляціи.

Переходимъ теперь къ фізіологическимъ особенностямъ и отличіямъ *N. elongata*, проявляющимся въ процессы броженія. Субстратами для этихъ опытовъ служили щелочной мясо-нептонный бульонъ (составъ см. выше) и минеральная среда

Гайдук¹⁾. то и другое съ прибавкой сахара въ количествѣ 5—10%. Жидкость наливалась въ бродильную, V-образно изогнутую трубку, и застывалась дрожками изъ чистой культуры. Процессъ шелъ при обыкновенной комнатной температурѣ и наблюденіе производилось въ теченіе 20 дней.

Результаты были получены слѣдующіе: *N. elongata*, вообще, сбраживаетъ сахаръ гораздо слабѣе, чѣмъ *N. fulvescens*,²⁾ и притомъ не всѣ тѣ сахара, которые сбраживаетъ эта послѣдняя, какъ показываетъ слѣдующая таблица:

	декстроза	левулеза	галактоза	сахароза	мальтоза	лактоза
<i>N. fulvescens</i>	+	+	+	+	+	—
<i>N. elongata</i>	+	+	—	—	—	—

безъ инверс.

II. *Debaryomyces tyrocola*.

Изъ „голландскаго“ сыра русскаго приготовленія мною выдѣлено было нѣсколько формъ дрожжевыхъ грибовъ съ клѣтками круглой или овальной формы отъ 3 до 7 μ . въ діаметрѣ. Эти грибки живутъ на поверхности сыра, въ глубинѣ встрѣчаясь очень рѣдко. Они интересны по своей споруляціи, которой предшествуетъ актъ конуляціи. Принадлежать они къ роду *Debaryomyces*, въ качествѣ новаго вида, и названы мною *Debaryomyces tyrocola*.

Споры этихъ дрожжей при проростаніи сбрасываютъ оболочку сумки и становятся обыкновенными вегетативными клѣтками (рис. 1—4); далѣе размноженіе ихъ идетъ обычнымъ почкованіемъ: вегетативныя клѣтки круглой или овальной формы (рис. 5). Содержимое клѣтки даетъ іодную реакцію на гликогенъ; въ клѣткахъ имѣются и жировыя капли (на рис. 1—5 по одной крупной каплѣ въ клѣткѣ), которыя красятся суданомъ, хотя и слабо, и чернѣютъ отъ осмиевой кислоты.

Debaryomyces tyrocola въ сырѣ никогда споръ не даетъ, но при культивированіи на малосахарныхъ питательныхъ средахъ³⁾ легко наблюдать споруляцію. Такъ при носѣвѣ этихъ грибовъ на щелочную мясо-пептонную желатинну⁴⁾ безъ сахара

1) Lindner, P. „Assimilierbarkeit verschiedener Kohlehydrate durch verschiedene Hefen etc.“ — „Wochenschrift für Brauerei.“ 1911 г. № 47. — Составъ среды Гайдук: $MgSO_4$ —0,025 %, KH_2PO_4 —0,5 %, аспарагина — 0,5 %, + сахаръ.

2) G. A. Nadson und A. G. Konokotin. „Guilliermondia... etc.“ I. c., p. 8.

3) Городкова, А. А. I. c., стр. 165.

4) Составъ питательныхъ средъ тотъ же, что былъ указанъ выше.

или съ прибавленіемъ лишь $\frac{1}{4}\%$ глюкозы, они даютъ споры на 4—5 день при комнатной температурѣ. Если увеличить количество сахара до 1 или 2%, то начало спорообразования затягивается на срокъ до 2 $\frac{1}{2}$ недѣль, а на субстратахъ съ 5% глюкозы споры появляются только къ концу 2-го мѣсяца и то въ незначительномъ количествѣ. На гипсовыхъ пластинкахъ, смоченныхъ водо-




Рис. 1—26. История развитія *Debaryomyces tyrosicola*.

проводной водой, споры появляются на 4—5 день при комнатной температурѣ, а также и въ термостатѣ при 27° С.

Спорулирующія клетки всегда бываютъ соединены или со своей маленькой почкой (рис. 6, 9, 13, 14, 17, 19), или посредствомъ копуляціоннаго канала съ другой клеткой (рис. 7, 8, 11, 12, 15). Иногда клетка, въ поискахъ за копуляціей, даетъ два и даже три выроста; наконецъ одинъ изъ нихъ сталкивается съ

другой клѣткой и тогда происходитъ копуляция, а за ней и споруляция (рис. 10, 16, 18, 20); но бываетъ и такъ, что такая клѣтка съ выростами не копулируетъ, въ такомъ случаѣ она не даетъ и споръ.

Такимъ образомъ, у *Debaryomyces tyrosola* не наблюдалось партеногенетическаго образованія споръ, какъ то описано у родственныхъ ему организмовъ¹⁾, напримѣръ — у *Debaryomyces globosus* Клѣккера,²⁾ у дрожжей „Е.“ и „F.“ Л. Розе,³⁾ у *Torulaspora Delbrückii* Линднера⁴⁾ и у *Saccharomyces lactis* γ Домбровскаго.⁵⁾

Среди упомянутыхъ грибовъ, *Debaryomyces globosus*, выдѣленный Клѣккеромъ изъ земли острова св. Томы, болѣе другихъ сходенъ съ нашимъ организмомъ, такъ какъ онъ, рядомъ съ партеногенезомъ, обладаетъ также гетерогамной и изогамной копуляціей.⁶⁾ У дрожжей „Е.“ и „F.“ Людвигъ Розе находилъ мало копулирующихъ клѣтокъ и большей частью споры получались безъ предварительной копуляціи. Гильермонъ⁷⁾, однако, совершенно отрицаетъ копуляцію у этого грибка; онъ говоритъ, что хотя и наблюдаются иногда споры у клѣтокъ, какъ будто соединенныхъ копуляціоннымъ каналомъ, но, на самомъ дѣлѣ, копуляціи здѣсь не происходитъ, ибо никогда не исчезаетъ перегородка между этими двумя клѣтками; такимъ образомъ здѣсь онъ исключительно признаетъ партеногенезъ. Линднеръ, вообще, очень мало говоритъ о своей *Torulaspora Delbrückii*, а о копуляціи у нея совсѣмъ ничего не упоминаетъ. Домбровский, хотя и наблюдалъ выросты у клѣтокъ *Saccharomyces lactis* γ, но не связываетъ ихъ образованіе съ копуляціей, полагая, что такія клѣтки суть ненормальныя формы, развившіяся при неблагопріятныхъ условіяхъ питанія. Гильермонъ⁸⁾ же считаетъ, что *Torulaspora Delbrückii*, какъ и

1) Для нагляднаго сравненія организмовъ, близкихъ къ *Debaryomyces tyrosola*, въ концѣ статьи приложена таблица.

2) Klöcker, A. „Deux nouveaux genres de la famille des Saccharomyces.“ — C. R. des travaux du Lab. de Carlsberg. Vol. 7. livr. 4. 1909, p. 273.

3) Rose, L. „Beiträge zur Kenntnis der Organismen im Eischenschleimfluss.“ Inaugural-Dissertation der Universität Berlin, 1910, p. 41.

4) Lindner, P. Mikroskopische Betriebskontrolle in den Gärungsgewerben. IV. Aufl. 1905, p. 421.

5) Dombrowski, W. „Die Hefen in Milch und Milchprodukten.“ — Centralblatt für Bakteriologie etc. II. Abt., Bd. 28. 1910. № 12/15, p. 369.

6) Надсоевъ, Г. А. I. с., стр. 25.

7) Guilliermond, A. „Sur la régression de la sexualité chez les levûres.“ — C. R. Soc. d. Biol. Paris. LXX, 1911 r., p. 277.

8) Guilliermond, A. Les Levûres. 1912. p. 327.

Saccharomyces lactis ?; образуя споры партеногенетически, сохраняютъ, однако, признаки утеряннаго полового процесса въ видѣ выростовъ (копуляціонные каналы), которые появляются у кѣтокъ передъ споруляціей, но теперь уже не функціонируютъ.

Проведя параллель между *Debaryomyces tyrosola* и близкими ему организмами, остановимся подробнѣе на копуляціи у этого грибка. Наблюденіе мною производилось въ капелькѣ щелочнаго мясо-пептоннаго бульона, разбавленнаго пополамъ водою; такое разбавленіе дѣлалось для того, чтобы грибокъ не размножался




Рис. 27—39. Копуляція и спорообразованіе у *Debaryomyces tyrosola*.

сильно и тѣмъ не затруднялъ бы наблюденія; съ тѣмъ же расчетомъ въ бульонъ не прибавлялось сахара. Въ капельку вносились темнаго вегетативныхъ кѣтокъ изъ молодой чистой культуры и капелька заключалась между покровнымъ и предметнымъ стеклышками, а по краямъ замазывалась вазелиномъ. Капельку нужно брать маленькую, такъ чтобы между стеклышками и рамкой изъ вазелина оставался еще воздухъ.

Дней 7—8 дрожжи, хотя и слабо, размножаются, но къ началу второй недѣли почкованіе почти совсѣмъ прекращается и кѣтки начинаютъ копулировать.

Подъ микроскопомъ процессъ копуляціи наблюдался мною шагъ за шагомъ на опредѣленныхъ группахъ клѣтокъ: на рис. представлены четыре группы: 27—29; 30—33; 34—36; 37—39; такимъ образомъ, изображенная на рис. 27 группа клѣтокъ черезъ нѣкоторое время на моихъ глазахъ приняла видъ, представленный на рис. 29; группа 30-ая послѣдовательно перешла въ 33-ю и т. д. На рисункахъ буквой „а“ обозначается материнская клѣтка, „b“ — ея почки и „с“ — клѣтки, происшедшія отъ „b“.

Здѣсь встрѣчается большей частью недогомная копуляція, въ смыслѣ Г. А. Надсона¹⁾, т. е. между материнской клѣткой и только что отъ нея обособившейся дочерней; рис. 34—36; 37—39.

Иногда бываетъ и такъ, что материнская и дочерняя клѣтки дадутъ сначала каждая по почкѣ, и только послѣ этого копулируютъ между собой (рис. 30—33). Рѣже встрѣчается „адельфогамія“ (по Г. А. Надсону),²⁾ когда копулируютъ клѣтки сестры, происходящія отъ одной материнской клѣтки (рис. 27—29). Наблюдалось еще и такъ: клѣтка даетъ почку, та въ свою очередь даетъ тоже почку, и копуляція происходитъ между первой и третьей клѣткой.

Обыкновенно, копулирующія клѣтки бываютъ различной величины: меньшая — микрогамета (мужская) и большая — макрогамета (женская). Рѣже встрѣчаются гаметы равной величины. Споры образуются всегда только въ одной изъ копулирующихъ клѣтокъ, именно въ макрогаметѣ, чѣмъ грибокъ и отличается отъ *Debaryomyces globosus*, споры у котораго часто образуются въ каждой изъ гаметъ. Въ сумкѣ большей частью бываетъ только одна спора, рѣдко двѣ. Иногда у споръ наблюдается мелко-бугристая оболочка, подобно тому, какъ бываетъ у *Debaryomyces globosus* (у него болѣе постоянный признакъ), но это далеко не всегда, обыкновенно же оболочка споръ совершенно гладкая.

Спороносныя культуры, въ зависимости отъ окраски споръ, принимаютъ сѣробоуроватый цвѣтъ, тогда какъ культуры вегетативныхъ клѣтокъ совершенно бѣлаго цвѣта.

Чтобы закончить съ морфологіей, нужно еще замѣтить, что *Debaryomyces tyrosola*, въ старыхъ культурахъ, преимущественно съ 5% глюкозы, даетъ сильно увеличенныя клѣтки, достигающія 8—10 μ . въ діаметрѣ. Интересна особенность въ строеніи ихъ оболочекъ. Многія изъ этихъ инволюціонныхъ клѣтокъ имѣютъ вторичную, спадающую оболочку, — какъ будто клѣтка, разрастаясь, разрываетъ старую тѣсную оболочку и сбрасываетъ

1) Надсонъ, Г. А. I. с., стр. 13 отд. отт.

2) Надсонъ, Г. А. I. с., стр. 13.

ее, а новая, болѣе эластичная, позволяетъ клѣткѣ увеличиваться въ объемъ (рис. 24—26). Такія крупныя клѣтки обыкновенно содержатъ незначительное количество протоплазмы, которая располагается постѣннымъ слоемъ; здѣсь же имѣются довольно крупныя канли ядра; остальная часть клѣтки занята огромной вакуолей.

Перехожу теперь къ физиологін грибка. Опыты на броженіе ставились по методу, указанному выше (стр. 36), и дали такой результатъ: *Debaryomyces tyrosola* не сбраживаетъ ни одного изъ испытанныхъ мною сахаровъ. Были испробованы: декстроза, левулеза, галактоза, мальтоза, лактоза и сахароза; послѣдняя однако инвертируется этимъ грибомъ, какъ показала намъ реакція съ жидкостью Фелинга. Въ доказательство этого былъ произведенъ такой опытъ: взято три V-образно изогнутыхъ бродильныхъ трубки съ щелочнымъ мясо-пептоннымъ бульономъ + 5% сахарозы (тростн. сахар.); въ одну была засѣяна *Debaryomyces tyrosola*, въ другую — *Nadsonia elongata*, которая не сбраживаетъ сахарозы, но сбраживаетъ декстрозу и левулезу, въ третью трубку были засѣяны оба грибка вмѣстѣ. Въ первыхъ двухъ трубкахъ не было броженія, въ третьей — было. Ясно, что броженіе для *Nadsonia elongata* было возможно лишь благодаря предварительной инверсии сахара, произведенной *Debaryomyces tyrosola*.

Также опыты, произведенные по методу Линднера¹⁾ (броженіе въ канлѣ) подтвердили, что *Debaryomyces tyrosola* не сбраживаетъ упомянутыхъ сахаровъ. Производились эти опыты такъ: на предметное стекло съ углубленіемъ вносилося нѣкоторое количество стерильной водопроводной воды, испытываемаго сахара въ сухомъ видѣ и дрожжей изъ чистой культуры; стекло покрывалось покровнымъ стеклышкомъ осторожно, чтобы туда не попало ни одного пузырька воздуха, потомъ замазывалось вазелиномъ. Для контроля одинъ препаратъ дѣлался съ дрожжами, сбраживающими данный сахаръ. Появленіе пузырьковъ газа въ послѣднемъ случаѣ (въ контрольномъ препаратѣ) указывало на броженіе, тогда какъ у *Debaryomyces tyrosola* такихъ пузырьковъ не было.

Эти дрожжевые грибки, очевидно, довольно распространены въ природѣ, такъ какъ я выдѣляла ихъ не только изъ петербургскихъ сыровъ, но также изъ сыра, который готовится въ Смоленской губерніи. Мною выдѣлено было четыре расы, очень близкія по строенію клѣтокъ и исторіи развитія, но имѣющія, тѣмъ

1) Lindner, P. Mikroskopische Betriebskontrolle in den Gärungsgewerben. IV. Aufl. 1905, p. 231.

Сравнительная таблица организмовъ, близкихъ къ *Debaryomyces*.

	М о р ф о л о г і я.						
	Величина кѣлки.	Форма кѣлки.	Копуляція.	Спорооб- разова- ніе.	Величина споры.	Количество споръ въ сумкѣ.	Видъ оболочки споры.
<i>Debaryomyces tyrocola</i> α Konok.	3—4 μ	Овальн. или круглая.	+	+	2,5 μ	Одна, рѣдко двѣ.	Мелкобу- грстая или гладк.
<i>Debaryomyces tyrocola</i> β Konok.	4—6 μ	То же.	+	+	2,5—3 μ	То же.	То же.
<i>Debaryomyces tyrocola</i> γ Konok.	4—6 μ	То же.	+	+	То же.	То же.	То же.
<i>Debaryomyces tyrocola</i> δ Konok.	5—7½ μ	То же.	+	+	То же.	То же.	То же.
<i>Debaryomyces globosus</i> Klöcker.	4,5—5 μ	Круглая.	Есть, но не обязат.	+	То же.	Одна или двѣ.	Бугрист.
<i>Schwanniomycetes occi- dentalis</i> Klöcker.	5—10 μ	Круглая, эл- липсод.	—	+	2—3,5 μ	Одна или двѣ.	Бугрист.
Дрожжи „Е“ & „F“ Ludwig Rose .	3,5—4,5 μ	Круглая.	—	+	3 μ	Одна или двѣ.	
<i>Saccharomyces lactis</i> γ W. Dombrowski	5—6,5 μ × 5 μ	Яйцевидная или кругл.	—	+		То же.	
<i>Torulaspora Delbrückii</i> Lindner.		Круглая.	—	+		То же.	
<i>Torula lactis</i> α W. Dom- browski	3,8—7,5 μ × 3,1—5 μ	Яйцевидная.	—	—			
<i>Torula lactis</i> β W. Dom- browski	5—7,9 μ × 4,25—4,5 μ	Круглая, эл- липсодн., яйцевидн., длинная.	—	—			
<i>Torula lactis</i> γ W. Dom- browski	3,5 μ	Яйцевидная.	—	—			
<i>Torula lactis</i> δ W. Dom- browski	2,5—4,1 μ	Круглая.	—	—			
<i>Torula lactis</i> ε W. Dom- browski	3,1—5,6 μ	То же.	—	—			
<i>Torula tyrocola</i> Beijerinck		Круглая.	—	—			

urocola, по особенностямъ морфологическимъ или физиологическимъ.

Инволюція.	Видъ культуры на тверд. пита- тельн. суб- стратахъ.	Б р о ж е н і е.										Мѣсто- нахождение.	
		Декстроза.	Левулеза.	Галактоза.	Сахароза.	Лактоза.	Мальтоза.	Манноза.	Трегалеза.	Раффиноза.	Инулинъ.		Въ осадкѣ, или въ по- верхностной плѣнкѣ или въ разлитіи.
Кругл., боль- шія клетки до 10 μ .	Гладк. пла- стинка съ блестящей поверхн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Въ осадкѣ.	„Голландскій“ сыръ Петербур- гскаго и Смолен- скаго пригото- вл.
То же.	То же.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	То же.	То же.
То же.	Гладк. пла- стинка съ матовой поверхн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Образуетъ нѣжную плѣнку.	То же.
То же.	То же.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	То же.	То же.
Кругл., боль- шія клетки до 7—8 μ .	Восковидная, блест. по- верхность.	+	+	—	+	—	—	—	—	+	+	—	Въ землѣ остр. Св. Фомы.
	То же.	+	+	—	+	—	—	—	—	+	+	—	То же.
		+	+	—	+	—	—	—	—	+	+	—	Изъ слезы дуба (слизетеченіе).
		+	—	+	+	—	—	—	—	+	+	—	Изъ молочной за- кваски.
		+	+	+	—	—	—	—	—	+	—	—	Пиво.
		+	+	+	+	+	—	—	—	—	—	Верхнее бро- женіе.	Изъ Армянскаго мацуна.
		+	+	+	+	+	—	—	—	—	—	Нижнее бро- женіе.	
		+	+	+	+	+	—	—	—	—	—	Верхнее бро- женіе.	Кефиръ.
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Кольцо.	Молочные про- дукты.
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	То же.	То же.
		+	+	+	+	+	—	—	—	—	—	Кольцо и нѣжн. плѣнка	Сыръ.

не менѣе, постоянныя, хотя и второстепенныя отличительныя признаки, на основаніи чего этотъ видъ дряжжеи и раздѣлѣнъ мною на четыре расы; я ихъ называю греческими буквами — α , β , γ , δ . Двѣ изъ нихъ, „ α “ и „ β “, на твердыхъ субстратахъ (щелочная мясочентонная желатина + 5% глюкозы) даютъ гигантскія колоніи съ блестящей поверхностью (табл. IV, рис. 11—12), при культивированіи же въ жидкихъ питательныхъ субстратахъ (щелочной мясочентонный бульонъ + 5% глюкозы) развиваются больше въ осадкѣ. Другіе отъ друга онѣ отличаются только по величинѣ клѣтокъ: діаметръ „ α “ 3—4 μ , „ β “ 4—6 μ . Другія же, „ γ “ и „ δ “ — на твердыхъ субстратахъ даютъ матовыя колоніи (табл. IV, рис. 13—14), а на жидкихъ средахъ образуютъ поверхностную пленку; различаются между собой тоже только по величинѣ клѣтокъ: „ γ “ 4—6 μ , „ δ “ 5—7,5 μ . Кромѣ того, „ γ “ и „ δ “ заназдываютъ споруляціей, сравнительно съ „ α “ и „ β “, и даютъ, вообще, меньшій процентъ споръ, чѣмъ эти послѣднія, что можно замѣтить уже макроскопически, ибо, чѣмъ больше споръ, тѣмъ культура становится темнѣе. Разница во виѣншемъ видѣ штриховыхъ культуръ на желатинѣ съ $\frac{1}{4}$ % глюкозы видна на прилагаемыхъ фотографіяхъ (табл. IV, рис. 8, 9 и 10 — раса „ γ “, 15 — „ β “).

Работа эта исполнена въ Ботанической Лабораторіи Спб. Женск. Медицинскаго Института подъ непосредственнымъ руководствомъ профессора Г. А. Надсона, за что приношу ему мою глубокую благодарность; некрещю благодарю также г.г. ассистентовъ А. А. Бачинскую и С. М. Вислоуха за совѣты, а В. П. Форостовскаго за фотографіи, сдѣланныя имъ для моей работы.

(Изъ Ботан. Лабор. Спб. Женск. Мед. Института; № XXIX.)

Объясненіе таблицы IV.

Рис.	1.	<i>Nadsonia fulvescens</i>	10-суточные гигантскія колоніи на
„	2.	<i>Nadsonia elongata</i>	Щ. М. П. желатинѣ + 5% глюкозы.
„	3.	<i>N. fulvescens</i>	3-недѣльные гигантскія колоніи на томъ-же
„	4.	<i>N. elongata</i>	субстратѣ.
„	5.	<i>N. fulvescens</i>	10-суточные культуры штрихомъ на томъ-
„	6, 7.	<i>N. elongata</i>	же субстратѣ.
„	8, 9, 10.	<i>Debaryomyces tyrosola</i> γ .	3-недѣльная культура штрихомъ на Щ. М. П. желатинѣ + $\frac{1}{4}$ % глюкозы.
„	11, 12.	<i>D. tyrosola</i> β	3-недѣльные гигантскія колоніи на Щ. М. П.
„	13, 14.	<i>D. tyrosola</i> γ	желатинѣ + 5% глюкозы.
„	15.	<i>D. tyrosola</i> β .	3-недѣльная культура штрихомъ на Щ. М. П. желатинѣ + $\frac{1}{4}$ % глюкозы.




1

2




11

12



3

4



13

14



5

6

7



8

9

10



15

*A. G. Konokotina.*Über die neuen Hefepilze mit heterogamer Kopulation — *Nadsonia* (*Guilliermondia*) *elongata* und *Debaryomyces tyrocola*.

(Résumé.)

I. Nadsonia elongata.

Aus dem Birkenschleimfluss wurde im Gouv. Smolensk ein neuer Hefepilz isoliert, der zur Gattung *Nadsonia* (*Guilliermondia*) gehört, sich jedoch vom ersten Vertreter dieser Gattung, *N. fulvescens* durch einige beständige morphologische und kulturelle, sowie physiologische Merkmale unterscheidet und dadurch als neue Art *N. elongata* festgestellt wurde.

Die vegetativen Zellen dieses Pilzes sind oval (Fig. 2; S. 34); vor der Kopulation werden sie mehr länglich (Fig. 3—7, 9). Die Kopulation geschieht zwischen der Mutterzelle (Makrogamete, Fig. 5 b) und der von ihr soeben abgetrennten Knospe (Mikrogamete, Fig. 5 c.). Darauf wächst auf der Makrogamete eine neue Knospe (Fig. 6 a), in welche der ganze Inhalt der Makro- und Mikrogamete übergeht; in jener Knospe (= Ascus) entsteht die Spore (Abb. 7: a — Ascus mit Spore, b u. c — die entleerten Mikro- u. Makrogamete). Die Hülle der reifen Spore ist leicht höckerig (Fig. 1, 8, 9). Beim Keimen wirft die Spore die Ascushülle ab und wird selbst zur vegetativen Zelle (Fig. 1). Die Riesenkolonien dieses Pilzes auf 5% Glukose enthaltender alkalischer Fleischpepton-Gelatine haben, im Unterschiede von den Riesenkolonien der *N. fulvescens* (Taf. IV., Fig. 1, 3), das Aussehen einer faltigen Rosette (Taf. IV., Fig. 2, 4); die Farbe der Kolonie ist in der Mitte braun (von der Sporenfärbung abhängig), an der Peripherie weiss, weil sich dort noch keine Sporen gebildet haben. Die Fig. 5, 6, 7 der Taf. IV stellen die Strichkulturen auf der $\frac{1}{4}$ % Glukose enthaltenden alkal. F. P.-Gelatine dar (5 — *N. fulvescens*, 6 und 7 — *N. elongata*). *N. elongata* vergäht Dextrose und Lävulose, jedoch nicht Galaktose, Saccharose, Maltose und Laktose.

II. Debaryomyces tyrocola.

Aus dem in Russland angefertigten „holländischen“ Käse wurde ein neuer Hefepilz isoliert (Fig. 1—26 auf d. Seite 37), der nach

seinem Bau und seiner Entwicklung dem *Debaryomyces globosus* Klöcker nahe steht; er ist als neue Art — *Debaryomyces tyrocola* festgestellt worden.

Dieser Pilz weist vor der Sporenbildung eine heterogame Kopulation auf (Fig. 6—20). Die Kopulation geschieht zwischen der Mutterzelle (Makrogamete) und der von ihr abgetrennten Knospe (Mikrogamete) (Fig. 30—33, 34—36, 37—39; a — Mutterzelle, b — ihre Knospe, c — die Knospe der b-Zelle); es kommt also hier eine Paedogamie im Sinne Nadson's vor. Kopulationen zwischen den Schwesterzellen (d. h. Adelphogamie im Sinne Nadson's) bekommt man seltener (Fig. 26—27). Aus den Abbildungen ist ersichtlich, dass die Spore sich stets nur in der grösseren Zelle, d. h. in der Makrogamete bildet.

Debaryomyces tyrocola gibt in alten Kulturen auch Involutionenformen, die grössere Dimensionen erreichen; man beobachtet oft bei ihnen ein interessantes Abwerfen des äusseren Hüllenteils (Fig. 21—26). Fig. 1—4, S. 37 stellen Sporenkeimungen dar. Der Pilz vergäht keine der von mir untersuchten Zuckerarten (Dextrose, Lävulose, Galaktose, Saccharose und Laktose); Saccharose wird jedoch invertiert. — Es wurden 4 Rassen dieses Pilzes isoliert, die mit α , β , γ und δ bezeichnet wurden; sie unterscheiden sich von einander durch die Grösse der Zellen und durch ihre Kulturen (Taf. IV., Fig. 8—15).

(Aus dem Botanischen Laboratorium der medizinischen Hochschule für Frauen zu St. Petersburg; № XXIX.)

Б. В. Перфильевъ.

Илосось для собиранія донной микро-флоры и фауны.

При добываніи поверхностнаго полужидкаго ила, необходимаго для изслѣдованія микроскопической флоры и фауны дна мелкихъ водоемовъ, рекомендуется¹⁾ пользоваться иловымъ насосомъ (Schlammsauger) предложеннымъ О. Захаріасомъ. (Подробное описаніе и рисунокъ помѣщены въ *Biolog. Centralbl.* 1903 г. стр. 85).

Очень несложный приборъ Захаріаса состоитъ изъ латунной, или, какъ рекомендуетъ К. Гильзенъ, толстостѣнной стеклянной трубки въ 40 см. длины, 2,5 см. въ діаметръ, прикрѣпленной къ шесту или трости. Внутри трубки находится поршень, движеніемъ котораго и всасывается иль. Поршень насаженъ на стержень, проходящій черезъ верхнее отверстіе трубки. Къ концу стержня привязывается шнурокъ съ кольцомъ, при тягѣ за который поднимается поршень. Снизу къ поршню прикрѣплена струна съ шаровидной деревянной или каучуковой пробкой на концѣ; длина струны разсчитана такимъ образомъ, что когда поршень при вытягиваніи его вверхъ достигнетъ крышки трубки, то пробка плотно запираетъ трубку снизу.

Приборомъ пользуются, опустивъ его до дна въ наклонномъ положеніи съ выдвинутымъ до нижняго конца трубки поршнемъ.

Осторожно натягивая шнурокъ, поднимаютъ поршень, пока онъ не упрется въ верхнюю крышку трубки, причемъ подвѣзанная къ поршню снизу пробка закупориваетъ трубку. Послѣ этого аппаратъ вынимаютъ и переливаютъ взятую пробу (80—100 куб. см.) въ приготовленную баночку соотвѣтственной величины.

Приборъ Захаріаса стоитъ у Цвикерта, въ Килѣ, 12,5 марокъ. Помимо такой относительно высокой стоимости, приборъ этотъ неудобенъ тѣмъ, что пользоваться имъ можно

¹⁾ „Инструкція для изслѣдованія озеръ“ Имп. Русск. Геогр. Общ. 1908 г. стр. 208, 257.

только въ соединеніи съ шестомъ, осложняющимъ обращеніе съ приборомъ и портативность его. Другое неудобство составляетъ привязанная снизу къ порцию пробка, которая иногда запутывается въ коряжистомъ днѣ и даже отрывается. Необходимое переливаніе пробы изъ насоса въ банку замедляетъ работу и можетъ губительно отозваться на пѣжныхъ микроорганизмахъ.


Этихъ недостатковъ лишена предлагаемая здѣсь очень простая конструкція плового насоса, основанная на новомъ принципѣ, чѣмъ приборъ Захаріаса.



Какъ видно изъ приложенныхъ фотографій и схематическаго чертежа (фиг. 1,2) приборъ состоитъ изъ обращенной вверхъ широкой U-образной трубки изъ оцинкованнаго желѣза; длинное ея колено косо срѣзано, а черезъ короткое пропущена вверхъ мѣдная трубка меньшаго діаметра, на которую надѣвается каучуковая трубка соответствующей глубинѣ опусканія длины. Ради удешевленія, для устройства прибора можно воспользоваться, какъ это и сдѣлано въ моемъ экземплярѣ, обыкновенными водо-

проводными трубками и угольниками къ нимъ, имѣющимъ готовыя наръзки. Какъ видно изъ фиг. 2, U-образная трубка, благодаря наръзкамъ, легко развинчивается, что важно для содержанія прибора въ надлежащей чистотѣ.

Короткое коѣно U-образной трубки, снабженное снаружи резиновой обкладкой, плотно вставляется въ горло стеклянной банки, въ которой взятая проба остается для дальнѣйшаго храненія, и приборъ готовъ къ дѣйствию. Зажавъ посредствомъ зажима или пальцами конецъ каучуковой трубки, плосось опуска-



ють на шнуркъ до дна, послѣ чего на нѣсколько секундъ открываютъ трубку. Вслѣдствіе давленія вышележащихъ слоевъ воды полужидкій поверхностный илъ устремляется въ отверстіе сѣвальной трубки, вытѣсняя воздухъ черезъ открытую резиновую трубку, и заполняетъ банку. Вынувъ затѣмъ приборъ на поверхность, остается запечатать и этикетировать снятую съ плососа банку съ пробой. Приборъ предназначенъ для мелкихъ водоемовъ и пока быть съ уснѣхомъ испытанъ на глубинахъ до пяти метровъ.

Можно обойтись и безъ резиновой трубки, что важно при работѣ зимой, когда она быстро промерзаетъ. Достаточно, какъ подтвердилъ опытъ, затыкать отверстіе трубки, выпускающей воз-

духъ, привязанной къ шнуру пробкой и выдергивать ее, когда приборъ коснется дна. Въ этомъ случаѣ шестъ становится необходимымъ и нельзя регулировать скорость наполненія.

Мой плососъ, какъ и приборъ Захаріаса, гарантируетъ, что проба взята съ желаемой глубины и при опредѣленныхъ условіяхъ. Преимущество его заключается въ большей скорости и чистотѣ работы: отъ одного нажатія пальца проба поступаетъ непосредственно въ баночку, въ которой и остается до изслѣдованія. Благодаря тому, что взятіе пробы является дѣломъ одной минуты, возможно частое добываніе образцовъ. Описанный металлическій приборъ, который можетъ сдѣлать по данному чертежу любой слесарный мастеръ, значительно дешевле плососа Захаріаса. Стоимость моего прибора будетъ ничтожной, если, съ нѣкоторымъ ущербомъ для его прочности, воспользоваться стеклянными трубками, пропущенными черезъ каучуковую пробку, какъ показано на фиг. 3. Но, въ такомъ видѣ приборъ легко сломать.

B. Perfiliev.

Ein Schlamm-sauger zur Gewinnung der Boden-Mikro-Flora und -Fauna.

(Résumé.)

Um halbflüssigen Schlamm aus kleinen Tiefen zu bekommen benutzt man den Schlamm-sauger von Dr. Zacharias (ausführliche Beschreibung und Zeichnung im Biol. Centralbl. 1903, S. 85). Abgesehen von seiner Kostspieligkeit (12,5 Mk.) weist der Apparat von Zacharias eine ganze Reihe Mängel auf, welche in dem hier vorliegenden sehr einfach construirten Schlamm-sauger beseitigt worden sind: derselbe hat ein anderes Princip zur Grundlage als der Zacharias'sche. Wie aus Fig. 1 und 2 ersichtlich ist, besteht der Apparat aus einem nach unten gerichteten breiten U-ähnlichem metallischen Rohr, dessen langes knieförmiges Ende schräg abgeschnitten ist. Durch das kürzere Knie ist ein Rohr von geringerer Breite nach oben durchgeführt, auf welches ein Gummirohr von der Länge, die der bearbeiteten Tiefe entspricht, aufgezogen wird. Das kürzere mit dem äusseren Gummi-Umschlage versehene Ende des Apparates wird in den Hals der Glasbüchse, woselbst die Probe bis zur weiteren Aufbewahrung bleibt,

dict hineingestellt. Nach der Einklemmung des Gummirohrs lässt man den Schlamm-sauger auf einer Schnur bis zum Boden hinunter, worauf dann das Rohr geöffnet wird. Durch den Druck der höher liegenden Wasserschichten wird die Büchse vermittels des U-ähnlichen Rohres mit halbflüssigem oberflächlichen Schlamm gefüllt. Der Vorzug meines Apparates besteht in grosser Schnelligkeit und Sauberkeit der Arbeit. Ausserdem stellt er sich viel billiger, als der Apparat von Dr. Zacharias.

К. Косинскій.

**Dianthus barbatus L. \times D. superbus L. = Dianthus Courtoisii Rehb.
въ Костромской губерніи.**

11 іюля 1912 г. въ Буйскомъ уѣздѣ Костромской губерніи въ запущенномъ паркѣ имѣнія „Каблуково“ мною было найдено нѣсколько экземпляровъ гвоздики (*Dianthus*), по формѣ листьевъ, соцветія, прицветныхъ чешуй и лепестковъ занимающей промежуточное мѣсто между встрѣчающимися въ уѣздѣ *Dianthus barbatus* L. (упомянутый паркъ) и *D. superbus* L. и представляющей, очевидно, помѣсь между названными видами. Такая помѣсь извѣстна для различныхъ мѣстъ Западной Европы. Впервые она была описана для Бельгіи подъ названіемъ *Dianthus Courtoisii* Rehb. (Reichenbach, *Flora germanica excursoria* 1830—1832, p. 806). Затѣмъ она наблюдалась Людвигомъ Лейтгебомъ въ Нижней Австріи въ саду близъ Göttweig'a и описана Рейхардтомъ подъ названіемъ *Dianthus Leitgebii* Reichardt. (*Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, 1873, XXIII Band, S. 561). Въ этомъ послѣднемъ случаѣ удалось съ несомнѣнностью установить гибридную природу растенія, такъ какъ въ саду кромѣ него росли также *Dianthus barbatus* и *D. superbus*. Для Германіи и Австріи приводятся слѣдующія мѣстонахожденія *Dianthus Leitgebii* Reichardt: 1) Берлинъ, 2) Бранденбургъ, 3) Померанія, 4) Гарцъ, 5) Фрейбургъ и 6) Нижняя Австрія (Göttweig), и для большинства случаевъ констатируется опыленіе *D. superbus* пыльцой *D. barbatus* (Ascherson, *Sitzungsberichte der Gesellschaft Naturforschender Freunde*, Berlin, 1877, S. 177—183). Извѣстенъ еще третій синонимъ — *Dianthus Wolfii* Vetter, но, къ сожалѣнію, относительно него я не нашелъ литературныхъ данныхъ въ библиотекѣ С-Петербургскаго Ботаническаго Сада.

Найденные въ Буйскомъ уѣздѣ экземпляры выросли по соѣдству съ *Dianthus barbatus*, поэтому ихъ можно разсматривать какъ *D. barbatus* ♀ \times *superbus* ♂, и это тѣмъ болѣе вѣроятно,

что при такомъ скрещиваніи, какъ показываютъ опыты, съмена получаютъ болѣе всхожія и въ большемъ числѣ (до 80% нормальнаго числа), чѣмъ въ случаѣ *D. superbus* ♀ × *barbatus* ♂, по внѣшнему же виду обѣ формы одинаковы (Wilhelm Olbers Focke. Die Pflanzen-Mischlinge. Berlin, 1881, S. 56). Признаки




Рис. 1. Листья.



Рис. 2. Лепестки.




Рис. 3. Прицвѣтныя чешуйки.

Dianthus barbatus, *D. barbatus* ×, *D. superbus*, *D. superbus*.

Буйскихъ экземпляровъ въ общемъ подходятъ подъ описанія *Dianthus Courtoisii* Rehb. и его синонима, *D. Leitgebii* Reichardt. Все это позволяетъ считать найденную гвоздику за *Dianthus Courtoisii* Rehb. и отмѣтить эту находку, такъ какъ, на сколько мы извѣстно изъ данныхъ литературы, видъ этотъ не былъ ука-

занъ для Россіи. Въ заключеніе приношу глубокую благодар-
ность Б. А. Федченко за его содѣйствіе въ опредѣленіи упомя-
нутой гвоздики.

23 февраля 1913 г. С.-Петербургъ.

C. Kossinsky.

**Dianthus barbatus L. \times D. superbus L. = Dianthus Courtoisii Rehb.
au gouvernement de Kostroma.**

(Résumé.)

L'hybride *Dianthus barbatus* L. \times *D. superbus* L. décrit pour la première fois pour la Belgique sous le nom de *Dianthus Courtoisii* Rehb. (Reichenbach, *Flora germanica excursoria* 1830—1832, p. 806) et indiqué pour les autres endroits de l'Europe occidentale (Allemagne, Autriche) (Ascherson, *Sitzungsberichte der Gesellschaft Naturforschender Freunde*, Berlin, 1877, S. 177—183) n'était pas connu jusqu'à présent pour la Russie. Le 11/VII 912 l'auteur de cette note a trouvé au district de Buj du gouvernement de Kostroma dans un vieux parc, où croissait aussi le *D. barbatus* L., quelques exemplaires de *Dianthus*, dont l'inflorescence, les pétales, les écailles calicinales et les feuilles lui permettent de les considérer comme le *Dianthus Courtoisii* Rehb. Le dessin ci-joint illustre la nature hybride de la plante trouvée.

23 II. 913. St.-Petersbourg.

Сообщенія изъ Императорскаго Ботаническаго Сада.

Его Величество Государь Императоръ, въ сопровожденіи Августѣйшихъ Дочерей, Великихъ Княженъ Ольги Николаевны, Маріи Николаевны и Анастасіи Николаевны, соизволилъ посѣтить 22 марта 2-ю Всероссійскую Кустарную выставку, устроенную на территоріи Сада въ новомъ зданіи Гербарія и Библіотеки и временной деревянной пристройкѣ къ нему. Въ то же время прибыли на выставку Великая Княгиня Ольга Александровна и Княжна Ирина Александровна и раньше еще Его Величество Принцъ Петръ Александровичъ Ольденбургскій и Главноуправляющій Землеустройствомъ и Земледѣліемъ Статсъ-Секретарь А. В. Кривошеинъ и Товарищъ Главноуправляющаго Графъ П. Н. Игнатьевъ.

Въ виду предстоящаго, въ скоромъ времени, празднованія 200-лѣтняго юбилея Сада, послѣднимъ разосланы разнымъ учрежденіямъ соответствующія извѣщенія и приглашенія.

Къ юбилею Сада печатается обширное изданіе, въ 3-хъ частяхъ, съ многочисленными таблицами и рисунками, подъ заглавіемъ „Императорскій С.-Петербургскій Ботаническій Садъ за 200 лѣтъ его существованія“.

Кромѣ того, по тому же поводу, выйдетъ изъ печати 2-е изданіе Краткаго Путеводителя по Саду В. И. Линскаго и извлеченіе изъ него на французскомъ языкѣ для иностранныхъ гостей.

Б. Л. Псаченко въ теченіе лѣтней командировки 1912 г. на соляныя озера Кавказа и Крыма работалъ въ лабораторіи управленія Кавказскихъ минеральныхъ водъ надъ изученіемъ микроорганизмовъ Тамбуканскаго озера и участіемъ ихъ въ процессахъ грязеобразования. Изслѣдованы были *Microspira aestuarii*, возстановляющая сульфаты, бактеріи разлагающія органическое вещество и бактеріи окисляющія сѣроводородъ (т. п. сѣрныя). Такъ какъ Тамбуканское озеро отличается высокой концентраціей рапы, то извѣстный интересъ представляло изученіе микроорга-

лизмовъ, развивающихся въ растворахъ близкихъ къ насыщенію. Для сравненія населенія Тамбуканскаго озера съ населеніемъ другихъ озеръ близкихъ къ нему по концентраціи раны была съдѣлана поѣздка по крымскимъ озерамъ: Чокракекому Сакскому, Майнакскому и на Андреевскій лиманъ. Во время поѣздки были собраны матеріалы, дающій возможность установить, что красный цвѣтъ хлористаго натра на соляныхъ промыслахъ зависитъ отъ развитія *Dunaliella*.

Съ 10 по 16 февраля 1913 г. состоялось, созванное Главнымъ Управленіемъ Землеустройства и Земледѣлія совѣщаніе по опытному дѣлу. Предсѣдателемъ комиссіи по контролю съѣманъ былъ назначенъ Б. Л. Псаченко. Существеннымъ результатомъ работъ комиссіи является достигнутое объединеніе методовъ изслѣдованія съѣманъ, примѣняемыхъ на русскихъ станціяхъ для изслѣдованія съѣманъ. Подобное объединеніе германскихъ станцій было впервые достигнуто въ 1875 г. въ Грацѣ по инициативѣ проф. Ноббе. Въ комиссіи были распределены между русскими станціями работы по изученію примѣнимости различныхъ методовъ изслѣдованія съѣманъ и постановлено печатать эти работы въ „Запискахъ Станціи Ботаническаго Сада“.

А. Фишеръ-фонъ-Вальдгеймъ.

Communications du Jardin Impérial botanique.

Sa Majesté l'Empereur a daigné visiter, le 22 mars, accompagné des Grandes Duchesses Olga, Marie et Anastasie Nikolaevna, de la Grande Duchesse Olga Alexandrovna, de la Duchesse Irène Alexandrovna et du Prince Pierre Alexandrovitch d'Oldenbourg l'Exposition des industries à domicile, située sur le territoire du Jardin Impérial botanique.

De la part du Jardin vient d'être adressée à différentes institutions une circulaire d'invitation pour son Jubilé bicentenaire.

A propos de son Jubilé le Jardin publie une grande oeuvre, richement illustrée, sous le titre „Le Jardin Impérial botanique de St.-Petersbourg pendant 200 ans de son existence“.

De même paraîtront pour le Jubilé une nouvelle édition

du Petit Guide du Jardin de W. H. Lipsky, ainsi qu' un extrait de ce Guide en français pour le hôtes de l'étranger.

Le conservateur B. L. Issatschenko a été délégué, en 1912, au Caucase et en Crimée, où il a étudié les microorganismes des lacs salés et leur rôle dans la formation de la tange. En outre, M. Issatschenko a pris part, au mois de février 1913, comme président, à la commission de contrôle des semences, qui s'était organisée à St.-Petersbourg.

A. Fischer de Waldheim.

ИЗВѢСТІЯ

ИМПЕРАТОРСКАГО С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО БОТАНИЧЕСКАГО САДА.

„Извѣстія“ будутъ выходить въ 1913 г. въ числѣ 6 выпусковъ въ годѣ объемомъ въ 1—2 печатныхъ листовъ, съ необходимыми таблицами и рисунками. Годовая цѣна 3 рубля, для заграницы 8 марокъ, или 10 франковъ.

Въ „Извѣстіяхъ“ помѣщаются: 1) оригинальныя работы по всемъ отдѣламъ ботаники, раньше нигдѣ не напечатанныя; 2) критическіе рефераты; 3) сообщенія Императорскаго С.-Петербургскаго Ботаническаго Сада.

Статьи принимаются объемомъ, по возможности, не болѣе одного печатнаго листа, написанныя по-русски и снабженныя самымъ краткимъ резюмѣ на французскомъ или нѣмецкомъ языкѣ.

Авторы получаютъ безплатно до 50 отдѣльныхъ оттисковъ.

Все статьи для „Извѣстій“ слѣдуетъ адресовать въ „Императорскій Ботаническій Садъ“, съ обозначеніемъ точнаго адреса отправителя.

**А. Фишеръ-фонъ-Вальдгеймъ.
Г. Надсонъ.**



BULLETIN

DU JARDIN IMPÉRIAL BOTANIQUE DE ST.-PÉTERSBOURG.

Le „Bulletin“ paraîtra en 1913 en six fascicules par an, par livraisons d'une à deux feuilles d'impression, avec planches et figures nécessaires. Le prix de l'abonnement est de 3 roubles par an et de 8 mares ou 10 francs pour l'étranger.

Le „Bulletin“ publiera: 1) des travaux originaux qui n'ont pas encore paru ailleurs, se rapportant à toutes les branches de la botanique; 2) des analyses critiques; 3) des compte-rendus et communications émanant du Jardin Impérial botanique de St.-Pétersbourg.

Les articles à publier ne devront pas dépasser, autant que possible, une feuille d'impression et doivent être écrits en russe, avec un court résumé en français ou en allemand.

Les auteurs reçoivent sans aucune rémunération 50 tirés à part de leurs articles.

Tout article destiné pour le „Bulletin“, pourvu de l'adresse de l'auteur, devra être adressé directement „au Jardin Impérial botanique de St.-Pétersbourg.“

**A. Fischer de Waldheim.
G. Nadson.**

ИЗВѢСТІЯ

ИМПЕРАТОРСКАГО

С.-Петербургскаго Ботаническаго Сада.

Томъ XIII, выпускъ 3.

Съ 14 рисунками и 1 таблицей.

Содержаніе.

Новый паразитъ *Gloeosporium polystigmaticum* на *Polystigma rubrum*. А. Бондарцевъ.

Десмидіевыя водоросли, собранныя лѣтомъ 1912 года въ Холмскомъ уѣздѣ Псковской губерніи. А. И. Лобикъ.

Сообщенія изъ Императорскаго Ботаническаго Сада. А. Фишеръ-фонъ-Вальдгеймъ.

BULLETIN

DU JARDIN IMPÉRIAL BOTANIQUE

de ST.-PÉTERSBOURG.

Tome XIII, livraison 3.

Avec 14 figures et 1 planche.

Sommaire.

Ein neuer Parasit *Gloeosporium polystigmaticum* auf *Polystigma rubrum*.
A. Bondarzew.

Desmidiaceae im Gouv. Pskow, Kreis Cholm im Jahre 1912 gesammelt. A. J. Lobik.

Communications du Jardin Impérial botanique. A. Fischer de Waldheim.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1913.

А. Бондарцевъ.

Новый паразитъ *Gloeosporium polystigmaticolum* на *Polystigma rubrum*.

(Съ одной таблицей и 2 рис. въ текстъ).

LIB
NEW
BOTAN
Gx

Новый грибокъ, названный мною *Gloeosporium polystigmaticolum*, представляетъ большой интересъ въ практическомъ отношеніи, такъ какъ онъ является паразитомъ грибка весьма распространенной болѣзни сливъ, извѣстной подъ названіемъ „ожога“ и обусловливаемой грибомъ *Polystigma rubrum*.*)

Gloeosporium polystigmaticolum наблюдался мною впервые въ 1911 г. въ окрестностяхъ г. Курска на посадкахъ сливъ, листья которыхъ почти сплошь начали покрываться пятнами ожога во второй половинѣ іюля. Та же болѣзнь была собрана Л. А. Лебедевой въ началѣ сентября того же года въ Корочанскомъ уѣздѣ Курской губ. и передана мнѣ для изслѣдованія. Каждое пятно *Polystigma* при внимательномъ осмотрѣ бросалось въ глаза своей не типичной окраской и нѣсколько какъ бы задержаннымъ развитіемъ. Въ луну уже ясно можно было видѣть плодовые тѣла паразита.

Плодовые тѣла многочисленны, скучены въ срединѣ или располагаются почти правильными концентрическими кругами на поверхности молодыхъ подушечекъ *Polystigma rubrum*. Иногда они какъ бы сливаются вмѣстѣ и образуютъ неправильныя зигзагообразныя короткія полоски. Красная окраска подушечекъ *Polystigma*, подъ вліяніемъ паразита, начинаетъ мало по малу пропадать, и онѣ принимаютъ сѣроватый оттѣнокъ съ темпобурымъ неправильнымъ ободкомъ. Позже и снизу листа красный цвѣтъ пятенъ *Polystigma* пронадаетъ и переходитъ, начиная отъ краевъ, въ бурый цвѣтъ. Затѣмъ на границѣ подушкообразнаго пятна начинается трещинка, окружающая его постепенно со всѣхъ сторонъ, вслѣдствіе чего со временемъ

*) Эта болѣзнь состоитъ въ томъ, что на листьяхъ сливы во второй половинѣ лѣта развиваются красныя подушкообразныя довольно большія пятна, подъ вліяніемъ которыхъ больные листья преждевременно опадаютъ.

нитна выпадають, и на листьяхъ остаются только дырочки. Ни разу мнѣ не приходилось наблюдать, чтобы на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ поселился паразитный грибокъ, *Polystigma* успѣла образовать свои плодоношенія. Такимъ образомъ въ срединѣ августа на такихъ деревьяхъ замѣчаются въ большомъ количествѣ продырявленные листья, тогда какъ на деревьяхъ, гдѣ *Polystigma* развивалась нормально, можно повсюду видѣть роскошно разросшіяся темно-красныя подушковидныя утолщенія грибка. На ихъ поверхности при сильномъ увеличеніи можно замѣтить пикнидіи со спорами, распространяющимися болѣзнь на соедѣнія дерева.

Въ матеріалѣ, собранномъ Л. А. Лебедевой, имѣется и тотъ случай, когда паразитъ поселился слишкомъ поздно, уже послѣ начала конидіального плодоношенія *Polystigma*, и, слѣдовательно, когда центральная часть ея стромы сильно уплотнилась и представляла, повидимому, уже не подходящую среду для начального зараженія, тогда какъ периферическая часть была въ этомъ отношеніи болѣе подходящей. Во всякомъ случаѣ при разсматриваніи такихъ образцовъ было видно, что *Gloeosporium* начиналъ свою дѣятельность всегда отъ краевъ подушечки *Polystigma*, которые скоро бурѣли, подсыхали, и подушечка все-таки выпадала.

Перейдемъ теперь къ описанію плодовыхъ тѣлъ новаго грибка. Вначалѣ они залегаютъ подъ эпидермисомъ и бываютъ нѣсколько погружены въ ткань, затѣмъ прорываются наружу какъ бы постепенно расширяющимся отверстіемъ (Tab. V, рис. 1). Основаніе этихъ плодовыхъ тѣлъ состоитъ изъ оливково-бурого стромовиднаго ложа, стѣнки же въ нижней части — изъ слабо переплетающихся, а въ верхней — изъ свободно растущихъ, различно изогнутыхъ, съ поперечными перегородками, свѣтло буровато-оливковыхъ гиѣ, толщиной не превосходящихъ $3\ \mu$ (Tab. V, рис. 2). Въ очень рѣдкихъ случаяхъ (въ старыхъ плодоношеніяхъ) удавалось наблюдать между этими гиѣами другія, прямыя или слабо изогнутыя и темнѣе окрашенныя, постепенно утончающіяся къверху, которыя можно разсматривать какъ щетинки, характеризующія родъ *Colletotrichum*; длина ихъ $50-70\ \mu$, а толщина $3,5-4\ \mu$ (Tab. V, рис. 3). Диаметръ плодовыхъ тѣлъ колеблется отъ 140 до $180\ \mu$, и только въ начальныхъ стадіяхъ ихъ онъ не превосходитъ $100\ \mu$, но за то въ старыхъ достигаетъ до $200\ \mu$ и болѣе. Толщина стѣнокъ плодовыхъ тѣлъ достигаетъ $18\ \mu$. Со временемъ плодовые тѣла раскрываются все больше, расширяются и принимаютъ иногда неправильную форму.

На ряду съ описанными встрѣчаются другого типа плодоношенія, состоящія изъ окрашенныхъ, какъ въ первомъ случаѣ, или безцвѣтныхъ ложъ, весьма характерныхъ для рода *Gloeosporium*.

sporium (Tab. V, рис. 4). Вначалѣ они также бываютъ покрыты эпидермисомъ, который со временемъ прорывается, и лозка становится поверхностными. Нѣкоторое отличіе плодоношеній наблюдается и въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда паразитъ развивается настолько сильно, что пронизываетъ всю подушечку *Polystigma*




Рис. 1. Разрѣзъ черезъ подушечку паразита на нижней поверхности листа; стромовидное ложе отсутствуетъ. Увеличено сильно. Ориг. рис.

и начинаетъ плодоносить и снизу листа, при чемъ стромовидное ложе иногда совсѣмъ отсутствуетъ и не окрашивается въ бурый цвѣтъ (рис. 1).

Нерѣдко также удавалось мнѣ наблюдать различныя формы плодоношеній, варьирующія между описанными. Такъ, напри-




Рис. 2. Плодоношеніе съ бурымъ стромовиднымъ ложемъ и кустиковидными гифами въ срединѣ и по краямъ. Увелич. около 220 разъ. Ориг. рис.

мѣръ, можно видѣть плодовые тѣла съ плоскимъ стромовиднымъ, безцвѣтнымъ или окрашеннымъ въ бурый цвѣтъ основаніемъ, отъ котораго отрастаютъ по краямъ, а иногда и въ срединѣ бурія кустиковидныя гифы, замѣняющія боковыя стѣлки и раздѣляющія гименіальный слой на нѣсколько полостей (рис. 2).

Внутри плодовыхъ тѣлъ заключается огромное количество

удлиненныхъ конидіеносцевъ со спорами. Форма конидіеносцевъ довольно измѣнчива: то они прямые, палочковидныя, одной толщины по всей длинѣ, то немного изогнутыя съ булавовидно утолщенными верхушками (Tab. V, рис. 5 и 6); длина ихъ 35—55 μ , толщина 3,5—5 μ . Сначала конидіеносцы свѣтло буровато-оливковые, затѣмъ, исключая основанія, становятся безцвѣтными.

Споры сидятъ по одной на верхушкахъ конидіеносцевъ; онѣ цилиндрическія съ закругленными концами, иногда къ одному изъ нихъ суживающіяся, перѣдко слабо изогнутыя, съ 2 крупными или нѣсколькими болѣе мелкими капельками масла, безцвѣтныя. Величина ихъ колеблется отъ 16 до 23 μ , толщина — отъ 4,5 до 5,5 μ (Tab. V, рис. 7).

Сопоставляя все только что сказанное, можно видѣть, что у даннаго грибка наблюдается двойное плодоношеніе въ зависимости, повидимому, отъ вѣшнихъ условій: одно очень тихое для рода *Gloeosporium*, а другое, рѣзко отличающееся присутствіемъ боковыхъ стѣночекъ изъ прозоплектенхимной ткани. Благодаря послѣднему обстоятельству, можно было бы выдѣлнить этотъ грибокъ въ новый родъ, близко стоящій къ *Gloeosporium*, который можно было бы назвать, напримѣръ, *Pseudogloeosporium*, что я и предполагалъ сдѣлать вначалѣ, но отложилъ до болѣе детальной разработки представителей рода *Gloeosporium* и отчасти *Colletotrichum*, чтобы сообразоваться съ полученными послѣ этого результатами.

Какъ показываютъ дальнѣйшія мои наблюденія, присутствіе указаннаго плодоношенія не является типичнымъ только для паразита *Polystigma*. Плодоношенія, гименіальный слой которыхъ часто бываетъ окруженъ особыми, внизу перѣдко переплетающимися гифами наблюдались мною также у недавно описаннаго пр. Bubák новаго грибка *Gloeosporium roesteliaecolum* Bub. et Serebr., являющагося паразитомъ ржавчинника *Roestelia penicillata*. Схематическіе рисунки этого паразита, помѣщенные въ *Hedwigia* (LII, 1912, S. 270), даютъ весьма слабое представленіе о дѣйствительности.

Въ заключеніе привожу діагнозъ найденнаго мною новаго вида.

***Gloeosporium polystigmaticolum* A. Bond. n. sp.**

Плодоношенія въ видѣ ложъ многочисленны, развиваются на подушечкахъ *Polystigma rubrum*, принимающихъ постепенно сѣрую окраску съ темно-бурымъ ободкомъ, снизу листа бурѣющихъ, въ послѣдствіи выпадающихъ. Плодоношенія прорываются изъ-подъ эпидермиса, ихъ діаметръ обычно 100—170 μ ; основаніе ихъ стромовидное оливково-буроватое или почти безцвѣтное; гименій часто окружается стѣнками изъ прозоплектенхимной

ткани того же цвѣта, которая вверху расщепляется на отдѣльныя различно изогнутыя гифы, до $3\ \mu$ толщиною; между ними очень рѣдко встрѣчаются темно-бурыя щетинки $50-70\ \mu$ длиною, $3,5-4\ \mu$ толщиною. Конидіеносцы палочковидныя, прямые или нѣсколько изогнутыя, иногда вверху утолщенные, оливково-буроватыя или безцвѣтныя, $35-55\ \mu$ длиною и $3,5-5\ \mu$ толщиною.

Споры безцвѣтныя, цилиндрическія, съ закругленными концами, иногда къ одному изъ нихъ суживающіяся, часто немного изогнутыя, съ двумя или нѣсколькими капельками масла, $16-23\ \mu$ длиною, $4,5-5,5\ \mu$ толщиною.

A. Bondarzew.

Ein neuer Parasit *Gloeosporium polystigmaticum* auf *Polystigma rubrum*.

Résumé.

Gloeosporium polystigmaticum wurde im Jahre 1911 im Gouvernement Kursk an den von *Polystigma rubrum* befallenen Blättern der Pflaumenbäume gefunden.

Nach meinen Beobachtungen ist der Pilz ein typischer Parasit von *Polystigma rubrum* und verursacht das Vertrocknen und das Ausfallen seiner Polster.

Die Diagnose der neuen Art ist folgende:

***Gloeosporium polystigmaticum* A. Bond. n. sp.** Fruchtlager zahlreich auf Polstern von *Polystigma rubrum* gehäuft. Die Polster werden allmählig grau mit dunkelbrauner Umrandung, unten braun, später ausfallend. Lager, die Epidermis durchbrechend, hat im Diameter gewöhnlich $100-180\ \mu$; Basis stromaartig, olivenbräunlich oder fast farblos. Hymenium oft mit Wänden umgeben von derselben Farbe aus prosoplektenchymatischem Gewebe, welches oben in verschiedenartig gebogene, bis $3\ \mu$ dicke Hyphen zerfällt. Sehr selten sieht man dazwischen schwarzbraune Borsten, $50-70\ \mu$ lang, $3,5-4\ \mu$ dick.

Konidienträger stäbchenförmig, gerade oder etwas gebogen, zuweilen oben verdickt, olivenbräunlich oder hyalin, $35-55\ \mu$ lang, $3,5-5\ \mu$ dick.

Sporen hyalin, cylindrisch, mit abgerundeten Enden, zuweilen eins derselben verschmälert, oft schwach gebogen, mit zwei oder mehreren Oeltropfen, 16—23 μ lang, 4,5—5,5 μ dick.

Объясненіе рисунковъ таблицы V.

1. Два плодоношенія *Gloeosporium polystigmaticum*, взятыхъ съ верхней стороны молодыхъ подушечекъ *Polystigma*, изъ которыхъ одно еще прикрыто эпидермисомъ, а другое уже открыто, и видны отшнуровывающіяся споры. Увелич. 100 разъ.
- 2 и 3. Два плодоношенія *Gloeosporium polystigmaticum* со стромовиднымъ ложемъ и сильно развитыми боковыми стѣнками изъ прозоплектенхимной ткани. На третьемъ рисункѣ можно видѣть 3 щетинки. Увеличено около 400 разъ.
4. Разрѣзъ черезъ типичное плодоношеніе для рода *Gloeosporium*. Увелич. 400 разъ.
5. Два отдѣльныхъ конидіеносца изъ плодоношенія, изображеннаго на 2 рисункѣ, при увеличеніи около 1000 разъ.
6. Группа конидіеносцевъ, взятыхъ изъ типичнаго для *Gloeosporium* плодоношенія, при увеличеніи въ 700 разъ.
7. Три отпавшихъ конидій. Увелич. около 1000 разъ.



А. И. Лобикъ.

Десмидіевыя водоросли, собранныя лѣтомъ 1912 года въ Холмскомъ уѣздѣ Псковской губерніи.

(Съ 12 рис. въ текстѣ.)

Занимаясь изученіемъ флоры и сборомъ паразитныхъ грибовъ въ Холмскомъ уѣздѣ Псковской губерніи весной и лѣтомъ 1912 года, между прочимъ мною было взято нѣсколько пробъ для предварительнаго знакомства съ распространеніемъ десмидіевыхъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ мнѣ приходилось экекурсировать. Пробы брались изъ различныхъ мѣстообитаній, какъ то рѣкъ, болотъ, канавъ, ручьевъ. Такъ какъ подъ руками у меня не было никакихъ приспособленій, хотя бы для процѣживания воды, въ которой имѣлись организмы, то приходилось поступать самымъ примитивнымъ способомъ, растирая части растеній, на которыхъ имѣются эти водоросли, и встряхивая ихъ также въ банкъ съ водой: муть отстаивалась въ теченіе нѣкотораго времени, лишняя вода сливалась, а осадокъ съ небольшимъ количествомъ воды помѣщался въ высокія коховскія чашки, откуда уже брались пробы для изслѣдованій. При такой предварительной обработкѣ, очень многое оставалось на частяхъ растеній, которыя необходимо было почти сразу удалять во избѣжаніе загниванія, такъ-какъ, напр., харовыя къ вечеру того же дня начинали издавать весьма непріятный запахъ и порттили всю пробу. Въ чашкѣ черезъ нѣкоторое время почти всѣ водоросли поднимались къ поверхности воды и располагались въ слизистой массѣ на стѣнкѣ чашки на сторонѣ, обращенной къ окну. За все время было взято 13 пробъ:

1. 8 апр., на торфяномъ болотѣ близъ Кіевичъ: эта ранняя проба дала 4 экземпляра десмидіевыхъ;
2. 10 апр., въ канавѣ близъ Сырофьянна, на гніющихъ растеніяхъ; на днѣ канавы еще былъ ледъ; эта проба дала тоже 4 экземпляра;

3. 27 мая, въ рѣкѣ Маломъ Тудрѣ, около Кіевичъ, на харовыхъ и Fontinalis (рѣка быстрая, каменная); эта проба дала 7 экземпляровъ;
4. 30 мая, тамъ же, гдѣ и проба 1-ая; дала эта проба 27 экземпляровъ;
5. 4 іюня, въ канавѣ близъ Языковщины; эта проба дала только 2 экземпляра;
6. 6 іюня, на торфяникѣ вокругъ Булынинскаго озера (заболоченнаго); эта проба дала 10 экземпляровъ;
7. 24 іюня, въ ручѣ изъ Булынинскаго озера въ Истоминскомъ лѣсу, на границѣ съ Баховымъ; эта проба дала 17 экземпляровъ;
8. 24 іюня, на болотистомъ лугу бл. Луки; къ серединѣ лѣта этотъ лугъ болѣе или менѣе пересыхаетъ; эта проба дала 8 экземпляровъ;
9. 27 іюня, тамъ же собрано 16 экземпляровъ;
10. 25 іюня, на осушаемомъ торфяникѣ въ канавѣ; эта проба дала всего 1 экземпляръ;
11. 3 іюля, на торфяномъ болотѣ въ Бороносковскомъ сосновомъ бору; эта проба дала 3 экземпляра;
12. 16 іюля, въ канавѣ на берегу Малаго Тудра; эта проба дала 1 экземпляръ;
13. 2 августа, въ заглохшемъ пруду въ Вѣринкахъ; эта проба дала 2 экземпляра.

Большая часть сбора пришлась на торфяникъ и болотистый лугъ, остальные пробы дали сравнительно очень немного. Всего количество экземпляровъ переносило за 100, что составило до 52 видовъ (55 формъ); разумеется, во многихъ пробахъ были повторенія, особенно это относится къ пробамъ съ болотъ; кромѣ того изъ за недостатка въ матеріалѣ нѣкоторые виды не могли быть опредѣлены точно; особенно это относится къ видамъ рода *Xanthidium*, изъ числа которыхъ могли быть опредѣлены только наиболѣе обычныя формы. Зато въ другихъ родахъ удалось обнаружить нѣкоторыя довольно рѣдкія и интересныя формы, а также своеобразныя отклоненія отъ типа. Такъ, нѣкоторыя болѣе или менѣе уклоняются своими размѣрами: *Netrium oblongum* (De-Bary) Lütke., *Penium minutum* (Ralfs) Cleve, *Penium Libellula* Nordst. Var. *interruptum* W. et G. S. West, *Closterium costatum* Corda, *Closterium Venus* Kütz., *Closterium moniliferum* (Bory) Ehrenb., *Closterium Lunula* (Müll.) Nitzsch., *Closterium turgidum* Ehrenb., *Closterium lineatum* Ehrenb., *Closterium rostratum* Ehrenb., *Pleurotaenium Trabecula* (Ehrenb.) Näg. f. *clavatum* W. et

G. S. West, *Euastrum ansatum* *Ralfs* Var. *pyxidatum* *Delp.*, *Euastrum verrucosum* *Ehrenb.* Var. *coarctatum* *Delp.* f. *minus mihi*, *Cosmarium cymatopleurum* *Nordst.* Var. *Tyrolicum* *Nordst.*, *Cosmarium obtusatum* *Schmidle*, *Cosmarium quadratum* *Ralfs*, *Cosmarium Quadrum* *Lund.*, *Staurostrum Meriani* *Reinsch.*, *Desmidium Swartzii* *Ag.* Другія отличаются своей формой: *Micrasterias Americana* (*Ehrenb.*) *Ralfs* Var. *Boldtii* *Gutw.* f. *intermedia mihi*, *Cosmarium laeve* *Rabenh.* Var. *octangulare* (*Wille*) *W. et G. S. West*, *Xanthidium antilopaeum* (*Bréb.*) *Kütz.* и *Xanthidium cristatum* *Bréb.* Var. *Delpontei* *Roy et Biss.*: послѣдняя форма отличается отъ типичной разновидности скульптурой оболочки на подуклѣткахъ.

При приготовленіи коллекціи микроскопическихъ препаратовъ я пользовался слѣдующимъ способомъ: бралъ каплю изъ чашки и подъ микроскопомъ отыскивалъ десмидіевыя; найденный организмъ вылавливалъ при помощи капиллярной трубки и помѣщалъ на стекло въ каплю емѣи изъ одной части глицерина, двухъ частей воды и трехъ частей спирта. Въ этой емѣи объектъ выдерживался отъ 3—7 дней, т. е. до тѣхъ поръ пока не испарится спиртъ и вода. Затѣмъ капилляромъ переносился этотъ экземпляръ съ небольшимъ количествомъ глицерина на чистое предметное стекло, которое слегка нагревалось; на него помѣщалась капля глицеринъ-желатинъ и покрывалась предметнымъ стеклышкомъ. Нагревался объектъ передъ заключеніемъ въ глицеринъ-желатинъ для того, чтобъ сгустить окончательно глицеринъ и избѣжать этимъ выплыванія его изъ подъ покровнаго стекла; нагреваніе должно производиться очень осторожно, иначе структура хроматофора совершенно пропадетъ. Этотъ способъ въ общемъ далъ очень хорошіе результаты: въ большинствѣ препаратовъ цвѣтъ и строеніе хроматофоровъ почти совершенно не измѣнились.

Въ заключеніе считаю пріятнымъ долгомъ выразить искреннюю благодарность глубокоуважаемому А. А. Еленкину за его руководство мною въ исполненіи этой работы, которая была произведена въ Споровомъ Гербаріи Императорскаго Ботаническаго Сада Петра Великаго.

Критическій списокъ десмидіевыхъ.

Netrium Näg.

1. *Netrium Digitus* (Ehrenb.) Itzigs. et Rothe in *West*, Mon. Desm. I (1904) pag. 64, tab. VI, fig. 14—16; *Баласонцевъ* Ладожск. оз. (1909) стр. 175; — *Penium Digitus* Bréb. in *Migula*, Algen Deutschl. (1907) pag. 364, tab. XXI, fig. 8; *Ralfs*, Brit. Desm. (1848) pag. 150, tab. XXV, fig. 3; *Comère*, Desm. France (1901) pag. 81, tab. V, fig. 3; *Л. Ивановъ*, Озерн. обл. (1901) стр. 68; *O. Borge*, Algenfl. Schweden (1906) pag. 13.

Мѣстопах. въ канавѣ бл. Сыроѣжскаго, 10 апр.; на торфяномъ болотѣ бл. Кіевичъ, 30 мая.

Примѣчан. Эти экземпляры по размѣрамъ совпадаютъ съ данными *West'a*. Длина 194,3—374,1 μ , ширина 52,2—78,3 μ . Размѣры по *West'у*: 130—387 μ , длина и 40—82 μ , ширина.

2. *Netrium Nägelii* (Bréb.) W. et G. S. West, Mon. Desm. I (1904) pag. 66, tab. VII, fig. 4, 5; — *Penium Nägelii* Bréb., in *Comère*, Desm. France (1901) pag. 83, tab. V, fig. 5; *Migula*, Algen Deutschl. (1907) pag. 364, tab. XXII B, fig. 14; *O. Borge*, Algenfl. Schweden (1906) pag. 13.

Мѣстопах. на торфяникѣ около Булынинскаго озера, 6 іюня.

Примѣчан. размѣры этого экземпляра сходятся съ данными *West'a*. Длина 121,8 μ , ширина 31,9 μ ; по *West'у* размѣры: 115—160 μ , длина и 25—34 μ , ширина.

3. *Netrium oblongum* (De Bary) Lütke. in *West*, Mon. Desm. I (1904) pag. 66, tab. VIII, fig. 1—3; — *Penium oblongum* De Bary in *Migula*, Algen Deutschl. (1907) pag. 364, tab. XXII B, fig. 4; *O. Borge* Süßwass. Chlorophyc. (1894) pag. 17; *O. Borge*, Algenfl. Schweden (1906) pag. 13; *Л. Ивановъ*, Озерн. обл. стр. 69.

Мѣстопах. на торфяникѣ въ Бороносковскомъ бору, 3 іюля.

Примѣчан. этотъ экземпляръ нѣсколько отличается по размѣрамъ отъ данныхъ *West'a*: онъ нѣсколько короче и уже. Длина 81,2 μ ; ширина 29 μ ; по *West'у*: 96—135 μ длины и 32—33 μ ширины.

Penium Bréb.

4. *Penium minutum* (Ralfs) Cleve in *West*, Mon. Desm. I (1904) pag. 101, tab. X, fig. 1, 2; *O. Borge*, Süßwass. Chlorophyc. (1894) pag. 17; *O. Borge*, Algenfl. Schweden (1906) pag. 15.

Мѣстопах. на торфяникѣ въ Бороносковскомъ, 3 іюля.

Примѣчан.: размѣры данного экземпляра меньше, чѣмъ указано у *West'a*. Длина 84,1 μ ; ширина 11,6 μ . По *West'у* размѣры: 97—168 μ длина и 12,5—18 μ ширина.



Рис. 1. *Penium Libellula Nordst. Var. interruptum W. et G. S. West.*
(Окул. 2, объект. 7 Лейтца, при тубусѣ 170). Ориг. рис.

5. *Penium Libellula Nordst. var. interruptum W. et G. S. West.*
Mon. Desm. I (1904) pag. 74, tab. VII, fig. 9, 10.

Мѣстопах.: на болотистомъ лугу бл. Луки, 24 іюня.

Примѣчан.: размѣры нѣсколько не сходятся: этотъ экземпляръ немного короче, чѣмъ указано у *West'a*. Длина 118,9 μ ; ширина 24,6 μ . По *West'у* измѣренія таковы: 122—240 μ длина, 24—44 μ ширина.

Closterium Nitzsch.

6. *Closterium costatum Corda* in *West, Mon. Desm. I (1904) pag. 120, tab. XIII, fig. 1—3; Ralfs, Brit. Desm. (1848) pag. 170, tab. XXIX, fig. 1; Comère, Desm. France (1901) pag. 68, tab. III, fig. 13; Migula, Algen Deutschl. (1907) pag. 379, tab. XXIII C, fig. 1; O. Borge, Süßwass. Chlorophyc. (1894) pag. 15; O. Borge, Algenfl. Schweden (1906) pag. 17.*

Мѣстопах.: въ ручѣ въ Истоминскомъ лѣсу, 6 іюня.

Примѣчан.: наши экземпляры нѣсколько отличаются отъ данныхъ *West'a*, они нѣсколько короче и тоньше. Длина 316,1—362,2 μ и ширина 37,7 μ ; по *West'у* размѣры: 340—405 μ длина и 48—66 μ ширина.

7. *Closterium striolatum Ehrenb.* in *West, Mon. Desm. I (1904) pag. 122, tab. XIII, fig. 7—16; Ralfs, Brit. Desm. (1848) pag. 170, tab. XXIX, fig. 2; Migula, Algen Deutschl. (1907) pag. 380, tab. XXIII, fig. 16; Comère, Desm. France (1901) pag. 61, tab. III, fig. 2; Borge, Algenfl. Schweden (1906) pag. 17; Л. Ивановъ, Озери. область (1901) pag. 68; O. Borge, Süßwas. Chlorophyc. (1894) pag. 15.*

Мѣстопах.: на болотистомъ лугу бл. Луки, 24 іюня.

Примѣчан.: данный экземпляръ близко подходит подъ описание у *West'a*. Размѣры его: длина 246,5 μ , ширина 31,9 μ . У *West'a* размѣры: 235—478 μ длины и 22—53 μ ширины.

8. *Closterium intermedium Ralfs, Brit. Desm. (1848) pag. 171, tab. XXIX, fig. 3; in West, Mon. Desm. I (1904) pag. 125, tab. XIV, fig. 1—5; Migula, Algen Deutschl. (1907) pag. 381, tab. XXIII C, fig. 2; Comère, Desm. France (1901) pag. 59, tab. I,*

fig. 9; *O. Borge*, Algenfl. Schweden (1906) pag. 17; *O. Borge*, Süßwass. Chlorophyc. (1894) pag. 15; *Boldt*, Sibiriens Chlorophyl. (1885) pag. 122; *Балалонцевъ*, Ладожск. оз. (1909) pag. 176.

Мѣстопах.: въ ручьѣ въ Истоминскомъ лѣсу, 9 іюня.

Примѣчан.: Этотъ экземпляръ по своимъ размѣрамъ близокъ къ описанію у *West*'a. Длина его 295,8 μ и ширина 23,2 μ . Размѣры у *West*'a: 234—465 μ длины, 16—31 μ ширины.

9. *Closterium parvulum* Näg. in *West*, Mon. Desm. I (1904) pag. 133, tab. XV, fig. 9—12; *Migula*, Algen Deutschl. (1907) pag. 375, tab. XXIII C, fig. 9; *Comère*, Desm. France (1901) pag. 74, tab. III, fig. 9; *Boldt*, Sibiriens Chlorophyl. (1885) pag. 123; *O. Borge*, Algenfl. Schweden (1906) pag. 18; *Л. Ивановъ*, Озерн. область (1901) стр. 68; *O. Borge*, Süßwas. Chlorophyc. (1894) pag. 16.

Мѣстопах.: на харовыхъ въ р. М. Тудрѣ, 27 мая; на болотист. лугу бл. Луки, 24 іюня и 27 іюня.

Примѣчан.: размѣры нашихъ экземпляровъ такіе:

длина 87 μ ширина 11,6 μ .

„ 95,7 μ „ 11,6 μ .

„ 142,1 μ „ 14,5 μ .

По *West*'у: „ 96—121 μ „ 11—14,5 μ .

10. *Closterium Venus* Kütz. in *West*, Mon. Desm. I (1904) pag. 137, tab. XV, fig. 15—20; *Migula*, Algen Deutschl. (1907) pag. 375, tab. XXIII C, fig. 11; *Ralfs*, Brit. Desm. (1848) pag. 220, tab. XXXV, fig. 12; *Comère*, Desm. France (1901) pag. 73, tab. IV, fig. 13; *O. Borge*, Algenfl. Schweden (1906) pag. 19; *Л. Ивановъ*, Озерн. обл. (1901) стр. 68; *O. Borge*, Süßwas. Chlorophyc. (1894) pag. 16.

Мѣстопах.: на болотистомъ лугу бл. Луки, 24 іюня.

Примѣчан.: этотъ экземпляръ немного короче, чѣмъ указано у *West*'a. Длина его 49,3 μ , ширина 7,25 μ . По *West*'у размѣры: 51—81 μ длины и 7—10,5 μ ширины.

11. *Closterium Leibleinii* Kütz. in *West*, Mon. Desm. I (1904) pag. 141, tab. XVI, fig. 9—14; *Ralfs*, Brit. Desm. (1848) pag. 167, tab. XXVIII, fig. 4; *Migula*, Algen Deutschl. (1907) pag. 376, tab. XXIII, fig. 12; *Comère*, Desm. France (1901) pag. 77, tab. IV, fig. 6; *O. Borge*, Süßwas. Chlorophyc. (1894) pag. 16; *O. Borge*, Algenfl. Schweden (1906) pag. 19; *Л. Ивановъ*, Озерн. обл. (1901) стр. 68; *Балалонцевъ*, Ладожск. оз. (1909) стр. 177.

Мѣстопах.: въ ручьѣ въ Истоминскомъ лѣсу, 6 іюня; на болотистомъ лугу бл. Луки, 24 іюня.

Примѣчан.: у одного изъ этихъ экземпляровъ есть нѣкоторое уклоненіе отъ данныхъ *West*'a: онъ нѣсколько уже, но остальные вполне соответствуютъ его описанію.

Размѣры таковы: 130,5 μ длина, 17,4 μ ширина
 133,4 μ „ 17,1 μ „
 142,1 μ „ 14,5 μ „

По West'у длина 107—202 μ , ширина 17—37 μ .

12. *Closterium moniliferum* (Bory) Ehrenb. in West, Mon. Desm. I (1904) pag. 142, tab. XVI, fig. 15, 16; *Ralfs*, Brit. Desm. (1848) pag. 166, tab. XXVIII, fig. 3; *Migula*, Algen Deutschl. (1907) pag. 377, tab. XXII C, fig. 14; *Comère*, Desm. France (1901) pag. 76, tab. IV, fig. 10; *O. Borge*, Süßwas. Chlorophyc. (1894) pag. 16; *O. Borge*, Algenfl. Schweden (1906) pag. 19; *Boldt*, Sibiriens Chlorophyl. (1885) pag. 122; *Л. Ивановъ*, Озерн. обл. (1901) стр. 68; *Балахонцевъ*, Ладожск. оз. (1909) стр. 177.

Мѣстопах.: на харовыхъ въ р. М. Тудрѣ, 27 мая; въ ручьѣ въ Истоминскомъ лѣсу, 6 июня.

Примѣчан.: большая часть экземпляровъ шире, чѣмъ указано у West'a. Размѣры ихъ таковы:

длина 194,3 μ , ширина 43,5 μ .
 „ 232 μ „ 58 μ .
 „ 237,8 μ „ 52,2 μ .
 „ 252,3 μ „ 58 μ .

По West'у длина 222—370 μ , ширина 33—50 μ .

13. *Closterium Ehrenbergii* Menegh. in West, Mon. Desm. I (1904) pag. 143, tab. XVII, fig. 1—4; *Ralfs*, Brit. Desm. (1848) pag. 116, tab. XXVIII, fig. 2; *Comère*, Desm. France (1901) pag. 75, tab. IV, fig. 2; *Migula*, Algen Deutschl. (1907) pag. 377, tab. XXII C, fig. 15; *O. Borge*, Süßwas. Chlorophyc. (1894) pag. 16; *O. Borge*, Algenfl. Schweden (1906) pag. 19; *Л. Ивановъ*, Озерн. обл. (1901) стр. 68; *Балахонцевъ*, Ладожск. оз. (1909) стр. 178.

Мѣстопах.: на харовыхъ въ р. М. Тудрѣ, 27 мая.

Примѣчан.: данные экземпляры близко подходят по своимъ размѣрамъ къ указаннымъ у West'a. Длина ихъ 391,5—455,3 μ и ширина 107,3—116 μ . У West'a размѣры: 382—541 μ длины и 72—137 μ ширины.

14. *Closterium Lunula* (Müll.) Nitzsch. in West, Mon. Desm. I (1904) pag. 150, tab. XVIII, fig. 8, 9; *Ralfs*, Brit. Desm. (1848) pag. 163, tab. XXVII, fig. 1; *Comère* Desm. France (1901) pag. 69, tab. III, fig. 12; *Migula*, Algen Deutschl. (1907) pag. 377, tab. XXIII, fig. 9; *Boldt*, Sibiriens Chlorophyl. (1885) pag. 122; *O. Borge*, Süßwas. Chlorophyc. (1894) pag. 14; *Л. Ивановъ*, Озерн. обл. (1901) стр. 68; *Балахонцевъ*, Ладожск. оз. (1909) стр. 179.

Мѣстопах.: въ ручьѣ въ Истоминскомъ лѣсу, 6 июня; въ лужѣ на берегу М. Тудра, 16 июня.

Примѣчан.: длина данныхъ экземпляровъ подходитъ, но ширина во всѣхъ случаяхъ меньше, чѣмъ указано у *West'a*.

Длина 551 μ , ширина 66,7 μ .

„ 565 μ , „ 60,9 μ .

„ 580 μ , „ 72,5 μ .

По *West'у* Длина 478—680 μ , ширина 76—116 μ .




Рис. 2. *Closterium gracile* Bréb. Var. *elongatum* W. et G. S. West. (Окул. 2, объект. 7 Лейтна, при тубусѣ 130). Ориг. рис.

15. *Closterium gracile* Bréb. Var. *elongatum* W. et G. S. West. Mon. Desm. I (1904), pag. 168, tab. XXI, fig. 14—16.

Мѣстопах.: на болотистомъ лугу бл. Луки 24 июня.

Примѣчан.: этотъ экземпляръ близокъ къ описанію у *West'a*. Размѣры его такіе: длина 275,5 μ и ширина 4,35 μ . По *West'у* размѣры 276—360 μ длины и 3—4 μ ширины.

16. *Closterium turgidum* Ehrenb. in *West*, Mon. Desm. I (1904), pag. 170, tab. XXII, fig. 4,5; *Ralfs*, Brit. Desm. (1848), pag. 165, tab. XXVII, fig. 3; *Comère*, Desm. France (1901), pag. 62, tab. II, fig. 4; *Migula*, Algen Deutschl. (1907), pag. 383, tab. XXIII C, fig. 4; *Boldt*, Sibiriens Chlorophyl. (1885), pag. 122; *O. Borge*, Algenfl. Schweden (1906), pag. 17.

Мѣстопах.: вмѣстѣ съ предыдущимъ видомъ.

Примѣчан.: этотъ экземпляръ нѣсколько уклоняется по своимъ размѣрамъ отъ указанныхъ у *West'a*. Измѣренія даннаго экземпляра такіе: длина 594,5 μ ширина 72,5 μ ; у *West'a* размѣры: 650—791 μ длины и 58—75 μ ширины.

17. *Closterium lineatum* Ehrenb. in *West*, Mon. Desm. I (1904), pag. 181, tab. XXIV, fig. 1—5; *Ralfs*, Brit. Desm. (1848), pag. 173, tab. XXX, fig. 1; *Comère*, Desm. France (1901), pag. 60, tab. I, fig. 1; *Migula*, Algen Deutschl. (1907), pag. 380, tab. XXIII D, fig. 9; *Л. Ивановъ*, Озерн. обл. (1901), стр. 68; *Баларонцевъ*, Ладожск. оз. (1909), стр. 181.

Мѣстопах.: на болотистомъ лугу, бл. Луки, 27-го июня; въ Вѣтшинскомъ пруду, 2 августа.

Примѣчан.: наши экземпляры по длинѣ нѣсколько уклоняются отъ данныхъ *West'a*. Длина 377—498,8 μ и ширина 17,4—20,3 μ . По *West'у* размѣры: 415—760 μ длины и 17—35 μ ширины.

18. *Closterium Ralfsii* Bréb. Var. *hybridum* Rabenh. in *West*, Mon. Desm. I (1904), pag. 183, tab. XXIV, fig. 8—13; *Migula*, Algen Deutschl. (1907), pag. 381; *Баларонцевъ*, Ладожск. оз. (1909), стр. 181.

Мѣстопах.: въ ручьѣ въ Истоминскомъ лѣсѣ, 6 іюня.

Примѣчан.: нашъ экземпляръ вполне подходитъ по размѣрамъ къ даннымъ у *West'a*. Длина его 410,4 μ ширина 37,7 μ . По *West'u* размѣры: 306—700 μ длины и 24—44 μ ширины.

19. *Closterium rostratum* Ehrenb. in *West, Mon. Desm. I* (1904), pag. 188, tab. XXVI, fig. 1—5; *Ralfs, Brit. Desm.* (1848), pag. 175, tab. XXX, fig. 3; *Comèrè, Desm. France* (1901), pag. 55, tab. I, fig. 11; *Migula, Algen Deutschl.* (1907), pag. 388, tab. XXIII, fig. 14; *Bolitt, Sibiriens Chlorophyl.* (1885), pag. 123; *O. Borge, Süßwas. Chlorophyc.* (1894), pag. 16; *O. Borge, Algenfl. Schweden* (1906), pag. 19; *Л. Ивановъ, Озерн. обл.* (1901), стр. 68; *Балиронцевъ, Ладожск. оз.* (1909), стр. 182.

Мѣстопах.: на болотистомъ лугу бл. Луки, 27 іюня.

Примѣчан.: данный экземпляръ уже, чѣмъ указано у *West'a*. Длина его 284,2 μ , ширина 17,4 μ . Размѣры у *West'a*: 246—530 μ длины и 19—30 μ ширины.

Pleurotaenium Näg.

20. *Pleurotaenium Trabecula* (Ehrenb.) Näg. in *West, Mon. Desm. I* (1904), pag. 209, tab. XXX, fig. 11—13; *Comèrè, Desm. France* (1901), pag. 98, tab. VI, fig. 6; *O. Borge, Süßwas. Chlorophyc.* (1894), pag. 18; *O. Borge, Algenfl. Schweden* (1906), pag. 20; *Migula, Algen Deutschl.* (1907), pag. 394, tab. XXIII E, fig. 4; *Балиронцевъ, Ладожск. оз.* (1909), стр. 183.

Мѣстопах.: на болотистомъ лугу бл. Луки, 24 іюня.

Примѣчан.: этотъ экземпляръ по своимъ размѣрамъ вполне подходитъ подъ описаніе у *West'a*. Длина его 406 μ , ширина 29 μ . По *West'u* размѣры: 390—664 μ длины и 26—46 μ ширины.



Рис. 3. *Pleurotaenium Trabecula* Naeg. Forma clavatum W. et G. S. West.
(Окул. 2, объект. 7 Лейтца, при тубусѣ 130). Ориг. рис.

21. *Pleurotaenium Trabecula* Näg. Forma clavatum W. et G. S. West, Mon. Desm. I (1904), pag. 211, tab. XXXI, fig. 8, 9.

Мѣстопах.: на торфяномъ болотѣ бл. Кіевичъ, 30 мая.

Примѣчан.: нашъ экземпляръ только шириной нѣсколько отличается отъ данныхъ *West'a*. Длина его 377 μ , ширина 34,8 μ . По *West'u* размѣры: 300—390 μ длины и 22—31 μ ширины.

22. *Pleurotaenium Trabecula* Näg. Var. rectum (Delp.) W. et G. S. West, Mon. Desm. I (1904), pag. 212, tab. XXX, fig. 9, 10.

Мѣстопах.: На болотистомъ лугу бл. Луки 27 іюня.

Примѣчан.: Эти экземпляры довольно близко подходят подъ данныя *West'a*.

Длина 287,3 μ , ширина 26,1 μ .

„ 292,9 μ , „ 26,1 μ .

„ 327,7 μ , „ 18,85 μ .

По *West'u* размѣры: длина 212—408 μ , ширина 22—23 μ .

Euastrum Ehrenb.

23. *Euastrum oblongum* (Grev.) Ralfs. Brit. Desm. (1848) pag. 80, tab. XII; in *West*, Mon. Desm. II (1905) pag. 12, tab. XXXIV, fig. 7—9, tab. XXXV, fig. 2; *Migula*, Algen Deutschl. (1907) pag. XXVI, fig. 7; *Comèrè* Desm. France (1901) pag. 143, tab. X, fig. 3; *O. Borge*, Süßwas. Chlorophyc. (1894) pag. 32; *O. Borge*, Algenfl. Schweden (1906) pag. 22; *Delpont*, Desm. Subalp. (1873) pag. 87, tab. VI, fig. 26—30; *Л. Ивановъ*, Озерн. обл. (1901) стр. 71; *Балигонцевъ*, Ладожск. оз. (1909) стр. 184.

Мѣстопах.: на торфяномъ болотѣ бл. Кіевичъ, 30 мая.

Примѣчан.: изъ данныхъ экземпляровъ только одинъ нѣсколько отличается своей длиной отъ размѣровъ, указанныхъ у *West'a*.

Длина ихъ: 133,4 μ , ширина 75,4 μ .

„ 159,5 μ , „ 81,2 μ .

„ 159,5 μ , „ 84,1 μ .

У *West'a* размѣры: 144—205 μ длины и 74—107 μ ширины.

24. *Euastrum ansatum* Ralfs, Brit. Desm. (1848) pag. 85, tab. XIV, fig. 2. [Non *Euastrum ansatum* Ehr., quod teste *West* est *Cosmarium ansatum* (Ehrenb.) Rabenh.]; in *West*, Mon. Desm. II (1905) pag. 27, tab. XXXVI, fig. 10—13; *Migula*, Algen Deutschl. (1907) pag. 492, tab. XXVI, fig. 10; *Comèrè*, Desm. France (1901) pag. 146, tab. IX, fig. 27; *Boldt*, Sibiriens Chlorophyl. (1885) pag. 98; *O. Borge*, Süßwas. Chlorophyc. (1894) pag. 32; *O. Borge*, Algenfl. Schweden (1906) pag. 24; *Л. Ивановъ*, Озерн. обл. (1901) стр. 72; *Балигонцевъ*, Ладожск. оз. (1909) стр. 184; — *Euastrum ansatum sublobatum* *Delpont*, Desmid. Subalpin. (1873) pag. 91, tab. VI, fig. 35—36.

Мѣстопах.: на торфяномъ болотѣ бл. Кіевичъ, 30 мая.

Примѣчан.: этотъ экземпляръ вполне подходитъ подъ размѣры, указанные у *West'a*. Длина 75,4 μ , ширина 34,8. По *West'u*: длина 70—91 μ и ширина 32—47 μ .

25. *Euastrum ansatum* Ralfs Var. *pyxidatum* *Delp.* Desmid. Subalpin. (1873) pag. 91, tab. VI, fig. 32—34; in *West*, Mon. Desm. II (1905) pag. 29, tab. XXXVI, fig. 14, 15; *Migula*, Algen Deutschl. (1907) pag. 493.

Мѣстопах.: на торфяномъ болотѣ бл. Кіевичъ, 30 мая.

Примѣчан.: данный экземпляръ нѣсколько больше въ длину и ширину, чѣмъ указано у *West'a*. Размѣры его: 89,9 μ длина и 43,5 μ ширина. По *West'y* размѣры: 65—86 μ длины и 32—42 μ ширины.

26. *Euastrum bidentatum* Näg. in *West*, Mon. Desm. II (1905) pag. 39, tab. XXXVII, fig. 16—19; — *Euastrum elegans* (Bréb.) Kg. Var. *bidentata* (Næg.) Jacobs. in *Migula*, Algen Deutschl. (1907) pag. 498.

Мѣстопах.: на торфяномъ болотѣ бл. Кіевичъ, 30 мая; въ ручьѣ въ Истоминскомъ лѣсу, 6 іюня.

Примѣчан.: эти экземпляры по своимъ размѣрамъ почти вполне подходятъ подъ указанные у *West'a*.

Длина ихъ: 52,2—58 μ , ширина 31,9—40,6 μ . По *West'y* размѣры: 51—61 μ длины и 32—39 μ ширины.

27. *Euastrum binale* (Turp.) Ehrenb. Forma *sectum* Turn. in *West*, Mon. Desm. II (1905) pag. 53, tab. XXXVIII, fig. 30; *Migula*, Algen Deutschl. (1907) pag. 485; *O. Borge*, Süßwas. Chlorophyce. (1894) pag. 33; *O. Borge*, Algenfl. Schweden (1906) pag. 25.

Мѣстопах.: въ ручьѣ въ Истоминскомъ лѣсу, 6 іюня.

Примѣчан.: измѣреніе этого экземпляра вполне укладывается въ тѣ рамки, которыя даются въ монографіи *West'a*. Размѣры его: длина 23,2 μ , ширина 17,4 μ . По *West'y*: 20—28 μ длины и 16—21 μ ширины.

28. *Euastrum verrucosum* Ehrenb. Var. *coarctatum* Delp., Desm. Subalp. (1873), pag. 83, tab. VI, fig. 16; in *West*, Mon. Desm. II (1905) pag. 66, tab. XL, fig. 4.



Рис. 4. *Euastrum verrucosum* Ehrenb. Var. *coarctatum* Delp. Forma minus Lobik. (Окул. 2, объект. 7 Лейтца, при тубусѣ 170). Слѣва — клѣточка съ широкой стороны; справа — клѣточка съ узкой стороны. Ориг. рис.

Мѣстопах.: на торфяномъ болотѣ бл. Кіевичъ, 8 апр.

Примѣчан.: размѣры данныхъ экземпляровъ довольно значительно отличаются отъ размѣровъ, указанныхъ у *West'a*. Измѣренія этихъ экземпляровъ: длина 75,4—78,3 μ , ширина 60,9—66,7 μ .

По *West*'у размѣры: 92,5 – 97 μ длины и 85—87 μ ширины. Однако, во всѣхъ другихъ отношеніяхъ наши экземпляры вполне соответствуютъ изображеніемъ и описанію var. *coarctatum* *Delp.* и потому могутъ быть выдѣлены въ особую форму *f. minus mihi*.

Micrasterias Ag.

29. *Micrasterias truncata* (Corda) Bréb. in *West*, Mon. Desm. II (1905) pag. 82, tab. XLV, fig. 5, 6; *Ralfs*, Brit. Desm. (1848) pag. 75, tab. VIII, fig. 4, tab. X, fig. 5; *Comère*, Desm. France (1901) pag. 186, tab. XV, fig. 5; *Migula*, Algen Deutschl. (1907) pag. 501; tab. XXV, fig. 5; *O. Borge*, Algenfl. Schweden (1906) pag. 26; *O. Borge*, Süßwas. Chlorophyc. (1894) pag. 35, *Л. Ивановъ*, Озерн. обл. (1901) стр. 72; *Балахонцевъ*, Ладожск. оз. (1909) стр. 185, микрофотогр. № XXIV.

Мѣстонах.: на торфяномъ болотѣ бл. Кіевичъ, 8 апрѣля; на торфяникѣ на берегу М. Тудры бл. Кіевичъ, 30 мая.

Примѣчан.: данные экземпляры своими размѣрами вполне подходятъ подъ измѣренія, данныя *West*'омъ. Длина ихъ 84 μ ширина 81,2—87 μ .

30 *Micrasterias papillifera* Bréb. in *West*, Mon. Desm. II (1905) pag. 91, tab. XLIV, fig. 1, 2, 7; *Ralfs*, Brit. Desm. (1848) pag. 72, tab. IX, fig. 1; *Delpont*, Desm. Subalpin. (1873) pag. 74, tab. IV; fig. 5—6; *Comère*, Desm. France (1901) pag. 189, tab. XIV, fig. 7; *Migula*, Algen Deutschl. (1907) pag. 507, tab. XXV, fig. 4; *O. Borge*, Süßwas. Chlorophyc. (1894) pag. 35; *O. Borge*, Algenfl. Schweden (1906) pag. 27; *Балахонцевъ*, Ладожск. оз. (1909) стр. 186, микрофот. № XXIX.

Мѣстонах.: въ ручьѣ въ Истоминскомъ лѣсу, 6 іюня; на болотистомъ лугу, бл. Луки, 27 іюня.

Примѣчан.: эти экземпляры вполне подходятъ по своимъ размѣрамъ подъ указаніе у *West*'а. Размѣры ихъ: длина 121,8—130,5 μ и ширина 113,1—124,7 μ . По *West*'у: 118—145 μ длины и 108—145 μ ширины.

31. *Micrasterias rotata* (Grev.) Ralfs, Brit. Desm. (1848) pag. 71, tab. VIII, fig. 1; in *West*, Mon. Desm. II (1905) pag. 102, tab. XLVIII, fig. 1—6; *Delpont*, Desm. Subalpin. (1873) pag. 70, tab. IV, fig. 1; *Comère*, Desm. France (1901) pag. 188, tab. XIV, fig. 4; *Migula*, Algen Deutschl. (1907) pag. 507, tab. XXVI, fig. 2; *O. Borge*, Algenfl. Schweden (1906) pag. 27; *Л. Ивановъ*, Озерн. обл. (1901) стр. 72; *Балахонцевъ*, Ладожск. оз. (1909) стр. 186.

Мѣстонах.: на торфяномъ болотѣ бл. Кіевичъ, 30 мая.

Примѣчан.: данный экземпляръ вполне подходитъ подъ

описание у *West'a*. Размеры этого экземпляра: длина 252,3 μ , ширина 220,4 μ . По *West'у*: длина 208—366 μ и ширина 165—305 μ .

32. *Micrasterias Crux-militensis* (Ehrenb.) Hass. in *West, Mon. Desm. II* (1905) pag. 116, tab. LIII, fig. 1—3; *Delpont, Desm. Subalpin.* (1873) pag. 75, tab. IV, fig. 7, 13; *Ralfs, Brit. Desm.* (1848) pag. 73, tab. IX, fig. 3; *Comère, Desm. France* (1901) pag. 187, tab. XV, fig. 3; *Migula, Algen. Deutschl.* (1907) pag. 503, tab. XXVI, fig. 4; *Boldt, Sibiriens Chlorophyl.* (1885) pag. 98; *O. Borge, Süsswas. Chlorophyl.* (1897) pag. 35; *O. Borge, Algenfl. Schweden* (1906) pag. 27; *Балаганцевъ, Ладожск. оз.* (1909) стр. 187.

Мѣстопах.: въ ручьѣ въ Истоминскомъ лѣсу, 6 іюня.

Примѣчан.: этотъ экземпляръ также сходенъ съ указаннымъ у *West'a*. Длина его 116 μ , ширина 104,4 μ . По *West'у* размеры: 107—126 μ длины и 98—118 μ ширины.

33. *Micrasterias Americana* (Ehrenb.) Ralfs Var. *Boldtii* Gutw. in *West, Mon. Desm. II* (1905) pag. 120, tab. LIII, fig. 6.




Рис. 5. *Micrasterias Americana* (Ehrenb.) Ralfs; типичная форма слѣва, Var. *Boldtii* Gutw. — справа. Обѣ фигуры по *West'у* (l. c.).

Мѣстопах.: на торфяномъ болотѣ бл. Кіевнчъ, 30 мая; бл. Языковщины въ канавѣ, 4 іюня.

Примѣчан.: данные экземпляры не сходны съ формами, описанными у *West'a*. Они представляютъ форму среднюю между *Micrasterias Americana Ralfs* и *Micrasterias Americana* Var. *Boldtii* Gutw. Съ послѣднимъ они сходны въ слѣдующемъ: полярныя лопасти болѣе короткія, верхушечный край ихъ слабо вогнутый, но даѣе наши экземпляры ближе подхо-

дять къ типичной формѣ *M. Americana*, а именно у нихъ хорошо развиты придаточные отростки на верхушкахъ полуклѣтокъ, тогда какъ у *Var. Boldtii*, по *Westy*, эти отростки очень редуцированы, иногда исчезающіе на одной или обычныхъ полуклѣткахъ. Затѣмъ боковыя лопасти у *Var. Boldtii* большей частью неправильно зубчатая; у данныхъ же экземпляровъ, наоборотъ, зубчатость боковыхъ лопастей болѣе правильная и ближе подходит къ зубчатости типичной формы.

Размѣры нашихъ экземпляровъ слѣдующіе: длина 116—124,7 μ , при ширинѣ 92,8 μ . Размѣры по *Westy*: типичной формы — длина 125—160 μ , и ширина 100—145 μ ; *Var. Boldtii* — длина 110—137 μ , и ширина 96—111 μ . Такимъ образомъ, наши экземпляры по размѣрамъ стоятъ ближе къ *Var. Boldtii*, куда я ихъ и отношу, но выделяю въ особую форму подъ названіемъ *f. intermedia mihi*, чтобы показать связь ихъ съ типичной формой этого вида.




Рис. 6. *Micrasterias Americana* (Ehrenb.) Ralfs. *Var. Boldtii* Gutw. *Forma intermedia* Lobik. (Окул. 2, объект. 7 Лейтца, при тубусѣ 170). Справа — клѣточка съ широкой стороны; слѣва — клѣточка съ узкой стороны. Ориг. рис.

Cosmarium Corda.

34. *Cosmarium pachydermum* Lund. in *West*, Mon. Desm. II (1905) pag. 139, tab. LVII, fig. 7; *Migula*, Algen Deutschl. (1907) pag. 421, tab. XXIII F, fig. 5; *Comère*, Desm. France (1901) pag. 122, tab. VIII, fig. 1.; *Boldt*, Sibiriens Chlorophyl. (1885) pag. 102; *O. Borge*, Süßwas. Chlorophyc. (1894) pag. 23; *Л. Ивановъ*, Озерн. обл. (1901) стр. 71; *Балаханцевъ*, Ладожск. оз. (1909) стр. 187.

Мѣстопах.: въ канавѣ бл. Сыроѣжнина, 10 апрѣля; на торфяномъ болотѣ бл. Кіевичъ, 30 мая.

Примѣчан.: наши экземпляры по своимъ размѣрамъ вполне совпадаютъ съ данными *West*'а. Размѣры ихъ:

длина 78,3 μ ; ширина 62,2 μ .

„ 89,9 μ „ 75,4 μ .

„ 101,5 μ „ 81,2 μ .

„ 101,5 μ „ 81,2 μ .

По *West*'y: длина 78—117 μ , ширина 69—87 μ .

35. *Cosmarium pyramidatum* Bréb. in *West*, Mon. Desm. II (1905) pag. 199, tab. LXIV, fig. 5—7; *Ralfs*, Brit. Desm. (1848) pag. 94, tab. XV, fig. 4; *Comère*, Desm. France (1901) pag. 120, tab. VIII, fig. 2; *Migula*, Algen Deutschl. (1907) pag. 426, tab. XXIII G, fig. 9; *O. Borge*, Algenfl. Schweden (1906) pag. 37; *М. Пвановъ*, Озерн. обл. (1901) стр. 70.

Мѣстонах.: на торфяномъ болотѣ бл. Кіевичъ, 30 мая.

Примѣчан.: этотъ экземпляръ также совпадаетъ въ своихъ измѣреніяхъ съ измѣреніями, указанными у *West*'a. Длина его 78,3 μ , ширина 46,4 μ . Размѣры у *West*'a: длина 58—100 μ и ширина 45—62 μ .

36. *Cosmarium cymatopleurum* Nordst. Var. *Tyrolicum* Nordst. in *West*, Mon. Desm. III (1908) pag. 6, tab. LXV, fig. 11, 12; *Migula*, Algen Deutschl. (1907) pag. 443.




Рис. 7. *Cosmarium cymatopleurum* Nordst. Var. *Tyrolicum* Nordst. (Окул. 2, объект. 7 Лейтца, при тубусѣ 170). Ориг. рис.

Мѣстонах.: на торфяномъ болотѣ бл. Кіевичъ, 30 мая.

Примѣчан.: эти экземпляры нѣсколько отличаются отъ размѣровъ, указанныхъ у *West*'a; они немного уже.

Длина 81,2 μ ; ширина 58 μ .

„ 83,9 μ ; „ 63,8 μ .

„ 84,1 μ ; „ 63,8 μ .

По *West*'y: длина 80—108 μ ширина 68—77 μ .

37. *Cosmarium obtusatum* Schmidle in *West*, Mon. Desm. III (1908) pag. 7, tab. LXV, fig. 13, 14; — *Cosmarium undulatum* Corda Var. *obtusatum* Schmidle in *Migula*, Algen Deutschl. (1907) pag. 440.

Мѣстопах.: въ ручѣ въ Истоминскомъ лѣсу, 6 іюня.



Рис. 8. *Cosmarium obtusatum* Schmidle — слѣва; *Cosmarium laeve* Rabenh. Var. *octangulare* (Wille) W. et G. S. West — справа. (Объ фигуры при окул. 2, объект. 7 Лейтца и при тубусѣ 170). Ориг. рис.

Примѣчан.: этотъ экземпляръ и въ длину, и въ ширину нѣсколько меньше, чѣмъ указано у *West'a*. Размѣры его: 43,5 μ длины и 40,6 μ ширины. По *West'u* размѣры: длина 48—60 μ , ширина 42—50 μ .

38. *Cosmarium quadratum* Ralfs, Brit. Desm. (1848) pag. 92, tab. XV, fig. 1; in *West*, Mon. Desm. III (1908) pag. 57, tab. LXX, fig. 6—8; *Migula*, Algen Deutschl. (1907) pag. 436; *O. Borge*, Süsswas. Chlorophyc. (1894) pag. 23; *O. Borge*, Algenfl. Schweden (1906) pag. 36; — *Dysphinctium quadratum* (Ralfs) *Hansg.* in *Comère*, Desm. France (1901) pag. 89, tab. V, fig. 20.

Мѣстопах.: на торфяномъ болотѣ бл. Кіевичъ, 30 мая.

Примѣчан.: длина этого экземпляра нѣсколько больше, чѣмъ указано у *West'a*. Размѣры его: длина 67,7 μ и ширина 37,7 μ . По *West'u*: 48—64 μ длины и 25—37 μ ширины.

39. *Cosmarium Debaryi* Arch. in *West*, Mon. Desm. III (1908) pag. 61, tab. LXX, fig. 14—16; tab. XCIII, fig. 2; — *Pleurotaeniopsis* De Baryi (Arch.) *Lund.* in *Migula*, Algen Deutschl. (1907) pag. 397, tab. XXIV B, fig. 2.

Мѣстопах.: на болотистомъ лугу бл. Луки, 27 іюня.

Примѣч.: данный экземпляръ вполнѣ подходит по своимъ измѣреніямъ подъ описаніе у *West'a*. Размѣры его: длина 101,5 μ и ширина 46,4 μ . По *West'u*: 100—112 μ длина и 46—54 μ ширина.

40. *Cosmarium laeve* Rabenh. Var. *octangulare* (Wille) W. et G. S. West, Mon. Desm. III (1908) pag. 101, tab. LXXIII, fig. 20; — *Cosmarium laeve* Rabenh. var. *undulata* Schmidle in *Migula*, Algen Deutschl. (1907) pag. 427.

Мѣстопах.: на торфяномъ болотѣ бл. Кіевичъ, 30 мая.

Примѣчан.: данный экземпляръ, по своимъ размѣрамъ, вполнѣ сходенъ съ размѣрами, указанными у *West'a*, но форма его какъ бы средняя между *Cosmarium laeve* Rabenh. и *Cosmarium laeve* Rabenh. Var. *octangulare* (Wille) W. et G. S. West. Длина его 24,7 μ , ширина 17,4 μ . По *West'u*: длина 21—25 μ и ширина 17—19 μ .

41. *Cosmarium subcrenatum* Hantzsch. in *West*, Mon. Desm. III (1908) pag. 228, tab. LXXXVII, fig. 10—14; *Migula*, Algen Deutschl. (1907) pag. 473, tab. XXIII K, fig. 31; *Comère*, Desm. France (1901) pag. 110, tab. VIII, fig. 8; *Boldt*, Sibriens Chlorophyl. (1885) pag. 106; *O. Borge*, Süßwas. Chlorophyc. (1894) pag. 21; *O. Borge*, Algenfl. Schweden (1906) pag. 34; *Л. Ивановъ*, Озерн. обл. (1901) стр. 31.

Мѣстопах.: на торфяномъ болотѣ бл. Кіевичъ, 8 апр.

Примѣчан.: этотъ экземпляръ по размѣрамъ подходитъ подъ данные у *West*a. Длина 31,9 μ и ширина 26,1 μ . По *West*y: 23—37 μ длины и 18—30 μ ширины.

42. *Cosmarium conspersum* Ralfs, Brit. Desm. (1846) pag. 101, tab. XVI, fig. 4; in *West*, Mon. Desm. IV (1912) pag. 13, tab. XCIX, fig. 1, 2; *Migula*, Algen Deutschl. (1907) pag. 464, tab. XXIV C, fig. 11; *Comère*, Desm. France (1901) pag. 130, tab. IX, fig. 9; *Boldt*, Sibriens Chlorophyl. (1885) pag. 106; *O. Borge*, Süßwas. Chlorophyc. (1894) pag. 20.

Мѣстопах.: въ ручьѣ въ Истоминскомъ лѣсу, 6 іюня.

Примѣчан.: данный экземпляръ вполне сходенъ съ описаніемъ у *West*a. Размѣры его: длина 84,1 μ и ширина 69,6 μ . По *West*y: 82—100 μ длины и 65—77 μ ширины.

43. *Cosmarium Quadrum* Lund. in *West*, Mon. Desm. II (1912) pag. 20, tab. C, fig. 3—6; *Migula*, Algen Deutschl. (1907) pag. 480, tab. XXIV C, fig. 10; *Comère*, Desm. France (1901) pag. 130, tab. VIII, fig. 9; *Boldt*, Sibriens Chlorophyl. (1885) pag. 107; *O. Borge*, Süßwas. Chlorophyc. (1894) pag. 20; *O. Borge*, Algenfl. Schweden, 1906) pag. 30.

Мѣстопах.: на торфяномъ болотѣ бл. Кіевичъ, 30 мая.

Примѣчан.: размѣры этого экземпляра отличаются отъ размѣровъ, указанныхъ у *West*a; онъ нѣсколько короче и уже. Длина его 49,3 μ и ширина 46,4 μ . Размѣры по *West*y: 60—83 μ длины и 54—74 μ ширины.

44. *Cosmarium pseudamoenum* Wille in *West*, Mon. Desm. IV (1912) pag. 31, tab. CII, fig. 7—9; *Migula*, Algen. Deutschl. (1907) pag. 448, tab. XXIII L, fig. 19.



Рис. 9. *Cosmarium pseudamoenum* Wille. (Окул. 2, объект. 7 Лейтца, при тубусѣ 170). Ориг. рис.

Мѣстопах.: на торфяномъ болотѣ бл. Кіевичъ, 30 мая.

Примѣчан.: эти экземпляры совпадаютъ съ данными, ука-

запными у *West'a*. Длины ихъ $43,5 \mu$ и ширина $20,3—23,2 \mu$. По *West'u* размеры: $44—59 \mu$ длины и $18—29 \mu$ ширины.

Xanthidium Ehrenb.

45. *Xanthidium antilopaeum* (Bréb.) Kütz. in *West*, Mon. Desm. IV (1912) pag. 63, tab. C VIII, fig. 7—18; *Comère*, Desm. France (1901) pag. 193, tab. XVI, fig. 14; *Migula*, Algen Deutschl. (1907) pag. 516, tab. XXVII D, fig. 3; *Boldt*, Sibiriens Chlorophyl. (1885) pag. 110; *O. Borge*, Süsswas. Chlorophyc. (1894) pag. 19; *O. Borge*, Algenfl. Schweden (1906) pag. 28; *Л. Ивановъ*, Озерн. обл. (1901) стр. 70; *Балаганцевъ*, Ладожск. оз. (1909) стр. 190, микрофотогр. № XXVIII; — *Xanthidium fasciculatum* (Ehr.) in *Ralfs*, Brit. Desm. (1848) pag. 114, tab. XX, fig. 1.




Рис. 10. *Xanthidium antilopaeum* (Bréb.) Kütz. Справа — типичная форма; слева — форма, отклоняющаяся положеніемъ зубцовъ. (Окул. 2, объект. 7 Лейтца, при трубѣ 170). Ориг. рис.

Мѣстонах.: на торфяникѣ около Булышнинскаго озера, 6 іюня; на болотистомъ лугу бл. Луки 27 іюня.

Примѣчан.: экземпляръ, взятый 6 іюня, своимъ обликомъ отличается отъ типичной формы, описанной у *West'a*, съ которой вполне сходенъ экземпляръ, найденный 27 іюня.

Разница заключается въ расположеніи зубцовъ на верхнихъ сторонахъ полуклѣтокъ, которые расположены почти горизонтально тогда какъ у типичной формы они стоятъ болѣе вертикально.

Въ первомъ случаѣ длина $55,1 \mu$ ширина $52,2 \mu$ съ зубцами; размеры зубцовъ $11,6 \mu$. Во второмъ случаѣ длина $60,9 \mu$ ширина $52,2 \mu$, также съ зубцами; размеры зубцовъ нѣсколько меньше $10,15 \mu$. По *West'u* размеры: длина (безъ зубцовъ) $42—76 \mu$, длина (съ зубцами) $54—114 \mu$; ширина (безъ зубцовъ) $42—72 \mu$, ширина (съ зубцами) $57—108 \mu$.

46. *Xanthidium cristatum* Bréb. Var. *Delpontii* Roy et Biss. in *West*, Mon. Desm. IV (1912) pag. 74, tab. CXI, fig. 5.

Мѣстопах.: на болотистомъ лугу бл. Луки, 27 іюня.




Рис. 11. *Xanthidium cristatum* Bréb. Var. *DePontei* Roy et Biss. (Окул. 2, объект. 7 Лейтца, при тубусѣ 170). Ориг. рис.

Примѣчан.: по формѣ данный экземпляръ сходенъ съ описаніемъ у *West'a*, но отличается скульптурой оболочки на полуклѣткахъ. По количеству и расположенію зернышекъ на полуклѣткахъ онъ подходитъ къ Var. *uncinatum* Bréb. Размѣры его нѣсколько меньше, чѣмъ указано у *West'a*: длина безъ зубцовъ 52,2 μ , ширина безъ зубцовъ 46,4 μ ; длина зуба 8,7 μ . По *West'у* размѣры: длина (безъ зубцовъ) 54—61 μ , длина (съ зубцами) 86—95 μ ; ширина (безъ зубцовъ) 53—56 μ и ширина (съ зубцами) 76—88 μ .

47. *Xanthidium fasciculatum* Ehrenb. in *West*, Mon. Desm. IV (1912) pag. 75, tab. CXI, fig. 5—8; *Comère*, Desm. France (1901) pag. 192, tab. XV, fig. 8; *Boldt*, Sibiriens Chlorophyl. (1885) pag. 110; *O. Borge*, Süsswas. Chlorophyc. (1894) pag. 19; *O. Borge*, Algenfl. Schweden (1906) pag. 28; *Л. Ивановъ*, Озерн. обл. (1901) стр. 70; — *Xanthidium fasciculatum* (Ehr.) β . *polygonum* Ralfs, Brit. Desm. (1848) pag. 114, tab. XIV, fig. 4.

Мѣстопах.: на торфяномъ болотѣ бл. Кіевичъ, 30 мая.

Примѣчан.: по своимъ размѣрамъ этотъ экземпляръ сходенъ съ указаннымъ у *West'a*. Длина его безъ зубцовъ 52,2 μ ширина безъ зубцовъ тоже 52,2 μ ; длина зубцовъ 7,25 μ . По *West'у* измѣренія: длина (безъ зубцовъ) 44—66 μ , длина (съ зубцами) 65—74 μ ; ширина (безъ зубцовъ) 44—59 μ и ширина (съ зубцами) 62—72 μ .

Arthrodesmus Ehrenb.

48. *Arthrodesmus convergens* Ehrenb. in *West*, Mon. Desm. IV (1912) pag. 106, tab. CXXI, fig. 4—13; *Ralfs*, Brit. Desm. (1848) pag. 118, tab. XX, fig. 3; *Comère*, Desm. France (1901) pag. 148, tab. X, fig. 12; *Migula*, Algen Deutschl. (1907) pag. 510, tab. XXVIII, fig. 1; *O. Borge*, Algenfl. Schweden (1906) pag. 49; *Л. Ивановъ*, Озерн. обл. (1901) стр. 71; *Балахонцевъ*, Ладожск. оз. (1909) стр. 192.

Мѣстопах.: на болотистомъ лугу бл. Луки, 27 іюня.

Примѣчаніе: наши экземпляры по своимъ размѣрамъ вполне сходятся съ данными *West*'a. Размѣры ихъ: длина 37,7—46,4 μ , ширина (безъ шиповъ) 40,6—52,2 μ , ширина съ шипами) 58—66,7 μ ; длина шиповъ 10,15—8,7 μ . Измѣренія по *West*'у: ширина (безъ шиповъ) 40—64 μ ; ширина (съ шипами) 50—90 μ , длина шиповъ 5,5—15 μ .

Staurastrum Meyen.

49. *Staurastrum Meriani* Reinsch in *West*, Mon. Desm. IV (1912), pag. 122, tab. CXVIII, fig. 4—6; *Comère*, Desm. France (1901) pag. 178, tab. XIII, fig. 7; *Migula*, Algen Deutschl. (1907), pag. 528, tab. XXVIII F, fig. 3.

Мѣстонах: на торфяномъ болотѣ бл. Кіевичъ, 30 мая.

Примѣчаніе: этотъ экземпляръ не отличается по своимъ размѣрамъ отъ данныхъ *West*'a. Измѣренія его: длина 37,7 μ , ширина въ верхней части 23,2 μ и въ срединѣ ширина 14,5 μ . По *West*'у размѣры: длина 36—46 μ , ширина на верху 20—26 μ и въ срединѣ 13—18 μ .

50. *Staurastrum spongiosum* Brèb. in *Ralfs*, Brit. Desm. (1848), pag. 141, tab. XXIII, fig. 4; *Migula*, Algen Deutschl. (1907), pag. 531, tab. XXVIII, fig. 16; *Comère*, Desm. France (1909), pag. 169, tab. XII, fig. 16; *Boldt*, Sibiriens Chlorophyl. (1885), pag. 118; *O. Borge*, Algenfl. Schweden (1906), pag. 48; *Баларонцевъ*, Ладожск. оз. (1909), стр. 193.

Мѣстонах: въ канавѣ бл. Сыроѣжина 10 апр.

Примѣчаніе: измѣренія данныхъ экземпляровъ:

длина 58 μ , ширина 43,5 μ .

„ 58 μ , „ 46,4 μ .

„ 37,7 μ , „ 37,7 μ .

Размѣры при разсматриваніи сверху 40,6 μ .

51. *Staurastrum subbrebissonii* Schmidle in *Migula*, Algen Deutschl. (1907), pag. 532, tab. XXVIII B, fig. 15.

Мѣстонах: на торфяномъ болотѣ бл. Кіевичъ, 30 мая.




Рис. 12. *Staurastrum subbrebissonii* Schmidle. Слева — клѣточка сбоку; справа — клѣточка сверху. (Окул. 2, объект. 7 Лейтца, при тѣбуфѣ 130).

Ориг. рис.

Примѣчаніе: измѣренія данныхъ экземпляровъ:

длина 52,2 μ , ширина 49,3 μ , длина шиповъ 2,96 μ .

„ 52,2 μ , „ 52,2 μ .

52. *Staurostrum paradoxum* Meyen in *Migula*, Algen Deutschl. (1907), pag. 552, tab. XXVIII B, fig. 3; *Ralfs*, Brit. Desm. (1848), pag. 138, tab. XXIII, fig. 8; *Comère*, Desm. France (1901), pag. 156, tab. XI, fig. 19; *Boldt*, Sibiriens Chlorophyll. (1885), pag. 118; *O. Borge*, Süßwas. Chlorophyc. (1894), pag. 38; *Балахонцевъ*, Ладожск. оз. (1909), стр. 196.

Мѣстопах.: на болотистомъ лугу бл. Луки, 24 іюня.

Примѣчан.: размѣры данныхъ экзempl.: длина 31,9—46,4 μ .

Hyalotheca Kg.

53. *Hyalotheca dissiliens* (Smith) Bréb. in *Ralfs*, Brit. Desm. (1848), pag. 51, tab. I, fig. 1; *Migula*, Algen Deutschl. (1907), pag. 558, tab. XXI, fig. 1; *Comère*, Desm. France (1901), pag. 196, tab. XVI, fig. 7; *Boldt*, Sibiriens Chlorophyll. (1885), pag. 122; *O. Borge*, Süßwas. Chlorophyc. (1894), pag. 13; *O. Borge*, Algenfl. Schweden (1906), pag. 53; *Л. Ивановъ*, Озерн. обл. (1901), стр. 66.

Мѣстопах.: на торфяномъ болотѣ бл. Кіевичъ, 30 мая.

Примѣчан.: измѣренія кѣттокъ этого экзemplяра: длина 19,6 μ и ширина 28 μ .

Didymoprium Kg.

54. *Didymoprium Borreri* Ralfs, Brit. Desm. (1848), pag. 58, tab. III; — *Bambusina Brebissonii* Ktz. in *Comère*, Desm. France (1901), pag. 198, tab. XVI, fig. 3; *Boldt*, Sibiriens Chlorophyll. (1885), pag. 123.

Мѣстопах.: торфяное болото въ Бороносовекомъ бору, 3 іюля.

Примѣчан.: измѣренія даннаго экзemplяра: длина 23,2—26,2 μ и ширина 14,5 μ .

Desmidium (Ag.) Ralfs.

55. *Desmidium Schwartzii* Ag. in *Ralfs*, Brit. Desm. (1848), pag. 61, tab. IV; *Comère*, Desm. France (1901), pag. 200, tab. XVI, fig. 11; *Migula*, Algen Deutschl. (1907), pag. 560, tab. XXI, fig. 4; *Boldt*, Sibiriens Chlorophyll. (1885), pag. 124; *O. Borge*, Süßwas. Chlorophyc. (1894), pag. 13; *O. Borge*, Algenfl. Schweden (1906), pag. 52; *Л. Ивановъ*, Озерн. обл. (1901), стр. 66.

Мѣстопах.: въ канавѣ около Языковщины 4 іюня.

Примѣчан.: измѣренія даннаго экзemplяра: длина 17,4 μ и ширина 40,6 μ .

Списокъ литературы.

- Арпольди, В. М. Введение въ изученіе низшихъ организмовъ. 2-о изданіе, 1908 г.
- Bachmann, Hans. Das Phytoplankton des Süßwassers mit besonderer Berücksichtigung des Vierwaldstättersees. Jena 1911.
- Балахонцевъ, Е. И. Ботанико-біологическія изслѣдованія Ладожскаго озера. 1909 г.
- Boldt, R. Om Sibiriens Chlorophyllophyceer. 1885.
- Borge, O. Süßwasser Chlorophyceen gesammelt von Dr. A. Osw. Kielman in Nördlichen Russland Gouvernement Archangel. 1894.
- Borge, O. Beiträge zur Algenflora von Schweden. 1906.
- Comère. Les Desmidiées de France. 1901.
- Delpont, J. B. Specimen Desmidiacearum Subalpinarum 1873.
- Ивановъ, Леонидъ. Наблюденія надъ водной растительностью Озерной области. 1901.
- Migula, W. Die Desmidiaceen. Ein Hilfsbuch für Anfänger bei der Bestimmung der am häufigsten vorkommenden Formen. 1911.
- Migula, W. Kryptogamenflora von Deutschland, Deutsch-Österreich und der Schweiz im Anschluss an Thomé's Flora von Deutschland. Band II Algen. I Teil. 1907.
- Ralfs, I. The British Desmidiaceae. 1848.
- De-Toni. Sylloge Algarum. Vol. I, sect. 2, 1889, pag. 777—1236.
- W. und G. S. West. A Monograph of the British Desmidiaceae Vol. I 1904; Vol. II — 1905; Vol. III — 1908; Vol. IV — 1912.
- Wittrock, Nordstedt, Lagerheim. Algae aquae dulcis exsiccatae, praecipue Scandinaviae, quas adjectis algis marinis Chlorophyllaceis et Phaeochromaceis.

A. J. Lobik.

Desmidiaceae im Gouv. Pskow, Kreis Cholm im Jahre 1912 gesammelt.

Der Verfasser giebt in systematischer Anordnung ein Verzeichniss der 52 Arten (55 Formen) der Desmidiaceen, unter welchen einige Formen von den typischen und bekannten durch Habitus oder Dimensionen mehr oder weniger abweichen, z. B.: *Euastrum verrucosum Ehrenb.* var. *coarctatum Delp.* f. *minus Lobik* (nov. f.), *Micrasterias Americana (Ehrenb.) Ralfs* Var. *Boldtii Gutw.* f. *intermedia Lobik* (nov. f.).

Сообщенія изъ Императорскаго Ботаническаго Сада.

11-го іюня с. г. состоялось, съ Высочайшаго соизволенія, торжественное празднованіе 200-лѣтія Императорскаго Ботаническаго Сада.

Наканунѣ, 10-го іюня, чины Сада, во главѣ съ Директоромъ и представителемъ Ея Императорскаго Высочества Августѣйшей Покровительницы и Попечительницы Сада, княземъ А. Е. Гагаринымъ возложили вѣнокъ изъ живыхъ цвѣтовъ на гробницу Государя Императора Петра Великаго, въ Петропавловскомъ Соборѣ, и отслужили панихиду по Державномъ Основателѣ Сада.

Къ юбилею Садъ былъ осчастливленъ **Высочайшею** Грамотою и дарованіемъ ему титула „Императорскаго Ботаническаго Сада **Петра Великаго**“.

По случаю юбилея, Всемилостивѣйшій Рескриптъ изволила получить Августѣйшая Покровительница и Попечительница Сада, Ея Императорское Высочество Принцесса Евгенія Максимиліановна Ольденбургская.

О самомъ торжествѣ празднованія 11-го іюня 200-лѣтія Сада, равно какъ и объ осмотрѣ частей Сада 12-го іюня, поѣздкѣ въ тотъ же день въ Петергофъ и спектаклѣ въ народномъ Домѣ, будетъ сообщено подробно въ особомъ Отчетѣ о юбилеѣ, который по выходѣ будетъ разосланъ также всѣмъ, получающимъ „Извѣстія“.

Къ юбилею Сада вышли изъ печати: 1) „Императорскій С.-Петербургскій Ботаническій Садъ за 200 лѣтъ его существованія. — Юбилейное изданіе, составленное членами Сада, подъ главной редакціей А. А. Фишера-фонъ-Вальдгейма“. Части I, II и III. Съ многочисленными рисунками и планомъ. 2) Краткій Путеводитель по Императорскому Ботаническому Саду. 2-е изданіе. В. Н. Линскаго. 3) Отчетъ о состояніи и дѣятельности Императорскаго С.-Петербургскаго Ботаническаго Сада за 1912 г.

Станція для испытанія сѣмянъ приняла участіе въ Всероссийской выставкѣ въ Кіевѣ, выставивъ таблицы и графики, рисующіе ея дѣятельность, а также результаты главнѣй-

шихъ ся работъ. — На Всероссийской гигиенической выставкѣ въ С.-Петербургѣ Станція выставила образцы фальсификаціи муки, приборы, применяемые Станціей, а также культуры микроорганизмовъ, встречающихся на проростающихъ сѣменахъ.

А. Фишеръ-фонъ-Вальдгеймъ.

Communications du Jardin Impérial botanique.

Le Jubilé bicentenaire du Jardin Impérial botanique a eu lieu le 11-24 juin. Par Ordre de Sa Majesté le Jardin a reçu le titre „Jardin Impérial botanique de **Pierre le Grand**“. Le Compte rendu détaillé du Jubilé sera publié et distribué sous peu.

À l'occasion du Jubilé un Rescrit Impérial a été reçu par Son Altesse Impériale la Princesse Eugénie d'Oldenbourg, Auguste Protectrice et Curatrice du Jardin.

Viennent de paraître le jour du Jubilé: 1) „Le Jardin Impérial botanique de St.-Petersbourg pendant 200 ans de son existence“. 2) „Petit Guide du Jardin Impérial botanique“. 2-e édition. Par Lipski. 3) Compte rendu du Jardin Impérial botanique pour l'année 1912.

La Station d'essai de semences a pris part aux Expositions russes de Kiew et Hygiénique de St.-Petersbourg.

A. Fischer de Waldheim.

ИЗВѢСТІЯ

ИМПЕРАТОРСКАГО

Ботаническаго Сада Петра Великаго.

Томъ XIII, выпускъ 4.

Содержаніе.

Два новыхъ вида *Buddleia* изъ Гербарія Императорскаго С.-Петербургскаго Ботаническаго Сада. *Ф. Кренцлина.*

Критическія замѣтки относительно *Bomarea denticulata* Herb. *Ф. Кренцлина.*
„*Onobrychis supina*“ въ Бессарабін. *В. А. Федченко.*

Исслѣдованія надъ испареніемъ кактусовъ. *И. Л. Бедельяна.*

О стѣрныхъ микроорганизмахъ Галсальскаго залива. *Г. А. Надсона.*

Сообщенія изъ Императорскаго Ботаническаго Сада. *А. А. Фишера-фонъ-Вальштейна.*

BULLETIN

DU JARDIN IMPÉRIAL BOTANIQUE

DE PIERRE LE GRAND.

Tome XIII, livraison 4.

Sommaire.

Zwei neue *Buddleia*-Arten aus dem Herbarium des Kaiserl. St.-Petersburger Botanischen Gartens. *Fr. Kränzlin.*

Kritische Bemerkungen über *Bomarea denticulata* Herb. *Fr. Kränzlin.*

„*Onobrychis supina*“ in Bessarabien. *B. A. Fedtschenko.*

Untersuchungen über die Transpiration der Kacteen. *J. L. Bedelian.*

Ueber Schwefelmikroorganismen des Hapsaler Meerbusens. *G. A. Nadson.*

Communications du Jardin Impérial botanique. *A. A. Fischer de Waldheim.*

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1913.

Фр. Кренцлинъ.

Два новыхъ вида *Buddleia* изъ Гербарія Императорскаго
С.-Петербургскаго Ботаническаго Сада.

***Buddleia amentacea* Kränzl. n. sp. (Alternifoliae, Sect. nova).**

Speciminis unici pars, quae suppetit, ramus circ. 20 ad 22 cm. longus, gracilis, tenuis, tomento brevi, griseo, denso tectus. Folia alterna e petiolo brevi v. subnullo anguste v. imo lineari-lanceolata, basin versus angustata, acuminatissima, superne glabra, rugulosa, subtus griseo-puberula, margine revoluta, maxima ad 10 cm. longa, circ. 1 cm. lata, suprema multo minora, omnia inflorescentia longiora. Inflorescentiae spicatae v. amentaceae, ad 5 cm. longae, glomerulis parvis paucifloris compositae, bractae glomerulorum lineares. Calyx extus griseo-pilosus, cylindraceus, supra dimidium in lobos 4 triangulos acutos divisus, 2 mm. longus, quam pedicelli etiam breviores paulo longior. Corolla cylindracea, calyce paulo longior, 3 mm. longa, extus dense villosa, lobis conniventes, subquadrati, leviter emarginati (!), intus in dimidio superiore tubi pilosa, infra glabra. Antherae paulum infra orificium tubi insertae, filamenta subnulla. Ovarium etiam sub anthesi crassiusculum, villosum, stylus ovario aequilongus, stigma breviusculum, minute bilobum; capsulae calycem aequantes. Patria ignota. Java (??).

Собиратель неизвѣстенъ.

Въ Гербаріи Императорскаго С.-Петербургскаго Ботаническаго Сада находится хорошо сохранный вѣтвь этого совершенно особеннаго растенія, причемъ на этикеткахъ обозначено названіе, котораго я не могъ найти нигдѣ въ литературѣ, именно *B. missouriensis* Kl., — повидимому, это названіе никогда не было опубликовано.

Несомнѣнно, что ближайшій къ нашему растенію видъ есть *B. alternifolia* Maxim., относительно котораго могу

повторить здѣсь только то, что говоритъ и Максимовичъ при описаніи его: „*Toto habitu et structura florum exacte cum Buddleiis oppositifoliis conveniens, ita ut de genere vix ulla dubia supersint*“. Нашъ видъ отличается отъ растенія, описаннаго Максимовичемъ цѣлымъ рядомъ признаковъ, изъ которыхъ прежде всего бросается въ глаза совершенно иная окраска цвѣтовъ, которая никоимъ образомъ не могла быть здѣсь — „*violacea*“; затѣмъ у *B. alternifolia* вѣлчикъ вътрое длиннѣе чашечки, а у нашего растенія вѣлчикъ едва въ 1 мм. длины. Кромѣ того, если я правильно понимаю описаніе Максимовича, существуетъ значительное различіе въ цвѣторасположеніи. Къ сожалѣнію, мѣстонахожденіе на этикеткѣ нашего растенія написано крайне не разборчиво и я опасаясь, что оно бѣгло написано по русски. Первое слово можно читать „Java“, но оно можетъ имѣть и другое значеніе.¹⁾ *B. alternifolia* родомъ изъ западнаго Китая, а именно изъ провинціи Кан-су, на южномъ берегу р. Гоанг-го.

Другой видъ, съ очередными листьями, не вызываетъ сомнѣнія въ принадлежности своей къ роду *Buddleia*, но заставляетъ насъ установить для него новую секцію въ этомъ родѣ. Только у этого вида, изъ числа мною вновь устанавливаемыхъ, оказались болѣе существенныя отклоненія отъ предложенной еще *Bentham* группировки рода *Buddleia* (въ *Prodrömus* Декандоля); во всѣхъ другихъ случаяхъ мнѣ удалось сопоставить многочисленные новые виды со старыми, ранѣе описанными.

***Buddleia bracteolata* Kränzl. n. sp.**

(Sect. I. Logada, § 1 Paniculatae).

Frutex? Ramus, qui adest, 18 cm. longus, cortice griseo, albidopiloso omnino tectus, internodia brevia, 1 ad 1.5 cm. longa. Folia subsessilia v. brevissime petiolata, oblonga, acuta, apice saepius semitorta, superne strigosa, minute rugulosa v. bullata, margine integra, subtus sparse et in venis tantum densius pilosa, maxima 9—10 cm. longa, 3 cm. lata, rarius sublatiosa, suprema vix minora, inflorescentiam superantia, interfloralia lanceolata, multo minora. Inflorescentia plana, corymbosa, ramis inter se subaequilongis, basi foliis satis conspicuis suffultis, pedunculi omnino nec non pedicelli calycesque setosi; illi primi ordinis 2 cm. longi, se-

1) Замѣтка редакціи: при провѣркѣ оказалось, что оба слова написаны латинскими буквами, причемъ первое слово дѣйствительно можно читать „Java“: второе, очевидно, фамилія собирателя, къ сожалѣнію, остается неразборчивымъ.

quentes multo breviores. Flores denique in capitula dispositi. Bractae densae aggregatae, lere strobilum referentes, latae triangularae, acutae, fimbriatae, tenerae, trilineatae, basillares vix 1,5 mm. longae, insuperiores multo minores. Calyx profunde bipartitus, lobi trianguli, acuti, setosi, margine longe ciliati. Corolla calycem paulum superans, e basi angusta campanulata, lobi subquadrati, extus longe setosi. Antherae in orificio fundi sessiles, pro flore magni; ovarium minutum, stylus gracilis, rario elongatus, stigma magnum, paulum dependens v. incurvum. Totus flos 2,5 mm. vix excedens.

Mexico. (Karwinsky. Iter mexicanum 1841 et 1842 № 696!) — Herb. Fischer.

Есть 3 признака, которые не советѣмъ подходить къ типичнымъ *Buddleia*: 1) опушеніе, состоящее изъ прозрачныхъ щетинокъ, 2) чашечка, сросшаяся въ 2 большія лопасти, расположенныя по боковымъ сторонамъ цвѣтка и 3) спиральное расположеніе цвѣтовъ.

Всѣ другіе признаки совершенно тѣ-же, что и у *Buddleia*, въ особенности же вѣтчикъ съ тычинками, цвѣторасположеніе въ общемъ и внѣшній видъ. Что касается до особенностей опушенія, то ими можно легко пренебречь, ибо нельзя говорить о характерномъ для *Buddleia* опушеніи, какъ это дѣлалось. Есть достаточно растений съ подобнымъ буро-краснымъ или ржавого цвѣта войлочнымъ опушеніемъ, которыя на основаніи этихъ признаковъ, ошибочно причислены къ *Buddleia* въ разныхъ гербаріяхъ. Гораздо больше надо принимать во вниманіе второй признакъ — двухраздѣльную чашечку, потому что это является замѣчательнымъ исключеніемъ изъ общаго правила у такого постояннаго, если не сказать, однообразнаго по составу рода, однако и этому можно найти аналогичные случаи.

Изъ четырехъ нормальныхъ чашечныхъ долей сохранились только обѣ боковыя, тогда какъ лежащая на средней линіи недоразвилась. Сростаніе чашечныхъ долей по 2 является мало вѣроятнымъ, но крайней мѣрѣ нерватура не даетъ никакихъ основаній къ такому предположенію. Хуже всего дѣло обстоятъ съ развѣтвленіями послѣдняго порядка; въ цвѣторасположеніи — съ „головками“. Онѣ у всѣхъ *Buddleia* обыкновенно съ болѣе или менѣе яснымъ дихазіальнымъ или трихазіальнымъ развѣтвленіемъ, что легко можно замѣтить, если головки рыхлы, но это менѣе ясно, если онѣ сжаты; кромѣ того видно, что и на головкахъ соблюдается опредѣленный порядокъ въ расцвѣтаніи. Это, какъ извѣстно, обыкновенное явленіе у всѣхъ растений типа „губоцвѣтныхъ“ къ которымъ раньше причислялась *Buddleia*,

а также у всѣхъ „*Gentianinae*“, къ которымъ относятся этотъ родъ въ настоящее время.

Вмѣсто этого, мы здѣсь имѣемъ правильное кистевидное цвѣторасположеніе, въ которомъ первыми распускаются нижніе цвѣтки; это обстоятельство настолько важно, что можно было-бы думать даже объ отнесеніи нашего растенія въ совсѣмъ другой порядокъ. Но все остальное, т. е. вѣтчикъ со своими 4, высоко расположенными тычинками, а также цѣльное рыльце и, наконецъ, характеръ сѣмяпочекъ — все это опять указываетъ на типичную *Buddleia*. Вѣтшій видъ также согласуется съ этимъ; и только прицвѣтные листья нарушаютъ здѣсь общую картину. Часть ихъ, именно листья высшаго порядка (въ пазухахъ которыхъ расположены вѣточки соцвѣтія) — совершенно похожи на обычные листья; листья же, несущіе въ своихъ пазухахъ самые цвѣты, представляютъ собою широкіе яйцевидные, рѣсничатые прицвѣтники, которые своими верхушками далеко превышаютъ почки. Еще на одинъ признакъ хотѣлъ бы я обратить вниманіе, хотя его важность можно и оспаривать. Вода, въ которой я варилъ цвѣты во время изслѣдованія, приняла черезъ нѣсколько часовъ совершенно такую-же желтоватую окраску, какая получается и отъ другихъ видовъ *Buddleia*. Къ сожалѣнію, этикетировка описываемаго растенія не вполне достаточна. Экземпляръ этотъ — изъ гербарія Фишера, этой драгоценнѣйшей составной части Гербарія Императорскаго С.-Петербургскаго Ботаническаго Сада.

Fr. Kränzlin.

Zwei neue *Buddleia*-Arten aus dem Herbarium des St.-Petersburger Kaiserl. Botanischen Gartens

Résumé.

Buddleia amentacea Kränzlin n. sp. — [*Alternifoliae*, sect. nova]. Die Diagnose s. oben.

Patria incerta: Java. (?). Sammler unbekannt.

Im Herbarium von St. Petersburg findet sich ein gut erhaltener Zweig dieses sonderbaren Gewächses, unter dem wohl nie publizierten, in der Literatur wenigstens mir unauffindbarem Namen *B. microcarpa* Kl. Es ist ganz klar, dass die nächstverwandte

Art *B. alternifolia* Maxim. ist und ich kann hier nur wiederholen, was Maximowicz gelegentlich dieser Art sagt: „Toto habitu et structura florum cum *Buddleia oppositifolia* conveniens, ita ut de genere vix ulla dubia supersint“. Von jener Art unterscheidet sich diese hier durch eine ganze Anzahl von Merkmalen, deren zunächst auffälligstes wohl die abweichende Blütenfarbe ist, die hier unmöglich „violacea“ gewesen sein kann: sodann ist bei *B. alternifolia* die Blumenkrone dreimal länger als der Kelch, hier aber knapp 1 Millimeter lang. Ferner sind die Blütenstände, wenn ich den Text richtig deute, ganz verschieden. — Leider ist die Standortsangabe unleserlich und ich bin meiner Sache nicht sicher, ob es nicht flüchtig geschriebenes russisch ist. Das erste Wort kann Java gelesen werden, kann aber auch anders lauten. — *B. alternifolia* Max. stammt aus West-China, aus der Provinz Kan-Su vom Südufer des Hoang-ho. — Eine zweite unzweifelhafte Art mit wechselständigen Blättern macht die Aufstellung eines neuen Tribus zulässig oder notwendig. Es ist dies die einzige tiefer greifende Abweichung von der einst von Bentham aufgestellten Gruppierung der *Buddleia*-Arten in *Decandolles* Prodomus; in allen andren Fällen habe ich die zahlreichen neuen Arten den alten angliedern können.

Buddleia bracteolata Kränzl. n. sp. — [Sect. I. Logada § 1 *Paniculatae*] Die Diagnose s. oben.

Mexico. (Karwinsky. Iter mexicanum 1841, 1842, № 696; — Herb. Fischer).

Drei Merkmale sind es, welche nicht in den Rahmen einer typischen *Buddleia* passen: 1) Die aus hyalinen Borsten bestehende Behaarung, 2) der zu 2 grossen, seitlich gestellten Abschnitten verwachsene Kelch und 3) die spiralige Anordnung der Blüten. Alle andern Merkmale sind die einer *Buddleia*, ganz besonders die Blumenkrone nebst Staubgefässen, der Blütenstand im ganzen und der Habitus. — Am leichtesten wird man sich über die abweichende Behaarung hinwegsetzen dürfen, denn von einer spezifischen *Buddleia*-Behaarung zu reden, wie dies gelegentlich geschehen ist, geht nicht an. Es giebt Pflanzen genug mit ähnlichem braunrotem oder rostfarbigem Wollfilz und an auf dieses Merkmal hin missverstandenen Nicht-*Buddleia* ist in den Herbarien kein Mangel. — Schwerer wiegt das zweite Merkmal, der zweitheilige Kelch, denn diese Ausnahme von der Regel ist bei einer so überaus consequent, um nicht zu sagen, monoton gebauten Gattung sehr aussergewöhnlich. Schliesslich wären auch hierfür Analoga zu finden. Von den 4 normalen Kelchzipfeln sind die beiden seitlichen erhalten, die in der Mediane der Blüte liegenden dagegen unterdrückt. An eine

Verschmelzung von je 2 Kelchabschnitten möchte ich nicht glauben, wenigstens gibt die Nervatur hierfür keinen Anhalt. Am übelsten steht es mit den Teilblütenständen letzter Ordnung, d. h. den „Köpfchen“. Diese sind sonst bei allen Buddleien mehr oder minder klar dichasisch oder trichasisch verzweigt, eine Anordnung, die, wenn die Köpfchen locker sind, leicht zu erkennen ist, minder klar, wenn sie gedrängt sind; ausserdem sieht man, dass auch an den Köpfchen eine gewisse Folge des Aufblühens innegehalten wird. Dies ist, wie bekannt, Geflogenheit bei allem, was sich labiati-flor nennt, wohin man *Buddleia* früher rechnete, und bei allen „*Gentianinae*“ wozu man diese Gattung jetzt rechnet, nicht minder. — Statt dessen haben wir hier einen regelrecht botrytischen Blütenstand mit akropetaler Blühfolge; eine Ausnahme von solcher Wichtigkeit, dass man versucht sein könnte, die Pflanze in eine ganz andre Verwandtschaft zu verweisen. Aber, was nun folgt, die Blumenkrone mit ihren 4 hoch inserierten Antheren und der ganze Stempel bis zu den Samenkörnern, das alles ist wieder völlig „*Buddleia*“. — Auch der Habitus stimmt hiermit. Nur die Deckblättchen allein stören das Bild etwas; diejenigen höherer Ordnung sind nämlich völlige Laubblätter, die der Blüten sind breit eiförmige, gewimperte Hochblätter, welche mit ihren Spitzen die Knospen weit überragen. Ein Merkmal möchte ich schliesslich noch erwähnen, über dessen Wichtigkeit allerdings man streiten kann. Das Wasser, in welchem ich die Blüten aufkochte, nahm nach ein paar Stunden genau denselben gelblichen Farbenton an, wie man ihn bei andren Buddleien beobachtet. — Leider ist die Etikettierung ganz ungenügend. — Das Exemplar stammt aus dem „Herb. Fischer“, welches einen so wertvollen Teil des St. Petersburger Herbars ausmacht.

Ф. Кренцлинъ.

Критическія замѣтки относительно *Bomarea denticulata* Herb.

Bomarea denticulata Herb. Amaryll. (1837) 118; Kunth, Syn. V, 808; Roemer. Amaryll. 273. — *Alstroemeria denticulata*, Ruiz et Pav. Flora Peruv. et Chil. III (1802) 62 t. 293 fig. 6; Schult, Syst. VII, 747. — Radix fibris apice in tuberia incrassatis, hyalinis composita. Caulis volubilis, alte scandens, satis tenuis, glaber, distanter foliatus, internodiis 6 ad 8 cm. longis. Folia petiolata, petiolis interdum sesquialteris, margine saepius inflexo repando-denticulatis, subtus villosis, 2 cm. longis; lamina late ovata, subcordata, acuta, margine excepta tertia parte anteriore denticulato, subtus dense griseo-pilosa, supra opaca, glabra, 8 ad 15 cm. longa, 4,5 ad 7,5 cm. lata; folia suprema vix minora. Umbella (in specimine 1 mihi viso) radiis 10 composita, bracteae parvae, lanceolatae?, contortae, reflexae, ad 2 cm. longae, radii umbellae v. pedunculi tenues, sparse pilosi, ad 18 cm. longi, bracteolis paucis apicem versus obsiti, triflori, bracteolae minutae, quam pedicelli tenues multo breviores, pedicelli sparsissime pilosi, circ. 2 cm. longi; ovaria brevi-villosa, oblonga, obtusa, 1,5 cm. longa. Petala aequilonga v. paullulum longiora, e basi lineari sensim dilatata, antice rotundato-retusa, in ipsa basi tantum pilosa, supra 3 mm. lata. Stamina perigonium paulum superantia, cum antheris magnis fere 2 cm. longa, basi sparsissime setosa, ceterum nuda. „Perigonium rubro-lutescens“ (ex Roemer). Stylus brevissimus, stigmata 3, plus minus divergentia. — Fl. Februario. Peru. „In montibus altissimis frigidis Andium ad Patasaria“ (Ruiz et Pavon). — Колумбія. „Встрѣчается въ сырыхъ лѣсныхъ областяхъ между Rio Coquigo и Rio Chinas, Tierra a Dentro“, на высотѣ 2300 м. надъ уровнемъ моря (F. K. Lehmann № 2664! и 6037! безъ точнаго указанія мѣста).

Это крайне интересное растение по непонятной для меня причинѣ было опредѣлено Baker'омъ обработавшимъ эту часть сборовъ Lehmann'a, какъ *B. edulis* Herb. Но съ этимъ видомъ нашъ видъ не имѣетъ ничего общаго, какъ бы ни были широко

приняты, его границы. Кажется Baker считалъ, какъ передъ нимъ и Herbert и Kunth¹⁾, таблицу въ Ruiz и Pavon неправильно нарисованной; но это еще не давало ему право просто пропустить этотъ видъ, который, къ сожалѣнію, не попалъ даже между синонимами. Однако, рисункъ въ Ruiz и Pavon во всѣхъ отношеніяхъ вполне тождественъ съ лежащимъ предо мною экземпляромъ и я ничуть не сомнѣваюсь, что имѣю дѣло со тѣмъ же растеніемъ. О случайной уродливости не можетъ быть и рѣчи потому, что между сотнями экземпляровъ Bomarea, которые прошли черезъ мои руки, наши экземпляры были единственные съ такого рода зазубренными краями листьевъ; всѣ остальные имѣли, какъ и значительное большинство однодольныхъ — цѣльнокрайные листья.

Herbert пытается отнести этотъ видъ къ *B. tomentosa* Herb.: сравненіе удачное только по отношенію къ росту и листьямъ, но неправильное по отношенію къ цвѣторасположенію и цвѣтамъ. Последніе напоминаютъ формы, которыя Baker соединилъ въ слишкомъ широко понимаемомъ имъ видѣ *B. edulis* Herb. Здѣсь невозможно указать особо, какіе именно и сколько изъ 20 видовъ, соединенныхъ Baker'омъ въ *B. edulis* Herb., принадлежатъ въ дѣйствительности къ этому сборному виду и какіе лучше оставить самостоятельными видами. Какъ о ближайшей по родству хотѣлъ бы я здѣсь только упомянуть о *B. latifolia* Herb., рядомъ съ которой можно лучше всего помѣстить и *B. denticulata* Ruiz et Pavon. Однако и этотъ видъ Herbert'a отнесенъ Baker'омъ къ *B. edulis*.

Fr. Kränzlin.

Kritische Bemerkungen über *Bomarea denticulata* Herb.

Résumé.

Diese Pflanze ist seiner Zeit von Baker als *B. edulis* Herb. bestimmt worden. Die nächstverwandte Art ist *B. latifolia* Herb.

1) Kunth. Enum. Plant. V, 808. Folia... repando denticulata (errore pictoris?). — Herbert говоритъ (loco supra cit.): „The figure in the Flora Peruv. gives the margin of the leaves denticulate, is probably an error.“

Б. А. Федченко.

„*Onobrychis supina*“ въ Бессарабіи.

Однимъ изъ первыхъ по времени литературныхъ источниковъ по флорѣ Бессарабіи является книжка Tardent'a¹⁾ заключающая въ себѣ перечисленіе 503 видовъ бессарабской флоры. Многія изъ этихъ указаній не подтвердились дальнѣйшими изслѣдователями флоры Бессарабіи и оставались сомнительными, а нѣкоторыя (напр. *Centaurea budziackea*) являлись совершенно непонятными.

Къ числу такихъ сомнительныхъ указаній относится и *Onobrychis supina*, видъ, извѣстный до сего времени лишь въ Западной части средиземноморской области — въ южной Франціи, въ Испаніи, въ западной Италіи. Показаніе Tardent'a было повторено (безъ указанія источника) И. Шмальгаузенomъ²⁾, а также вошло и въ нашу совместную съ А. Ф. Флеровымъ „Флору Европейской Россіи“³⁾.

Разбираясь въ различныхъ гербарныхъ матеріалахъ по роду *Onobrychis*, мнѣ удалось, между прочимъ, въ Общемъ Гербаріи Императорскаго Ботаническаго Сада Петра Великаго найти растеніе Tardent'a съ опредѣленіемъ, какъ „*Onobrychis supina* DC.“. Изслѣдованіе этого экземпляра показало мнѣ, что на самомъ дѣлѣ растеніе это не имѣетъ ничего общаго съ западноевропейской *Op. supina* DC., а есть не что иное, какъ *Onobrychis gracilis* Bess., широко распространенный въ южной Россіи и встрѣчающійся также въ Румыніи, Болгаріи, Турціи и быть можетъ Греціи. Такимъ образомъ, *Onobrychis supina* DC. подлежитъ исключенію изъ русской флоры.

— — —

1) C. Tardent. Essai sur l'histoire naturelle de la Bessarabie. Lausanne 1841.

2) И. Шмальгаузенъ. Флора Средней и Южной Россіи, Крыма и Сѣв. Кавказа, т. I. 1897.

3) Б. А. Федченко и А. Ф. Флеровъ. Флора Европейской Россіи 1908—1910.

B. A. Fedtschenko.

„*Onobrychis supina*“ in Bessarabien.

Résumé.

Verfasser untersuchte das Exemplar eines *Onobrychis*, welches von Tardent i. J. 1841 für Bessarabien als *Onobrychis supina* DC. angegeben war. Es erwies sich, dass es sich nur um die weit verbreitete südrussische Art *Onobrychis gracilis* Bess. handelt und deshalb *Onobrychis supina* DC. infolgedessen aus der russischen Flora auszuschliessen ist.

И. Л. Бедельянъ.

Исслѣдованія надъ испареніемъ кактусовъ.

(Предварительное сообщеніе.)

Занимаясь изученіемъ анатомическаго строенія кактусовъ и видя ихъ приспособленную для защиты отъ сильнаго испаренія структуру, я поставилъ себѣ цѣлью выяснитъ, насколько, дѣйствительно, мало испареніе у кактусовъ, въ сравненіи съ обыкновенными мезофитами, а также въ сравненіи съ тѣми растеніями, у которыхъ есть извѣстныя приспособленія противъ сильнаго испаренія, какъ волосистой покровъ, восковой налетъ и т. п. Мнѣ пришлось поставить цѣлый рядъ опытовъ въ теченіе лѣтнаго семестра, въ прошломъ, 1912 году, въ Берлинскомъ Университетѣ, въ лабораторіи профессора *Г. Габерландта* и далѣе, въ теченіе августа и части сентября, въ Копенгагенскомъ Университетѣ, тоже въ ботанической лабораторіи.

Здѣсь я пока вамъренъ изложитъ одинъ изъ рядовъ такихъ опытовъ.

Чтобы опредѣлитъ величину испаренія у кактусовъ въ сравненіи съ испареніемъ у обыкновенныхъ растеній, я выбралъ *Opuntia*, такъ какъ этотъ кактусъ обладаетъ гладкой поверхностью и величину поверхности можно, слѣдовательно, вѣрно вычислитъ. Для сравненія съ опунціей я взялъ слѣдующія растенія: *Hedera Helix*, *Ginkgo biloba*, *Nerium Oleander*, *Tropaeolum majus*, *Polygonum sacchalinense*, *Helianthus annuus*.

Отъ этихъ растеній были взяты для опыта листья, по возможности одинаковаго возраста, не очень молодые и не очень старые; всѣ взятые листья были здоровы и безъ какого-либо поврежденія на нихъ. До опыта всѣ эти растенія находились въ одинаковыхъ условіяхъ; они росли въ университетскомъ ботаническомъ саду. Листовыя пластинки были срѣзаны вмѣстѣ съ

черешками и плоскости срѣза были очень тщательно покрыты смѣсью воска и масла какао, взятыхъ въ равныхъ по вѣсу частяхъ; это сдѣлано было конечно, для того, чтобъ изъ срѣзаннаго мѣста вода не могла испаряться.

Отъ *Opuntia tomentosa* я срѣзалъ двѣ верхнихъ вѣтви. Двѣ вѣтви я взялъ для того, чтобы всегда имѣть одинъ контрольный экземпляръ.

Всѣ объекты были положены въ чашки Петри и оставлены въ лабораторіи въ закрытомъ большомъ помѣщеніи, въ тѣни. Количество испаряемой воды я опредѣлялъ три раза. Объекты взвѣшивались на одной и той же чашкѣ Петри, вѣсъ коей равнялся 34,3 gr. Листъ подеолнечника, будучи очень великъ, долженъ былъ быть взвѣшиваемъ въ стаканѣ, а испарять его я оставлялъ на тарелкѣ.

Во время взвѣшиванія $t^0 = 20^0$ до 21^0 C., влажность отъ 81% до 83%. Черезъ сутки послѣ третьяго взвѣшиванія нѣкоторые изъ листьевъ, а именно: *Tropaeolum majus*, *Polygonum sachalinense* и *Helianthus annuus*, т. е. болѣе нѣжные листья, стали увядать, поэтому опытъ пришлось на этомъ закончить. Но это обстоятельство значенія не имѣетъ, т. к. полученныхъ чиселъ достаточно для того, чтобы опредѣлить величину испаренія *Opuntia* въ сравненіи съ другими листьями. Для опредѣленія величины испаренія надо вычислить продолжительность времени испаренія и величину поверхности листьевъ какъ упомянутыхъ растений, такъ и вѣтви *Opuntia*; кромѣ того интересно было также выяснитъ, одинакова-ли величина испаренія листа во время всего опыта.

Количество испаренной воды и продолжительность опыта показаны въ таблицѣ (№ 1).

Таблица № 1.

	Промежутокъ между первымъ и послѣднимъ взвѣшиваніемъ	Количество испаренной воды
<i>Hedera Helix</i>	23 ч. 12 м.	0,019 gr.
<i>Ginkgo biloba</i>	22 ч. 59 м.	0,276 „
<i>Nerium Oleander</i>	22 ч. 54 м.	0,131 „
<i>Tropaeolum majus</i>	22 ч. 45 м.	0,15 „
<i>Polygonum sachalinense</i>	22 ч. 35 м.	0,737 „
<i>Helianthus annuus</i>	22 ч. 26 м.	2,575 „
<i>Opuntia tomentosa</i> , № 1.	22 ч. 6 м.	0,099 „
<i>Opuntia tomentosa</i> , № 2.	22 ч. 5 м.	0,141 „

Эти данныя дадутъ намъ возможность опредѣлить, сколько воды испарилъ каждый изъ листьевъ въ теченіе одного часа; когда это опредѣлено, приходится еще перевести величину испаренія каждаго листа на единицу поверхности.

Вѣсъ воды, испаренной каждымъ изъ объектовъ въ теченіе часа, показанъ на слѣдующей таблицѣ (№ 2).

Таблица № 2.

<i>Hedera Helix</i>	0,00818 gr.
<i>Ginkgo biloba</i>	0,012 „
<i>Nerium Oleander</i>	0,00571 „
<i>Tropaeolum majus</i>	0,00659 „
<i>Polygonum sachal.</i>	0,0329 „
<i>Helianthus annuus</i>	0,10588 „
<i>Opuntia tomentosa</i> , № 1 . . .	0,00448 „
<i>Opuntia tomentosa</i> , № 2 . . .	0,00636 „

Эти цифры показываютъ только, сколько воды эти листья испарили въ теченіе одного часа; но мы должны опредѣлить, какъ велика сила испаренія у каждаго изъ этихъ растений, слѣд., мы должны опредѣлить испареніе на единицу поверхности. Я полагаю, что если отнесу вѣсъ количества испаренной воды на поверхность въ 10 см², то это будетъ удобно. Поверхность листьевъ, а у *Opuntia* вѣтокъ я опредѣлилъ путемъ взвѣшиванія кусочковъ бумаги, точно и тщательно вырѣзанныхъ такой же величины, какъ и поверхность объектовъ. Такъ какъ *Opuntia* испаряетъ также своими довольно большими боковыми поверхностями, то я при вырѣзываніи формы кактуса изъ бумаги принялъ во вниманіе и это обстоятельство. Бумагу я бралъ имѣющую вездѣ одинаковую плотность. Вѣсъ этихъ бумажныхъ вырѣзанныхъ фигуръ листьевъ я сравнивалъ съ вѣсомъ 100 см² той же бумаги.

Такимъ путемъ я опредѣлилъ поверхность только одной стороны листьевъ и вѣткѣ у *Opuntia*, что и представилъ въ слѣдующей таблицѣ (№ 3).

Таблица № 3.

<i>Hedera Helix</i>	21,44 см ²
<i>Ginkgo biloba</i>	13,71 „
<i>Nerium Oleander</i>	15,59 „
<i>Tropaeolum majus</i>	32 „
<i>Polygonum sachal.</i>	42,08 „
<i>Helianthus annuus</i>	127,78 „
<i>Opuntia tomentosa</i> , № 1 . . .	24,85 „
<i>Opuntia tomentosa</i> , № 2 . . .	27,31 „

Далѣе, перечисляя на единицу времени (часъ) и единицу поверхности (10 кв. сантим.), я нашелъ, сколько каждый изъ объектовъ испарилъ въ сравненіи съ *Opuntia*. Это показало въ слѣдующей таблицѣ (№ 4).

Таблица № 4.

<i>Hedera Helix</i>	0,00381 gr.
<i>Ginkgo biloba</i>	0,00875 „
<i>Nerium Oleander</i>	0,00366 „
<i>Tropaneolum majus</i>	0,00206 „
<i>Polygonum sach.</i>	0,00776 „
<i>Helianthus annuus</i>	0,01205 „
<i>Opuntia tomentosa</i> , № 1	0,00180 „
<i>Opuntia tomentosa</i> , № 2	0,00232 „

Если для двухъ послѣднихъ опунцій возьмемъ среднее, то получимъ 0,002061 гр.

Въ этой таблицѣ слѣдуетъ обратить вниманіе на весьма незначительное испареніе у *Tropaneolum majus*; оно совпадаетъ со средней величиной испаренія у двухъ опунцій. Этого совершенно нельзя было ожидать. Но на эту величину испаренной *Tropaneolum* воды я не обращаю вниманія потому, что листъ *Tropaneolum*, будучи щитовиднымъ, гладкимъ, ложится плотно на дно чашки Петри и прилипаетъ и поэтому у него испареніе шло ненормально. Анатомически листъ *Tropaneolum* приспособленъ для защиты отъ сильнаго испаренія; на немъ, между прочимъ, сплошной восковой налетъ. Поэтому опытъ испаренія листа *Tropaneolum* для сравненія съ испареніемъ кактусовъ слѣдуетъ повторить.

Для болѣе яснаго представленія соотношенія между количествами испаренной каждымъ изъ объектовъ воды, примемъ количество воды, испаренное опунціей въ единицу времени и на единицу поверхности, за 100, тогда количество воды испаренной листьями представится въ слѣдующемъ видѣ (въ восходящемъ порядкѣ).

Таблица № 5.

	Абсолютн.	Отно- сительн.
<i>Opuntia tomentosa</i>	206	100
<i>Nerium Oleander</i>	366	175
<i>Hedera Helix</i>	381	185
<i>Polygonum sachal.</i>	776	375
<i>Ginkgo biloba</i>	875	424
<i>Helianthus annuus</i>	1200	585

Для большей наглядности составимъ кривую.



Извѣстно, что *Hedera Helix* и *Nerium Oleander* имѣютъ кожистые, мало испаряющіе листья, но мы видимъ, что *Opuntia* испаряетъ гораздо менѣе этихъ листьевъ, а именно, почти вдвое меньше. Интересно также посмотрѣть, какъ шло испареніе втеченіе всего опыта, который длился около сутокъ. Поэтому я опредѣлилъ, сколько воды испарилъ каждый листъ втеченіе часа въ промежутки между двумя взвѣшиваніями.

Вотъ эти данныя. Въ три промежутка, втеченіе часа, испарили:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. <i>Hedera Helix</i> : | 4. <i>Tropeolum majus</i> : |
| 1) 0,000905 гр. | 1) 0,00755 гр. |
| 2) 0,000647 „ | 2) 0,00531 „ |
| 3) 0,000845 „ | 3) 0,00511 „ |
| 2. <i>Ginkgo biloba</i> : | 5. <i>Polygonum sachal</i> : |
| 1) 0,0114 гр. | 1) 0,0438 гр. |
| 2) 0,0127 „ | 2) 0,0212 „ |
| 3) 0,0127 „ | 3) 0,0113 „ |
| 3. <i>Nerium Oleander</i> : | 6. <i>Helianthus annuus</i> : |
| 1) 0,00596 гр. | 1) 0,136 гр. |
| 2) 0,00567 „ | 2) 0,0866 „ |
| 3) 0,00507 „ | 3) 0,0815 „ |

7. *Opuntia tomentosa*, № 1.

1) 0,00438 гр.

2) 0,00452 „

3) 0,00469 „

8. *Opuntia tomentosa*, № 2.

1) 0,00632 гр.

2) 0,00643 „

3) 0,00662 „

Такимъ образомъ, у большинства взятыхъ растеній испареніе съ теченіемъ времени уменьшается, а у кактусовъ (опунцій) увеличивается. Но не надо забывать, что эти опыты были поставлены безъ воды. Какъ идетъ испареніе, когда изслѣдуемый листъ поставленъ черешкомъ въ воду, это было подвергнуто мною изслѣдованію въ рядѣ другихъ опытовъ, о которыхъ сообщу позднѣе.

Чтобы понять, отчего происходитъ различіе въ интенсивности испаренія данныхъ растеній, надо сопоставить эти данныя съ внѣшними условіями¹ (t^0 , влажность воздуха); возможно конечно, что это зависитъ и отъ индивидуальныхъ качествъ растеній.

С.-Петербургъ. Сентябрь 1913 г.

J. L. Bedelian.

Untersuchungen über die Transpiration der Kakteen.

(Vorläufige Mitteilung.)

Résumé.

Um die Transpirationsgrösse einer Kaktée im Vergleich mit den Blättern anderer Pflanzen zu bestimmen, habe ich *Opuntia tomentosa* genommen, weil die Oberfläche dieser Kaktée flach ist und man sie deshalb leicht bestimmen kann. Zum Vergleich wurden Blätter folgender Pflanzen gewählt; *Hedera Helix*, *Ginkgo biloba*, *Nerium Oleander*, *Tropaeolum majus*, *Polygonum sachalinense*, *Helianthus annuus*.

Die Objekte wurden auf Petrischalen gestellt und im Laboratorium in den Schatten gebracht. Die Menge des verdunsteten Wassers wurde dreimal bestimmt und ist in der Tabelle № 1 zu sehen, dieselbe pro Stunde — in der Tabelle № 2.

Um das Transpirationsvermögen dieser Pflanzen zu bestimmen, ist es notwendig die Menge des verdunsteten Wassers auf eine Einheit der Oberfläche der Pflanze zu bringen; ich glaubte es wäre

besser dieselbe für 10 cm² zu bestimmen. Die Oberfläche der Blätter und des Sprosses der Kaktée habe ich durch das Wiegen der Papierstücke, welche genau so gross abgeschnitten waren, wie die Oberfläche der Pflanzen, bestimmt, und da *Opuntia* auch durch die ziemlich breiten Kanten verdunstet, so habe ich auch diesen Umstand in Betracht gezogen. Das Gewicht jedes Papierstückes habe ich mit dem eines Papierstückes von 100 cm² verglichen. Die Oberflächen der Blätter und der *Opuntia*-Sprosse sind in der Tabelle № 3 zu sehen.

Die Menge des Wassers, welche die Oberfläche von 10 cm² der betreffenden Blätter und des Sprosses von *Opuntia* durchschnittlich in einer Stunde verdunstet hat, ist in der Tabelle № 4 sichtbar. Weiter habe ich die Menge des Wassers, die durch einen *Opuntia*-Spross verdunstet ist, für 100, zum Vergleich mit dem Transpirationsvermögen anderer Pflanzen genommen; diese relative Menge des Wassers, welche die anderen Pflanzen verdunstet haben, ist in der Tabelle № 5 zu sehen. Dasselbe ist auch an der Kurve gezeigt.

Г. А. Надсонъ

О сѣрныхъ микроорганизмахъ Гансальскаго залива.

(Предварительное сообщеніе).

Минувшимъ лѣтомъ (1913 г.), при изученіи низшихъ организмовъ Гансальскаго залива, мною было удѣлено особое вниманіе на поиски и изслѣдованіе одноклѣтныхъ микробовъ, заслужившихъ названіе гигантскихъ бактерій, изъ родовъ *Achromatium* (incl. *Hillhousia*) и *Thiorhysa*. Первый родъ микробовъ былъ извѣстенъ до сихъ поръ только изъ прѣсныхъ водъ, второй лишь изъ Неаполитанскаго залива. По теоретическимъ соображеніямъ и, вообще, зная условія жизни микроорганизмовъ (біономію) въ Гансальскомъ заливѣ, я предполагалъ, что они и тамъ могутъ встрѣтиться, хотя вода у Гансаля едва солоноватая и содержитъ всего около $\frac{1}{2}\%$ соли. Такъ на самомъ дѣлѣ и оказалось: эти микробы тамъ имѣются. Уже самый фактъ нахожденія ихъ въ заливѣ рядомъ, въ слабо-соленой морской водѣ, очень интересенъ, указывая на ихъ большую приспособляемость и гораздо болѣе широкое распространеніе въ природѣ, чѣмъ полагали раньше, но, кромѣ того, мнѣ удалось добыть еще нѣкоторыя новыя данныя по ихъ морфологій и біологій.

Изслѣдуя, вмѣстѣ съ С. М. Виселоухомъ, прѣсноводныя формы *Achromatium* въ одномъ изъ небольшихъ прудовъ въ С.-Петербургѣ, мы нашли тамъ два вида: *Achr. oxaliferum*, который былъ впервые описанъ В. Т. Шевяковымъ въ 1893 г.¹⁾ изъ старицы Рейна, близъ Мангейма, и другой новый видъ: размѣрами поменьше и отличающійся еще нѣкоторыми особенностями при дѣленіи клѣтки; мы назвали его *Achr. minus*. Существуетъ еще третій видъ, очень большихъ размѣровъ (20—33×41—86 μ), найденный Уэстомъ и Гриффисомъ въ мел-

1) Schewiakoff, W. Ueber einen neuen bakterienähnlichen Organismus des Süßwassers. Habilitationsschrift. Heidelberg. 1893.

нихъ водоемахъ Великобританіи, — это *Achr. Hillhousii* Nads. & Wisl. (= *Hillhousia mirabilis* West & Griffiths¹⁾).

Одноклѣтныя бактеріи изъ рода *Achromatium* бываютъ круглой формы, но чаще и обыкновенно — эллипсоидальной или цилиндрической съ закругленными концами. Онѣ способны двигаться; движеніе медленное, но характерное — порывистыми толчками; особыхъ органовъ движенія не обнаружено.

Какъ было найдено С. М. Вислоухомъ и мною и сообщено нами въ засѣданіи С.-Петербургскаго Микробиологическаго Общества 16-го ноября 1912 г., по своей организаци и жизни эти микроорганизмы представляютъ рядъ интересныхъ особенностей.

Клѣтки имѣютъ хорошо замѣтную и довольно толстую оболочку, которая часто покрыта сверху слоемъ слизи. Протопластъ ясно ячеистаго строенія съ двумя сортами включеній: болѣе мелкія, характерныя по виду и реакціямъ, капельки сѣры, и болѣе крупныя тѣльца, заполняющія полости ячеекъ протопласта: эти послѣднія были открыты и подробно изучены микрохимически еще Шевяковымъ; они легко растворимы въ водѣ и особо характеризуются тѣмъ, что содержатъ или даютъ при распадѣ щавелевую кислоту; при ихъ разрушеніи образуются кристаллы щавелевокислой извести; мы предложили поэтому для нихъ названіе — оксалиты²⁾.

Какъ показали наблюденія въ природѣ и спеціальныя опыты въ лабораторіи, судьба этихъ включеній такова. Въ обычной обстановкѣ жизни микроба — а онъ живетъ на днѣ, на незначительной глубинѣ, въ поверхностномъ слоеѣ ила среди разлагающихся растительныхъ веществъ — въ клѣткахъ его содержатся тѣ и другія включенія, при чемъ количественно значительно преобладаютъ оксалиты. При большемъ притока воздуха (аэраціи субстрата) сѣра совсѣмъ исчезаетъ изъ клѣтокъ и остаются одни лишь оксалиты. Въ такомъ видѣ микробъ можетъ, повидимому, неопредѣленно долго жить. Наоборотъ, при уменьшеніи количества воздушнаго кислорода въ окружающей средѣ и наличности сѣроводорода, оксалиты совершенно исчезаютъ изъ клѣтокъ и послѣднія заполняются многочисленными и болѣе крупными, чѣмъ раньше, каплями сѣры, — микробъ становится настоящей сѣрной бакте-

1) West, G. S. and B. M. Griffiths. *Hillhousia mirabilis*, a Giant Sulphur Bacterium (Proc. Roy. Soc. London. B-T. 81. 1909). — West, G. S. and B. M. Griffiths. The Lime-Sulphur Bacteria of the Genus *Hillhousia* (Annals of Botany. Vol. 27. 1913).

2) Рисунки и подробности касательно строенія клѣтки у *Achromatium* и *Thiophysa* будутъ въ скоромъ времени опубликованы.

ріей. Такимъ образомъ, въ зависѣмости исключительно отъ аэраціи среды (количества въ ней свободного кислорода), мѣняется характеръ обмѣна веществъ, главнѣйше — типъ дыханія у микроба, а вмѣстѣ съ тѣмъ и характеръ отлагаемыхъ въ клѣткѣ веществъ: при обильномъ доступѣ воздуха мы имѣемъ „оксалитовую“ форму *Achromatium*, при маломъ — „сѣрную“; одна форма легко и сравнительно быстро можетъ переходить въ другую, что можно прослѣдить даже на одной и той же клѣткѣ.

Вполнѣ свободный притокъ воздуха дѣйствуетъ уже губительно на микроба. Для своего нормальнаго развитія онъ нуждается въ очень небольшомъ количествѣ свободного кислорода: онъ микроаэрофилъ, подобно, напр. сѣрно-пурпурнымъ бактеріямъ или *Beggiatoa*.

Въ Гансальскомъ заливѣ *Achromatium* мною найденъ также на незначительной глубинѣ (около 1 метра и меньше), на песчаномъ днѣ, въ верхнемъ слое ила среди живыхъ и мертвыхъ, разлагающихся мелкихъ водорослей. Притомъ, я нашелъ тамъ не только всѣ три, упомянутые выше, вида, изъ нихъ всего чаще встрѣчалась маленькая форма — *Achr. minus*, рѣже — *Achr. oxaliferum* и очень рѣдко — *Achr. Hillhousii*, но, кромѣ того, еще и новый видъ, отличающийся сильно вытянутой формой клѣтки. При незначительной, сравнительно, ширинѣ (16—18 μ), длина этого микроба достигаетъ 60—70 μ ; встрѣчались даже особи огромной длины — въ 102 μ ; такія крупныя формы можно уже видѣть не только въ лупу, но, при навыкѣ, и простымъ глазомъ. Это первый примѣръ одноклѣтной бактеріи, которую можно видѣть невооруженнымъ глазомъ, — поистинѣ онѣ заслуживаютъ названія гигантскихъ. Я предлагаю для этой формы названіе — *Achr. gigas*.

Еще болѣе интересной находкой была другая бактерія огромныхъ размѣровъ и тоже одноклѣтная — *Thiophysa*. До сихъ поръ былъ извѣстенъ единственный видъ изъ Неаполитанскаго залива, открытый и описанный Гинце въ 1903 г. подъ именемъ *Thiophysa volutans*¹⁾. Это сѣрная бактерія съ совершенно круглыми клѣтками, размѣромъ 7—18 μ . Въ клѣткѣ большая центральная вакуоля, а въ протоплазмѣ залегаютъ капельки сѣры. Микробъ подвиженъ: медленно катится (рѣсницъ, какъ и у *Achromatium*, не удается обнаружить); размножается простымъ дѣленіемъ. Кромѣ Неаполя, да и вообще послѣ Гинце, этотъ микроорганизмъ нигдѣ и никѣмъ не былъ най-

1) Hinze, G. *Thiophysa volutans*, ein neues Schwefelbakterium (Berichte der deutsch. botan. Gesell. Bd. XXI. p. 309, 1903).

день. Въ Гапсалѣ онъ живетъ въ тѣхъ же мѣстахъ, что и *Achromatium*. Кромѣ того, тамъ же мною былъ найденъ еще новый видъ этого рода, съ такимъ же строеніемъ, развитіемъ и образомъ жизни, но значительно болѣе большихъ размѣровъ, именно 21—40 μ . въ діаметрѣ; я предлагаю назвать его *Thiophysa macrophysa*. Но, самымъ интереснымъ и существеннымъ является то, что и *Thiophysa* (оба вида), кромѣ капелекъ сѣры, содержитъ также оксалиты, что совершенно ускользнуло отъ вниманія Гинце и осталось незамѣченнымъ. Только у *Thiophysa* оксалиты находятся въ большой центральной вакуолѣ и обыкновенно въ энергичномъ броуновскомъ движеніи. Какъ размѣромъ, такъ и внѣшнимъ видомъ, эти оксалиты очень похожи на капельки сѣры, находящіяся въ протоплазмѣ, и настолько, что ихъ можно даже спутать (что и случилось, быть можетъ, съ Гинце); однако, болѣе внимательное изслѣдованіе обнаруживаетъ, что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ такими же оксалитами, какъ и у *Achromatium*. И у *Thiophysa* количество сѣры и оксалитовъ въ клѣткѣ зависитъ отъ количества кислорода въ окружающей средѣ. При недостаткѣ кислорода и при наличности сѣроводорода *Thiophysa* является типичной сѣрной бактеріей: оксалитовъ у нея нѣтъ или очень мало. При болѣемъ доступѣ воздуха количество сѣры сильно уменьшается, а оксалитовъ возрастаетъ („оксалитовая“ форма). Такимъ образомъ, мы имѣемъ теперь полное основаніе соединить *Achromatium* и *Thiophysa* въ одно семейство оксалитосѣрныхъ микробовъ — *Achromatiaceae*.

Вмѣстѣ съ *Achromatium* и *Thiophysa* на днѣ Гапсальскаго залива живетъ еще одинъ любопытный сѣрный микробъ, ранѣе неизвѣстный въ наукѣ. Онъ отличается меньшей величиной, а главное своей организаціей. Клѣтки его круглыя (4,8—5,5 μ . въ діаметрѣ), но чаще онѣ нѣсколько удлиненыя, именно — эллипсоидальныя (4,8×6 μ). Оболочка клѣтки сравнительно толста, плотна и сильно преломляетъ свѣтъ: поверхность ея иногда наблюдается выдѣленіе слизи. Протоплазма не безцвѣтна, а имѣетъ сѣроватый (стальной) оттѣнокъ, въ другихъ случаяхъ, совершенно ясно замѣтный зеленовато-сѣрый цвѣтъ, нѣсколько напоминающій окраску зеленѣющихъ хроматіевъ или офидомонадъ (*Chromatium*, *Ophidomonas*), изъ группы сѣрно-пурпурныхъ бактерій. Въ плазмѣ находятся капельки сѣры. Съ возрастаніемъ количества сѣроводорода въ водѣ число и величина ихъ увеличиваются; плазма при этомъ часто становится совершенно безцвѣтной и прозрачной. Кромѣ того, клѣтки этой бактеріи (очень интересная особенность!) содержатъ крахмало-

подобное вещество, дающее съ іодомъ фіолетовую или чисто синюю густую окраску. При увеличеніи количества сѣры въ клѣткѣ (т. е. при большемъ содержаніи сѣроводорода въ окружающей средѣ), количество этого вещества уменьшается. Клѣтки медленно подвижны; въ характерѣ движенія есть сходство съ движеніемъ у *Thiophysa* и *Achromatium*. Размноженіе простымъ дѣленіемъ пополамъ. Предлагаю эту бактерію назвать *Thiosphaerella amyliifera*.

Гансальскій заливъ, вообще, богатъ сѣрными микроорганизмами. Кромѣ вышеупомянутыхъ, я встрѣтилъ здѣсь не менѣе 4 видовъ *Beggiatoa*, именно: *B. arachnoidea* Rab., *B. alba* Trev., *B. media* Winogr. и *B. minima* Winogr. Однако, самого крупнаго вида — *B. mirabilis* Cohn, который такъ обыкновененъ въ западной части Балтійскаго моря (въ Кильскомъ заливѣ, у береговъ Дании), мнѣ пока не пришлось встрѣтить ни разу.

Есть также представители рода *Thiothrix* и въ огромномъ количествѣ и большомъ разнообразіи встрѣчаются здѣсь сѣрно-пурпурныя бактеріи изъ родовъ: *Chromatium*, *Thiocystis*, *Thioroedia* и др. Особенно красивы и интересны крупные (до 4 μ . въ діаметрѣ) сѣрно-пурпурныя спиралли — *Thiospirillum* (*Ophidomonas*) *sanguineum* Winogr. Между прочимъ, мнѣ приходилось наблюдать въ культурахъ, въ лабораторіи, въ стеклянныхъ цилиндрахъ, ихъ зеленѣющія и даже совершенно сѣровато-зеленыя формы, у которыхъ красный пигментъ (бактеріоэритринъ) на убыли или утраченъ совершенно, а зеленый (бактеріохлоринъ) выступаетъ на первый планъ: попадались и такіе спиралли, у которыхъ одинъ конецъ клѣтки былъ зеленый, а другой розовый: встрѣчались также особи, у которыхъ одинъ конецъ былъ значительно толще, чѣмъ другой. Интересно, что такія формы сохраняли способность къ движенію и размноженію, накапливали и расходовали сѣру; онѣ представляютъ большой интересъ, какъ съ фізіологической, такъ и съ систематической точки зрѣнія ¹⁾.

Для выясненія филогенетическихъ отношеній сѣрныхъ бактерій *Beggiatoa* къ сине-зеленымъ водорослямъ *Oscillaria*, съ которыми у нихъ такъ много общаго въ организаціи (при значительной фізіологической разницѣ), здѣсь также можно собрать интересный матеріалъ. Мнѣ пришлось напр. наблюдать у

1) О пигментахъ сѣрно-пурпурныхъ бактерій и зеленѣющихъ формахъ см. Надсонъ, Г. Микробиологическіе очерки. II. Объ окраскѣ и пигментахъ пурпурныхъ бактерій („Извѣстія И. СПб. Ботанич. Сада“. Т. XII. 1912 г.).

живущихъ въ плѣ осциллярій и другихъ сине-зеленыхъ водорослей всѣ стадіи потери окраски (аноклороза), вплоть до полного ея исчезновенія. Существованіе совершенно безцвѣтныхъ формъ осциллярій, отнюдь не утратившихъ своей жизнеспособности, не подлежитъ сомнѣнію. Нѣкоторыя изъ нихъ являются, повидному, новыми, еще не описанными формами. Съ другой стороны, наблюдалось у нѣкоторыхъ сине-зеленыхъ осциллярій, живущихъ вмѣстѣ съ *Beggiatoa*, отложеніе въ ихъ клѣткахъ капелекъ сѣры, за счетъ окисленія сѣроводорода, и, такимъ образомъ, прибавились новые случаи къ ранѣе извѣстнымъ, но еще мало изученнымъ.

1913. X. 23.

(Изъ Императорскаго Ботанич. Сада

Петра Великаго

и изъ Ботанич. Лабораторіи Спб. Ж. Медц. Института; № XXXI).

G. A. Nadson.

Ueber Schwefelmikroorganismen des Hapsaler Meerbusens.

(Vorläufige Mitteilung.)

(Résumé.)

Verfasser fand im brackigen Wasser des Hapsaler Meerbusens (Estland) Vertreter der riesigen einzelligen Bakterien aus den Gattungen *Achromatium* (incl. *Hillhousia*) und *Thiophysa*, deren Zellen ausser Schwefel noch besondere Inhaltskörper besitzen, die nach ihrem Zerfall Oxalsäure liefern, sogenannte Oxalite. Bei Verminderung des Sauerstoffquantums in der Umgebung (die Mikroben sind Bewohner der oberflächlichen Schlammsschichten) häufen sie in den Zellen mehr Schwefel an und gleichzeitig vermindert sich die Anzahl und die Dimension der Oxalite. Bei Vergrösserung der Aëration des Wassers und des Schlammes geschieht das umgekehrte. Verf. beschreibt auch neue Arten: *Thiophysa macrophysa* (Durchmesser bis 40μ .) und *Achromatium gigas* (die Länge bis 102μ .).

Ausserdem fand Verfasser dort noch eine neue Gattung Schwefelbakterien — *Thiosphaerella amyliifera*, die in ihren Zellen grosse Mengen einer stärkeähnlichen Substanz enthält.

Eine ausführlichere Beschreibung mit betreff. Abbildungen aller dieser interessanten Mikroorganismen erscheint in der nächsten Zeit.

1913. X/23.

Aus dem Kaiserlich. Botan. Garten Peter des Grossen
und dem Botan. Laborat. der mediz. Hochschule für Frauen
zu St. Petersburg; № XXXI.)

Сообщенія изъ Императорскаго Ботаническаго Сада.

Печатаются Садомъ: 1) окончаніе 3-й (и послѣдней) части главнаго юбилейнаго изданія „Императорскій Ст.-Петербургскій Ботаническій Садъ за 200 лѣтъ его существованія“; 2) описаніе самого юбилея, подъ заглавіемъ „200-лѣтній Юбилей Императорскаго Ботаническаго Сада Петра Великаго“; 3) списокъ съ-мѣшъ, собранныхъ въ 1913 г. и предлагаемыхъ Садомъ въ обмѣнъ („*Delectus seminum*“).

Изъ командированныхъ Садомъ въ 1913 году лицъ:

В. И. Линскій былъ лѣтомъ въ Японіи для ознакомленія съ ея ботаническими садами и для общаго знакомства съ ея растительностью. Проѣздъ туда и обратно былъ совершенъ по великому сибирскому желѣзно-дорожному пути, а переѣздъ по морю туда совершенъ на русскомъ пароходѣ Добровольнаго Флота (Владивостокъ—Цуруга), обратно на японскомъ пароходѣ въ Фу-санъ (Корея). — Изъ Цуруги В. И. Линскій проѣхалъ въ Токію, гдѣ прожилъ болѣе недѣли, посѣщая Ботаническій Садъ Токійскаго Университета, Здѣсь онъ ознакомился съ Японскою растительностью по живымъ растеніямъ, провѣрялъ нѣкоторыя растенія по гербарію, ознакомился съ устройствомъ Сада и его частей (паркъ, оранжереи, гербарій, библіотека, лабораторіи). По сообщенію В. И. Линскаго Ботаническій Садъ весьма хорошъ по положенію; въ немъ же находятся аудиторіи и лабораторіи для студентовъ; но въ научномъ отношеніи замѣчается нѣкоторая запущенность, такъ какъ научный персоналъ значительную часть времени посвящаетъ преподавательской дѣятельности. Гербарій не особенно большой, главное вниманіе (какъ и въ саду) обращено на японскую флору. Библіотека довольно большая; болѣшую часть ея занимаетъ литература на европейскихъ языкахъ, особенно на англійскомъ, который не только знакомъ образованному классу, но и вообще проникъ глубоко въ народную массу. Изъ специальныхъ заведеній посѣщенъ былъ „Йокогамскій питомникъ“ (The Yokohama Nursery Company), извѣстное садовое учре-

женіе. Кромѣ того были сдѣланы разныя экскурсіи для знакомства съ флорою. Въ томъ числѣ поѣздки на сѣверъ — въ наиболѣе живописную горную мѣстность Никко, гдѣ находятся знаменитыя своимъ возрастомъ и размѣрами Кринтомерін. Затѣмъ В. П. Линскій проѣхалъ на югъ, — Кіото, Осака, Кобэ. Отсюда изъ Кобэ пароходомъ по внутреннему Японскому морю; черезъ Японскій Гибралтаръ (Моджи — Симоносеки) на островъ Кю-сю, въ Нагасаки. Изъ Нагасаки обратно на сѣверъ въ Симоносеки по желѣзной дорогѣ. Затѣмъ пароходомъ въ Фусанъ и по корейской желѣзной дорогѣ (съ остановкой въ Сеулѣ) и по маньчжурской желѣзной дорогѣ въ Харбинъ.

Б. А. Федченко посѣтилъ по порученію Переселенческаго Управленія Туркестанскій край, гдѣ и производилъ ботаническо-географическія изслѣдованія въ предѣлахъ Самаркандской области, а также въ Бухарскихъ владѣніяхъ (въ бекствахъ Гиссарскомъ, Бальджуанскомъ, Курганъ-Тюбинскомъ, Кабадіанскомъ, Ширабадскомъ, Байсунскомъ, Гузарскомъ, Шаршаузскомъ и Китабскомъ). Результатомъ экспедиціи явилось, помимо обширнаго гербарія, поступившаго въ ИМПЕРАТОРСКІЙ Ботаническій Садъ, установленіе пригодности цѣлага ряда земель для сельскохозяйственныхъ культуръ, въ томъ числѣ для разведенія хлопка. Спутниками Б. А. Федченко были, между прочими, нѣмецкіе ученые J. Bornmüller и G. Kükenthal, собравшіе для Ботаническаго Сада также обширныя коллекціи; а помощникомъ его состоялъ А. П. Михельсонъ, съ февраля до конца іюня занимавшійся сборомъ растений, по указанію Б. А. Федченко для Гербарія Сада. Кромѣ того, Б. А. Федченко изучалъ, по порученію Департамента Земледѣлія, сорную растительность Туркестана, причемъ производство детальныя учетовъ и сбора гербарныхъ образцовъ сорной флоры было поручено его помощнику А. Д. Будогоскому.

В. Л. Комаровъ работалъ въ Южно-Уссурійскомъ краѣ. Онъ началъ свои изслѣдованія съ окрестностей г. Никольска-Уссурійскаго 23-мая, затѣмъ съ 1 по 13 іюня изслѣдовалъ Сунутинское лѣсничество, гдѣ сохранилась еще богатая различными породами лиственныхъ и хвойныхъ деревьевъ типичная уссурійская тайга. Съ Сунутинска онъ перевалилъ на р. Майхе, а съ верховій этой послѣдней въ долину р. Лефу; послѣдняя треть іюня была посвящена изученію долины притока р. Лефу, рѣки Сандугана, гдѣ были обнаружены лѣса изъ *Picea Glehnii* Masters. Въ началѣ іюля была изслѣдована часть р. Даубихе съ лугами и культурной растительностью, затѣмъ лѣсистый хребетъ между этой рѣкой и Ханкайской низменностью, а въ концѣ іюля восточный берегъ

озера Ханка съ его характерной растительностью, (огромныя заросли *Zizania latifolia* и такія растенія, какъ папр. *Monochoria vaginalis* var. *Korsakovi*). Затѣмъ Комаровъ вернулся долиной р. Лефу въ Никольскъ и 8 августа снова выступилъ изъ него въ долину р. Майхе, а оттуда къ берегамъ пролива Стрѣлокъ для изученія флоры морскаго побережья (заливы Востокъ и Америка). Закончилось это путешествіе (1—10 сентября) обзоромъ долины р. Сучана. Кромѣ того въ этой экспедиціи подъ руководствомъ В. Л. Комарова работали: Н. В. Шипчинскій, прошедшій западнѣе отъ береговъ Амурскаго залива (село Або) до сел. Турій Рогъ на озерѣ Ханка, и А. А. Булавкина, собиравшая растенія на островѣ Путятина и въ долинѣ Сучана до самыхъ верховій этой рѣки. Всего поступаетъ въ садъ изъ этой экспедиціи около 1000 видовъ, 3500 номеровъ и до 10,000 экземпляровъ.

А. А. Еленкинъ предпринималъ экскурсіи въ ближайшія окрестности Петербурга, откуда собрано имъ около 200 образцовъ болѣзней растеній для музея и гербарія Фитопатологической Станціи, а также коллекціи по низшимъ споровымъ растеніямъ для спороваго гербарія Сада.

Р. Ю. Рожевицъ собиралъ матеріалы и производилъ наблюденія надъ флорой Кавказа, въ частности надъ злаками. Посѣщены были мѣста прилегающія къ Военно-грузинской дорогѣ и побережью Чернаго моря, въ частности Батумъ, Сухумъ и Новый-Афонъ. Также были посѣщены ботаническіе сады Тифлиса, Батума и Сухума, и чайныя и бамбуковыя плантаціи Чаквы. Особое вниманіе обращалось на бамбуковыя плантаціи, гдѣ производилсь наблюденія надъ біологіей и систематикой этихъ злаковъ.

К. В. Каменскій, во время командировки въ Курляндскую губернію для сбора сѣмянъ и растеній въ цѣляхъ пополненія коллекцій и гербарія Станціи, собралъ свыше 50 различныхъ видовъ сѣмянъ, главнымъ образомъ, изъ числа тѣхъ, опредѣленіе которыхъ представляетъ извѣстныя затрудненія, вслѣдствіе морфологической близости сѣмянъ этихъ видовъ, каковы виды *Vicia*, *Silene*, *Melilotus* и т. п.

Необходимость имѣть коллекцію такого рода вполне достовѣрныхъ сѣмянъ была выяснена практикой Станціи. Въ Митавскомъ уѣздѣ Курляндской губерніи произведено было обследованіе засоренности сорной растительностью посѣвовъ хлѣбныхъ злаковъ (овса, ржи и ячменя), а также собранъ гербарный матеріалъ по сорнымъ растеніямъ посѣвовъ, который въ настоящее время разрабатывается.

С. Ю. Туркевичъ принималъ участіе въ качествѣ ботаника

въ Почвенно-ботанической экспедиціи Переселенческаго Управленія въ Енисейскую губ. Экспедиція обследовала лѣсостепную часть Ачинскаго у. къ югу отъ ж.-д. и предгорья Кузнецкаго Алатау, въ предѣлахъ Ачинскаго и части Минусинскаго уу. Собранныя коллекціи въ количествѣ около 2000 листовъ поступили въ Гербарій Сада.

Н. Н. Тутуринъ былъ командированъ ИМПЕРАТОРСКИМЪ Ботаническимъ Садамъ для сбора растений — въ Туркестанъ и Бухару. Первые полтора мѣсяца (май и половина іюня) Н. Н. Тутуринъ провелъ въ Омскомъ уѣздѣ: сначала на югъ отъ г. Оша вплоть до истоковъ р. Кара-су, послѣ проѣхалъ по р. Ясѣ до перевала Суръ-танъ на р. Кара-кульджу, подъялся по притоку ея — Капка-су; затѣмъ вернулся обратно внизъ по р. Кара-кульджѣ, перевалилъ на р. Таръ, и прошелъ по ней до мѣстечка Ой-талъ на р. Алайку. Оттуда въ г. Ошъ. Дальше въ концѣ іюня ему удалось проѣхать на Памиръ, а оттуда въ Шугнанъ черезъ пер. Кой-тезекъ до поста Хорогъ. Въ Шугнанѣ, Ваханѣ, Горанѣ ему удалось не только собрать ботаническій матеріалъ, но и пройти по совершенно новымъ мѣстамъ и переваламъ, записать много новыхъ ледниковъ, нѣкоторые длиной до 9 верстъ, внести нѣсколько поправокъ въ орографію горныхъ краевъ и нанести на карту одно озеро. Такъ вновь пройденными были пер. Сейдтъ (озеро Сейдтъ), съ р. Веджа на р. Гармъ-гашму, пер. Вахынъ, пройди который удалось установить, что существуетъ перевалъ отъ к. Оторъ на заманчивый Язгулемъ. Собранный Н. Н. Тутуринымъ гербарій поступилъ въ ИМПЕРАТОРСКІЙ Ботаническій Садъ и включаетъ значительное количество растений изъ мѣстностей впервые посѣщенныхъ европейцемъ.

К. К. Косинскій по порученію ИМПЕРАТОРСКАГО Ботаническаго Сада истекшимъ лѣтомъ собиралъ ботаническія коллекціи для Гербарія Сада въ различныхъ мѣстностяхъ Японіи (Фузи-яма, окрестности Кіото, Атами, Нагасаки). Наиболѣе интереснымъ въ ботаническомъ отношеніи и труднымъ по выполненію было восхожденіе на вершину вулкана Фузи-яма (3778 м.).

Въ Гербарій Сада за послѣднее время поступилъ цѣлый рядъ новыхъ коллекцій, изъ которыхъ наиболѣе интересными и цѣнными являются:

- 1) Maire, Растенія Китая (Herbarium proprium) — покункою;
- 2) Handel-Mazetti, Растенія Месопотаміи — въ обмѣнъ на растенія нашего *Delectus secundus*;
- 3) цѣлый рядъ коллекцій отъ экспедицій Переселенческаго Управленія (въ общемъ свыше 50.000 экземпляровъ), причемъ

выдаются по своему интересу и научному достоинству коллекцій В. Л. Комарова (Приморская область), а также О. Э. фонъ-Кноррингъ (Кашгаръ, Памиръ), І. В. Кузнецова (Урянхайскій край), Б. А. Федченко и А. П. Михельсона (Самаркандская область и Бухара) и другія.

А. Фишеръ-фонъ-Вальдгеймъ.

Communications du Jardin Impérial botanique.

Se trouvent sous presse les éditions suivantes du Jardin: 1) La 3-me et dernière partie de l'ouvrage „Le Jardin Impérial botanique de St.-Petersbourg pendant 200 ans de son existence“; 2) „Le Jubilé bicentenaire du Jardin Impérial botanique de Pierre le Grand“; 3) Le Delectus seminum pour l'année 1913.

Des botanistes délégués par le Jardin en 1913:

M. N. H. Lipsky a fait un voyage au Japon où il a visité le Jardin botanique de l'Université à Tokyo, ainsi que le Yokohama Nursery Company. En outre M. Lipsky a fait des excursions botaniques et visité Nikko, Kioto, Osaka et Kobé.

M. B. A. Fedtschenko a fait des investigations botaniques et agronomiques dans la province de Samarkand et dans la Boukharie et remporté de ces régions une collection riche de plantes sèches. Il entreprit ce voyage ensemble avec les savants M. M. I. Bornmüller et G. Kükenthal de l'Allemagne. Comme aide fonctionnait A. I. Mikhelson.

M. L. Komarov a fait des recherches botaniques dans différentes parties du vaste domaine de l'Oussouri du Sud. Entre autre il en l'occasion de voir les grandes forêts du Picea Glehnii Masters dans la vallée du fleuve Sandugana et la végétation caractéristique des bords du lac Khanká (avec le Zizania latifolia en masse, Monochoria vaginalis var. Korsakovi etc.). M. Komarov a remporté pour le Jardin un herbier de 1000 espèces en 10.000 exemplaires.

M. A. A. Elenkin a fait des excursions à différentes reprises aux environs de St.-Petersbourg et fait une récolte de près de 200 échantillons de maladies des plantes et une collections cryptogamiques pour le musée et l'herbier de la Station phytopathologique.

M. R. I. Roshevitz a visité le Caucase, principalement pour étudier les Graminées. Ses excursions ont touché la route militaire Géorgienne et les bords caucasiens de la mer Noire.

M. C. V. Kamiensky a eu une délégation au gouvernement de Courlande pour récolter des semences et des plantes pour la Station d'essai de graines et étudier la propagation des plantes nuisibles aux céréales.

M. S. J. Tourkevitch avait pris part aux expéditions de l'Administration de colonisation dans le gouvernement d'Jenisseisk. Un herbier de 2000 feuilles a été remporté pour le Jardin.

M. N. N. Tontourin a récolté pour le Jardin des plantes du Tourkestan et de la Boukharie. Il a eu la chance de remporter pour le Jardin une grande quantité de plantes des endroits encore inconnus aux européens.

M. C. C. Kcsinsky a remporté pour l'herbier du Jardin des plantes de différentes contrées du Japon.

L'Herbier du Jardin s'est enrichi: 1) d'une collection de près de 50.000 exemplaires provenant des expéditions organisées par l'Administration de colonisation; 2) de l'Herbarium proprium de Maire et 3) de l'herbier de Handel-Mazetti, plantes de Mésopotamie (en échange de notre *Delectus secundus*).

A. Fischer de Waldheim.

ИЗВѢСТІЯ

ИМПЕРАТОРСКАГО

Ботаническаго Сада Петра Великаго.

Томъ XIII, выпускъ 5—6.

Съ 1 рисункомъ въ текстъ и 1 картой.

Содержаніе.

Къ флорѣ Костромской губерніи. *К. К. Косинскій.*

Къ изученію лишайниковыхъ формаций и лишайниковъ Восточнаго Болотнаго района Псковской губерніи. *В. П. Савичъ.*

BULLETIN

DU JARDIN IMPÉRIAL BOTANIQUE
DE PIERRE LE GRAND.

Tome XIII, livraison 5—6.

Avec 1 figure dans le texte et 1 carte.

Sommaire.

Note sur la flore du gouvernement de Kostroma. *C. Kossinsky.*

Zum Studium der Flechten und der Flechtenformationen im östl. Sumpfgebiet des
Gouv. Pskow. *I. P. Savicz.*

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1913.

К. К. Косинскій.

Къ флорѣ Костромской губерніи.

Лѣтомъ 1912 г. я сдѣлалъ рядъ ботаническихъ экскурсій въ предѣлахъ Костромской губерніи, главнымъ образомъ въ Буйскомъ и отчасти въ Костромскомъ, Нерехтскомъ и Кинешемскомъ уѣздахъ (въ долину Волги).

Костромская губернія въ ботаническомъ отношеніи изслѣдована далеко недостаточно, и всего болѣе это примѣнимо къ Буйскому уѣзду, относительно котораго имѣется лишь нѣсколько ссылокъ въ спискѣ растений Костромской губ. Мейснера (Матер. къ познанію фауны и флоры Росс. Имперіи. Отд. ботан., вып. 3, Москва, 1899 г.). Это обстоятельство позволяетъ мнѣ думать, что даже краткія, общаго характера, замѣтки относительно флоры Буйскаго уѣзда и другихъ частей губерніи не будутъ лишними.

Буйскій уѣздъ лежитъ въ сѣверо-западной части Костромской губ. *), примыкая на западъ къ Ярославской (Любимскій у.) и Вологодской (Грязовецкій у.) губерніямъ, на сѣверѣ къ Солигалицкому, на востокъ къ Галицкому у. у. Костр. губ. и на югѣ къ Костромскому у. Онъ расположенъ по среднему теченію рѣки Костромы и по ея притокамъ: Пустой Шачѣ, Корѣгѣ (справа), Мезендѣ, Вѣксѣ, Тѣбзѣ и Инсьмѣ (слѣва). Сѣверо-западная его граница проходитъ по водораздѣлу, отдѣляющему бассейнъ Волги отъ бассейна Сѣв. Двины. Обиліе рѣчекъ, выработавшихъ порою глубокія долины, придаетъ уѣзду болѣе или менѣе холмистый характеръ. Почвы главн. образ. суглинистыя.

Изъ растительныхъ формаций преобладающей является:

1) Лѣсъ (большей частью вторичнаго происхожденія, послѣ гари, поруби, пашни), занимающій большія сплошныя пространства въ сѣверо-восточной и западн. части уѣзда.

*) Между 58° 50' и 57° 57' с. ш. и между 10° 37' и 11° 42' в. д. отъ Пулкова.

Другія формаціи:

- 2) Луга.
- 3) Болота.
- 4) Водная растительность.
- 5) Сорняки.

6) Переходныя сообщества: растительность на порубяхъ, горяхъ, на выступившемъ изъ подъ воды днѣ водныхъ бассейновъ.

Незначительный районъ наблюдений и ихъ непродолжительность не позволяютъ мнѣ подробно остановиться на каждой изъ формаций, поэтому придется ограничиться лишь перечисленіемъ видовъ растений, характерныхъ для каждой изъ нихъ.

I. Лѣсъ.

Преобладающей лѣсной формацией являются еловые лѣса съ большей или меньшей примѣсью другихъ древесныхъ породъ. Какъ на примѣръ стараго негустого еловаго лѣса на сырой подзолистой почвѣ съ богатымъ травянымъ и моховымъ покровомъ можно указать на лѣсъ въ верховьи рѣки Волжаницы въ сѣверо-западной части уѣзда на водораздѣлѣ бассейновъ Волги и Сѣверной Двины. Растительный составъ его:

Верхній ярусъ: Ель + (ольха + осина + береза).


Подлѣсокъ: Рябина (много), липа и кленъ (не часто), *Lonicera xylosteum* L., *Daphne Mezereum* L., *Rosa acicularis* Lindl., *Salix* и др.

Подростъ: Ель.

Травяной покровъ: кромѣ обычныхъ:

<i>Oxalis Acetosella</i> L.	<i>Pulmonaria officinalis</i> L.
<i>Majanthemum bifolium</i> DC.	<i>Lathyrus vernus</i> Bernh.
<i>Aegopodium Podagraria</i> L.	<i>Asarum europaeum</i> L.
<i>Nephrodium Dryopteris</i> Mich.	<i>Crepis paludosa</i> Mönch.
<i>Vaccinium Myrtillus</i> L.	
V. <i>Vitis idaea</i> L.	попадались также:
<i>Rubus saxatilis</i> L.	<i>Galium triflorum</i> Michx.
<i>Linnaea borealis</i> L.	<i>Pirola uniflora</i> L.
<i>Trientalis europaea</i> L.	<i>Cinna pendula</i> Trin.
<i>Paris quadrifolia</i> L.	<i>Goodyera repens</i> R. Br.
<i>Equisetum silvaticum</i> L.	<i>Epipogon aphyllus</i> Sw. (1 экз.)
<i>Aconitum excelsum</i> Reichb.	<i>Rubus arcticus</i> L. (открытыя мѣста).
<i>Nephrodium spinulosum</i> Strempel.	

Въ другихъ случаяхъ въ словыхъ лѣсахъ, кромѣ упомянутыхъ выше обычныхъ формъ, приходилось встрѣчать *Abies sibirica*



Масштабъ 10 верстъ въ англ. дюймъ

Маршруты

10 --- Граница проезда.

Led. (пзрѣдка), *Nardosmia frigida* Hook. (Афонино, сз. часть уѣзда), *Actaea spicata* L. β *erythrocarpa* Turcz., *Clematis sibirica* Mill. (по опушкѣ) (Каблуково), *Microstylis monophylla* Lindl. (Жуково).

Сосновыя, б. м. чистыя насажденія приурочены или къ песчаной, или къ болотистой почвѣ. Примеры:

1) Сосновый лѣсъ на пескѣ съ валунами (къ сѣверу отъ р. Тѣбзы, близъ с. Борокъ):

Сосна (рѣдкое молодое насажденіе), *Festuca ovina* L. (обильно), *Antennaria dioica* Gärtn., *Arctostaphylos Uva ursi* Spr., *Filago arvensis* Fries., *Hieracium umbellatum* L., *Erigeron acer* L., *Cladonia* (обильно), *Cetraria islandica*.

2) Сосновый лѣсъ на песчаной почвѣ (къ сѣверу отъ Буя). Трав. покровъ: черника + брусника, *Antennaria dioica* Gärtn. *Melampyrum pratense* L. и др. *Lycopodium complanatum* L.

3) Сосновая роща близъ усадьбы Афонино (сѣв. часть у.) — средн. возрастъ въ 190 л., отдѣльныя сосны до 50 и болѣе аршинъ высоты, въ 200—250—280 см. въ діаметрѣ: развились на бывшей пашнѣ; почва песчаная. Подростъ — ель, травяной покровъ — обычный для елов. насажденія:

черника (обильно), *Pirola*, *Trientalis europaea* L., *Majanthemum bifolium* DC., *Goodyera repens* R. Br., брусника, *Oxalis Acetosella* L.

4) Соснякъ на торфяной болотистой почвѣ (къ югу отъ Буя): Подростъ — сосна:

Lyonia calyculata Rehb., *Ledum palustre* L., *Oxycoccus palustris* Pers., *Orchis maculata* L., *Carex globularis* L., *Eriophorum vaginatum* L., *Vaccinium uliginosum* L., *V. Vitis idaea* L., *Sphagnum*, *Polytrichum*.

Замѣчается, какъ и въ другихъ областяхъ, вытѣсненіе сосны елью: въ сосновыхъ лѣсахъ, при благоприятныхъ почвенныхъ условіяхъ, подростъ почти всегда еловый. Тогда развивается обычный для еловаго лѣса травяной покровъ.

Лиственные лѣса:

Березняки — явленіе вторичное и переходное, появляются, напр., на бывшей пашнѣ и затѣмъ вытѣсняются елью.

Ольшаники — чаще всего приурочены къ берегамъ рѣчекъ и ручьевъ. Травяной покровъ у воды подъ пологомъ ольхи порой развивается роскошно:

Верхній ярусъ:
Filipendula Ulmaria Maxim.
Urtica dioica L.
Stachys silvatica L.

Anthriscus silvestris Hoffm.
Aconitum excelsum Rehb.
Lappa tomentosa Lam.
Heracleum sibiricum L.

Cirsium oleraceum Scop.
Lysimachia vulgaris L.
Thalictrum
Solanum Dulcamara L.

Порои:

Campanula latifolia (иногда съ
бѣл. цв.)
C. trachelium L.
Scrophularia nodosa L.
Struthiopteris germanica Willd.

Chaerophyllum aromaticum L.
Humulus Lupulus L. и др.

* Нижній ярусъ:

Impatiens noli tangere L.
Aegopodium Podagraria L.
Ranunculus repens L.

Порои:

Adoxa Moschatellina L. и др.

По берегамъ рѣкъ и старицъ встрѣчаются также и сообще-
ства с мѣшанныхъ листовыхъ породъ:

Alnus incana Willd.
Populus tremula L.
Береза
Quercus Robur L. (небольшихъ
размѣровъ; въ долины р.
Костромы, насколько мнѣ
извѣстно, не встрѣчается).

Sorbus Aucuparia L.
Prunus Padus L.
Rhamnus Frangula L.
Viburnum Opulus L.
Salix (напр. *S. cinerea* L. и др.)

(Берегъ Святого озера въ долину р. Костромы).

Ulmus glabra Mill.
Populus tremula L.
Береза.
Рябина.
Alnus incana Willd.
Viburnum Opulus L. и др.

Aconitum excelsum Rehb.
Delphinium elatum L.
Campanula latifolia L.
Cacalia hastata L. и др.

(Усадьба Ивановское, берегъ р. Корѣн).

II. Луга.

Изъ луговъ останавлиюсь только на пойменныхъ лугахъ по
р. Вѣксѣ (притокъ Костромы) *), для которыхъ отмѣчу:

Верхній ярусъ:
Alopecurus pratensis L.
Phleum pratense L.
Deschampsia caespitosa P. B.
Festuca pratensis L.
Poa palustris L.
Agrostis alba L.

Bromus inermis Leyss.
* *Polygonum Bistorta* L.

Средній ярусъ:

*Chrysanthemum Leucanthe-
mum* L. (много)
Lathyrus pratensis L. (много)

*) Посѣщены 3 и 4. VII.

Ranunculus acer L.

Vicia Cracca L.

* *Galium rubioides* L.

Rumex Acetosa L.

* *Campanula glomerata* L.

* *Dianthus superbus* L.

Trifolium pratense L.

Plantago media L.

Veronica longifolia L.

Leontodon autumnalis L.

* *Allium Schoenoprasum* L.

Rhinanthus major Ehrh.

Lychnis Flos cuculi L.

Кромѣ того попадаются:

Tragopogon pratensis L.

Heracleum sibiricum L.

* *Allium angulosum* L. (изрѣдка)

Отмѣченные звѣздочкой виды наиболѣе характерные.

На болѣе низкихъ мѣстахъ:

Agrostis canina L.

Myosotis palustris Roth.

Galium palustre L.

Juncus filiformis L.

Ranunculus repens L.

Filipendula Ulmaria Maxim.

Carex

Нижній ярусъ:

Achillea Millefolium L.

Glechoma hederacea L.

Trifolium repens L.

Galium uliginosum L.

Alchemilla vulgaris L.

III. Болота.

Сфагновые болота занимаютъ порой значительныя пространства, часто приурочены къ водораздѣламъ. Какъ на примѣръ укажу на болото въ верховьяхъ р. Воляжаницы (на водораздѣлѣ С. Двины и Волги), среди ранѣ упомянутаго еловаго лѣса. Характеризуется оно слѣдующими растительными формами:

Рѣдкія, порой засохшія сосны.

Подростъ — покрытыя лишайниками березы и сосны.

Травяной покровъ:

Carex limosa L. (обильно)

C. lasiocarpa Ehrh. (обильно)

Eriophorum gracile Koch.

Menyanthes trifoliata L.

Potentilla palustris Scop.

Lyonia calyculata Rehb.

Equisetum limosum L.

Drosera rotundifolia L. (обильно)

Oxycoccus palustris Pers.

Epilobium palustre L.

Кромѣ того:

Melampyrum pratense L.

Pedicularis palustris L.

Equisetum palustre L.

Моховой покровъ: *Sphagnum*

Болото это довольно ровное, не кочковатое, на значительномъ протяженіи отъ края имѣетъ одинаковый характеръ растительности.

На другихъ сфагновыхъ болотахъ отмѣчу обычные для нихъ виды:

Ledum palustre L.
Lyonia calyculata Rehb.
Vaccinium uliginosum L.
Eriophorum vaginatum L.

Andromeda polifolia L.
Rubus chamaemorus L. и др.
 растен.

По сырымъ низкимъ мѣстамъ, вдоль ручьевъ, рѣчекъ, по берегамъ прудовъ, порой и въ самой водѣ, обычны слѣдующія формы:

Scirpus silvaticus L.
Carex ampullacea Good.,
C. acuta L. и др.
Eriophorum
Equisetum limosum L.
Menyanthes trifoliata L.
Pedicularis palustris L.
Orchis incarnata L.
Potentilla palustris Scop.
Caltha palustris L.
Calla palustris L.
Cardamine amara L.
Alisma Plantago L.
Naumburgia thyrsoflora Rehb.

Lycopus europaeus L.
Ranunculus Flammula L.
Juncus lamprocarpus Ehrh.,
J. effusus L.
Heleocharis palustris R. Br.,
H. acicularis R. Br.
Glyceria fluitans R. Br.
Peplis Portula L.
Limosella aquatica L.
Elatine callitrichoides Rupr. (въ водѣ)
Utricularia intermedia Hayne
 (въ водѣ).

IV. Водная растительность.

Въ пойменныхъ озерахъ по р. Вѣксѣ и Костромѣ растительность довольно однообразна. Для ея характеристики останавлиюсь на „Святомъ“ озерѣ, самомъ большомъ въ уѣздѣ. Озеро это находится въ долинѣ р. Костромы, въ 8 верстахъ къ юго-западу отъ Буя, и представляетъ собою старицу этой рѣки. Длина его приблизительно $1\frac{1}{2}$ версты, шир. сажень 40—60, глубина до 1 саж., дно илистое, вязкое. Съ концовъ оно постепенно зарастаетъ тростникомъ, осокой и пр. На основаніи имѣющихся литературныхъ данныхъ *) — озеро лѣтъ 50 тому назадъ было значительно больше: длиной 3 версты, шир. 60—300 саж.

У берега и въ водѣ озера наблюдались слѣдующіе виды:

Carex acuta L.
Phragmites communis Trin.
Comarum palustre L.
Equisetum limosum L.

Scirpus lacustris L.
Sagittaria sagittifolia L.
Sparganium
Sium latifolium L.

*) Матеріалы для геогр. и статист. Россіи, собраны офицерами генер. штаба. Костр. губ. Составилъ Крживоблоцкій. СПб., 1861.


Alisma Plantago L.
Cicuta virosa L.
Nuphar luteum Sibth. et Sm.
Nymphaea candida Presl.
Stratiotes aloides L.
Hydrocharis morsus ranae L.
Lemna minor L.
L. trisulca L.
Spirodela polyrrhiza Schleid.
Potamogeton natans L.
P. praelongus Wulf
P. compressus L.

Myriophyllum.

Изъ нихъ наиболѣе характерны:

Carex acuta L.
Phragmites communis Trin.
Equisetum limosum L.
Scirpus lacustris L.
Nymphaea candida Presl.
Nuphar luteum Sibth. et Sm.
Stratiotes aloides L. (въ зали-
вахъ и концахъ озера)
Potamogeton natans L.

О характерѣ западнаго и восточнаго береговъ озера и распредѣленіи водной растительности можно судить по слѣдующей схемѣ:



ab: травянистый склонъ.
bc: *Phragmites communis*, } берегъ
Carex acuta. }
Equisetum limosum, } вода
Phragmites communis. }
cd: *Nymphaea candida*,
Nuphar luteum,
Potamogeton natans.

a, b.: *Salix*, *Alnus incana*,
Populus tremula, береза,
Quercus Robur и др. лист.
деревья.
b, c.: *Phragmites communis*,
Carex acuta.

Полоса водныхъ, въ частности плавающихъ растений развита у западн. открытаго берега озера значительно лучше. Слабое развитіе зоны этихъ растений у вост. берега можно объяснить затѣненіемъ древесной растительностью, сопровождающей этотъ берегъ. и, отчасти, болѣе волненіемъ, вслѣдствіе преобладанія вѣтровъ съ западной составляющей. Узкіе заливы и концы озера, какъ болѣе спокойныя и мелкіе бассейны, характеризуются сильнымъ развитіемъ плавающихъ формъ (напр., мощныя заросли *Stratiotes aloides*).

Въ медленно текущихъ водахъ небольшихъ рѣчекъ пришлось наблюдать нѣсколько иную растительность. Такъ, напр., въ р. Тѣбзѣ, у с. Борокъ, выше мельницы, въ почти стоячей водѣ отмѣчу богатое населеніе, образующее б. м. широкую зону вдоль берега и состоящее изъ слѣдующихъ формъ:

Надводныя формы:

Scirpus lacustris L.
Sagittaria sagittifolia L.
Oenanthe Phelandrium Lam.
Sium latifolium L.
Sparganium.

Плавающие формы:

Nymphaea candida Presl.
Nuphar luteum Sibth. et Sm.
Polygonum amphibium L.

Подводныя формы:

Potamogeton lucens L.
P. perfoliatus L.
P. pectinatus L.
Ranunculus pseudoflaccidus Petun.
R. circinnatus Sibth.
Hippuris vulgaris L.
Callitriche palustris L.
Utricularia vulgaris L.
Myriophyllum
Elatine callitrichoides Rupr.

По берегу этой же рѣки находить *Scirpus radicans* Schk.

V. Сорная растительность.

На пустыряхъ, близъ жилищъ чаще всего встрѣчаются:

Lappa tomentosa Lam.
Stellaria media Cyrill
Galeopsis Tetrahit L.
G. versicolor Curt.
Erysimum cheiranthoides L.
Urtica dioica L. и *urens* L.
Poa annua L.
Polygonum aviculare L.
Matricaria suaveolens (Pursh)
 Buchen. (порой замѣчается
 быстрое вытѣсненіе ею дру-
 гой растительности.)
Geum aleppicum Jacq.
Sisymbrium officinale Scop.
Artemisia vulgaris L.
Leonurus cardiaca L.
Carduus crispus L.
Cirsium arvense Scop.
C. lanceolatum Scop.
Hyoscyamus niger L.
Myosotis sparsiflora Mik.

Изрѣдка:

Cichorium Intybus L.
Lappa minor DC.

Въ садахъ и огородахъ:

Myosotis intermedia Link.
M. sparsiflora Mik.
Thlaspi arvense L.
Capsella bursa pastoris Moench.
Taraxacum vulgare Schrank.
Fumaria officinalis L.
Chenopodium album L.
Ch. polyspermum L.
Erysimum cheiranthoides L.
Stenophragma thalianum Celak.
Lamium purpureum L.
Stachys palustris L.
Polygonum lapathifolium L.
Nasturtium palustre DC.
Sonchus asper Hill.
S. arvensis L.
Cirsium arvense Scop.

Изрѣдка:

Chaerophyllum bulbosum L.
Borrago officinalis L. (одичав-
 шее).

Въ поляхъ:

Thlaspi arvense L.
Capsella bursa pastoris Mönch.
Sagina procumbens L.
Stenophragma thalianum Celak.
Scleranthus annuus L.
Gypsophila muralis L.
Viola tricolor L.
Spergularia campestris Aschers.
Spergula arvensis L.
Gnaphalium uliginosum L.
Vicia sativa L. (яров. поле)
Bromus secalinus L.
Lolium remotum Schrank. (во
 льнѣ)
Agrostemma Githago L. (яров.
 поле)
Arnhemis tinctoria L. (яров. поле)
Brassica Rapa L. α *campestris*
 (яров. поле)
Barbarea vulgaris R. Br.

Lycopsis arvensis L. } яров. поле
Erodium cicutarium } (песч.
 L'Hérit. } почва).
Euphorbia helioscopia L.
 (нашелъ лишь въ одномъ
 мѣстѣ, въ овецѣ)
Galium spurium L. β *Vaillantii*
 Gren. et Godr. *
Vicia hirsuta (L.) G. Koch. (яров.
 поле)
Centaurea Cyanus L. (пожъ)
Convolvulus arvensis L. (пожъ)
Delphinium consolida L. (пожъ)
Polygonum Convolvulus L. (пожъ)
Chrysanthemum vulgare Bernh.
Stachys palustris L.
Crepis tectorum L.
Linaria vulgaris Mill.
Matricaria inodora L.
Trifolium arvense L.
Vicia sativa L. var. *angustifolia*
 (Roth) Ser.
Galeopsis Ladanum L. и др.

Смѣна формаций.

Какъ на интересный примѣръ такой смѣны могу указать на растительность низкаго берега р. Корёги, выступившаго въ 1911 г. изъ подъ воды благодаря уничтоженію мельничной плотины. Еще въ 1910 г. здѣсь была обычная для медленно текущихъ водъ растительность, состоящая изъ *Polygonum amphibium*, *Nuphar luteum*, *Ranunculus pseudoflaccidus* и др. Теперь здѣсь можно отмѣтить:

1) обреченныя на гибель, тѣснимыя постоянными сухонутными растеніями, наземныя формы водныхъ растеній:

Nuphar luteum Sibth. et Sm. съ небольшими кожистыми листьями на короткихъ черешкахъ,

Ranunculus pseudoflaccidus Petun. α *emersus*
 (очень мелкіе экземпляры),

Polygonum amphibium L. β *terrestre*,

Hippuris vulgaris L.,

2) переходные элементы, быстро захватывающіе новые мѣста:

Nasturtium palustre DC. (обильно!),

Urtica dioica L. и др.,

3) элементы, переходящіе сюда съ сосѣдняго дуга, за которыми побѣда въ будущемъ:

Campanula patula L.,

Poa trivialis L.,

Chrysanthemum *Leucanthemum* L.,

Lycchnis Flos cuculi L.,

Trifolium pratense L. и др.

Deschampsia caespitosa (L.) P. B.,

Изъ другихъ случаевъ смѣны формаций можно отмѣтить появленіе на лѣсныхъ порубкахъ

Calamagrostis Epigeios Roth.

Pteridium aquilinum Gleditsch.,

Rubus Idaeus L.

Chamaenerium angustifolium

порой

Scop.

Verbascum Thapsus L. и др. раст.

Долина р. Волги.

Въ окрестностяхъ г. Костромы и въ смежныхъ частяхъ Кинешемскаго и Перехтскаго уѣздовъ (близъ Семигорья) я эскурсировалъ почти исключительно въ предѣлахъ Волжскаго побережья.

Здѣсь, на заливаемыхъ, преимущественно песчаныхъ берегахъ Волги обычны слѣдующія растенія:

Euphorbia virgata W. K.

Juncus ranarius Song. et Perr.

Lotus corniculatus L.

Limosella aquatica L.

Artemisia procera Willd.

Gnaphalium uliginosum L.

Corispermum intermedium

Nasturtium palustre DC.

Schweigg. var. *Marschalii*

Echinospermum Lappula Lehm.

Melilotus albus Desr.

Medicago lupulina L.

Inula britannica L.

Порой встрѣчаются по берегамъ Волги:

Medicago falcata L.

Astragalus hypoglottis L.

Populus nigra L.

Panicum lineare Krock.

Petasites spurius Rehb.

Eragrostis pilosa P. B.

Rubus caesius L.

Panicum Crus galli L.

Cenolophium Fischeri Koch.

Heliochloa schoenoides Host.

Torilis Anthriscus Gmel. (на-

Plantago major L. *a intermedia*

(Gilib.) Wildem. et Durand.

шелъ 1 экземпляръ на кру-

Silene procumbens Murr.

томъ глинист. склонѣ).

Для зарослей лиственныхъ древесныхъ породъ, сопровождающихъ берега Волги характерны:

Ольха. *Evonymus verrucosus* Scop. *Campanula latifolia* L.

Осина. *Daphne Mezereum* L. *Aegopodium Podagraria* L.

Орѣшникъ.	<i>Lonicera Xylosteum</i> L.	<i>Lathyrus vernus</i> Bernh.
Рябина.	<i>Ribes rubrum</i> L.	<i>Aconitum excelsum</i> Reichb.
Клеѣтъ.	порой хмель.	<i>Paris quadrifolia</i> L.
Ясень.		<i>Asarum europaeum</i> L.
Черемуха.		<i>Convallaria majalis</i> L.

Въ такихъ заросляхъ также встрѣчалъ:

<i>Mercurialis perennis</i> L.	<i>Geranium Robertianum</i> L.
<i>Circaea lutetiana</i> L.	

Кромѣ того въ долину Волги находилъ:

<i>Erythraea Centaurium</i> Pers.	<i>Eryngium planum</i> L.
<i>Gentiana Pneumonanthe</i> L.	<i>Erigeron canadensis</i> L.
<i>Agrimonia Eupatoria</i> L.	

Новыя для губерніи растенія:

Изъ собранныхъ мною приблизительно 500 видовъ растеній слѣдующіе виды до сихъ поръ, насколько мнѣ извѣстно изъ литературы, не были указаны для Костр. губ.:

- 1) *Heleochoa schoenoides* Host. (на песчаномъ берегу Волги, близъ Семигорья, Кішеш. у.).
- 2) *Carex tenella* Schkuhr (торфяное болото, Буйск. у., верховье р. Воляжаницы, и на лѣсной просѣкѣ къ югу отъ г. Буя).
- 3) *Juncus ranarius* Song. et Perr. (на выступившемъ изъ подъ воды глинистомъ берегу Волги, близъ устья Кубани, въ Костр. у.).
- 4) *Dianthus Courtoisii* Rehb. (= *D. barbatus* × *superbus*) (стар. паркъ, ус. Каблуково, Буйск. у.).
- 5) *Sempervivum soboliferum* Sims. (холмъ, на сухой почвѣ, бл. Солощикова, Костр. у.).
- 6) *Elatine Hydropiper* L. (Святое озеро близъ Ипатьевск. монастыря, Костр. у.).
- 7) *Elatine callitrichoides* (Rupr.) Nyland. (р. Тѣбза, село Борокъ, Буйск. у.).
- 8) *Viola Selkirkii* Goldie — въ елово-соснов. лѣсу бл. усадьбы Каблуково, 14 авг., Буйск. у.
- 9) *Matricaria suaveolens* (Pursh) Buchen. Всюду оч. обыкновенна близъ жилья и по дорогамъ. Появилась въ губерніи очевидно недавно (въ спискѣ рр. у Мейснера, 1899 г. не указывается) и очень быстро расселилась).
- 10) *Rudbeckia hirta* L. Клеверное поле, ус. Каблуково, Буйск. у.,

спорадически. Въ этомъ году найдена въ Новг. губ. Вл. Л. Комаровымъ и въ Можайск. у. Моск. губ. А. В. Ипковскимъ: до сихъ поръ для Россіи, на сколько извѣстно, не указывалась.

Въ заключеніе приношу глубокую благодарность Директору Императорскаго Ботаническаго Сада Петра Великаго, А. А. Фишеру-фонъ-Вальдгейму, за разрѣшеніе пользоваться библіотекой и гербаріемъ Сада, Б. А. Федченко за рядъ цѣпныхъ указаній по обработкѣ гербарнаго матеріала и Р. Ю. Роякевичу за провѣрку и опредѣленіе нѣкоторыхъ злаковъ.

C. Kossinsky.

Note sur la flore du gouvernement de Kostroma.

(R é s u m é).

Les excursions botaniques que j'ai fait pendant l'été 1912 au gouvernement de Kostroma, principalement au district de Bouy, et qui sont seulement le commencement de mes recherches futures dans ce gouvernement, ont donné les résultats suivants:

1. Les formations naturelles des plantes au district de Bouy sont:
1. Les forêts (formation prédominante):
 - a) forêts de sapins,
 - b) forêts de pins au sol sablonneux et dans les marais tourbeux; hors de ces conditions le pin (*Pinus silvestris* L.) est supplanté par le sapin (*Picea excelsa* Link.);
 - c) les bois à feuilles dans les vallées des rivières.
2. Les prairies dans les vallées des rivières.
3. Les marais (p. ex. *Sphagnetum*, *Caricetum*).
4. La végétation aquatique.

Les autres formations sont le résultat de l'activité de l'homme (p. ex. les prés dans les jachères, les bosquets de bouleaux dans les endroits où les bois sont coupés).

II. Les espèces non indiquées jusqu'à présent que j'ai trouvées au gouvernement sont:

- 1) *Heliochloa schoenoides* Host.
- 2) *Carex tenella* Schkuhr.

- 3) *Juncus ranarius* Song. et Perr.
 - 4) *Dianthus Courtoisii* Rehb. = *D. barbatus* L. × *D. superbus* L.
 - 5) *Sempervivum soboliferum* Sims.
 - 6) *Elatine Hydropiper* L.
 - 7) *Elatine callitrichoides* (Rupr.) Nyland.
 - 8) *Viola Selkirki* Goldie.
 - 9) *Matricaria suaveolens* (Pursh) Buchen.
 - 10) *Rudbeckia hirta* L.
-

В. П. Савичъ.

Къ изученію лишайниковыхъ формаций и лишайниковъ Восточнаго Болотнаго района Псковской губерніи.

Предисловіе.

Осенью 1912-го года мнѣ была передана А. Р. Каксомъ лишайниковая коллекція, собранная имъ въ „Восточномъ Болотномъ районѣ“ Псковской губерніи¹⁾.

А. Р. Каксъ работалъ тамъ по порученію Псковскаго земства надъ изученіемъ болотной растительности и, между прочимъ, собралъ довольно полную коллекцію болотныхъ лишайниковъ. По этой коллекціи, въ связи съ данными Какса, является возможнымъ дать нѣкоторое описаніе лишайниковыхъ формаций въ нѣсколькихъ типахъ торфяныхъ болотъ.

Въ переданной имъ мнѣ коллекціи оказались сборы изъ пяти торфяниковыхъ формаций: *Sphagnetum nano-pinosum*, *Sphagnetum magno-pinosum*, *Sphagnetum betulo-pinosum*, *Sphagnetum betulo-caricosum* и *Sphagnetum vagino-eriphorosum*. Наиболѣе полные, можно сказать, исчерпывающіе сборы имѣются изъ первой упомянутой формации; затѣмъ интересны сборы изъ второй и четвертой формаций; наиболѣе слабо представлена формация *Sphagnetum betulo-pinosum*, которой мы поэтому и не будемъ касаться.

Въ свое время я уже разъ коснулся лишайниковыхъ формаций торфяныхъ болотъ²⁾ Петербургской губерніи. Для излѣдованій Каксомъ мѣстъ Псковской губ. необходимо сохранить

¹⁾ Поллетовскія болота Холмскаго и Новоржевскаго уѣздовъ.

²⁾ В. П. Савичъ, „Изъ жизни лишайниковъ СПб. губ.“ въ „Труд. СПб. общ. Ест.“ 1909 г. Т. XL, стр. 129—130.

старья мои формационныя подраздѣленія, именно разсматривать въ почти каждой торфяной формаци — три лишайниковыхъ сообщества: 1) на торфяной почвѣ (почвенная формация), 2) внизу стволовъ, на шпяхъ и мелкихъ болотныхъ кустарникахъ (низовая формация) и 3) на стволахъ деревьевъ (стволовая формация).

Перваго рода лишайниковая формация мыслима, конечно, во всевозможныхъ комбинаціяхъ торфяныхъ сообществъ, вторая и третья требуютъ присутствія подходящаго субстрата, т. е. пней, кустарниковъ и деревьевъ. Посмотримъ же каковы эти формаци въ различныхъ типахъ болотъ Невской губерніи, изъ коихъ имѣются сборы и наблюденія Какса¹⁾.

I. Описаніе болотныхъ лишайниковыхъ формаций.

1. Лишайниковая формация типа *Sphagnetum vagino-eriphorosum*.

Объ этой формаци М. М. Юрьевъ²⁾ говоритъ слѣдующее: „та формация, которая носитъ названіе *Sphagnetum vagino-eriphorosum* и представляетъ собой безлѣсныя площади, съ тонкой моховой поверхностью, очевидно корешить въ себѣ еще большій приростъ сфагнума³⁾, который быстро поглощаетъ въ свои пѣдра попадающія сѣмена и также быстро заглушаетъ ихъ развитіе“. Ясно, что въ такой формаци трудно найти какое бы то не было лишайниковое сообщество и прежде всего исключается возможность стволовой и низовой формаций, разь этотъ типъ болотъ представляетъ безлѣсныя площади, къ тому же съ тонкой поверхностью, что исключаетъ возможность развитія кустарниковъ.

Въ сборахъ Какса нѣтъ въ сущности и почвенной формаци, такъ какъ хотя въ его коллекціи и есть три лишайника съ указаніемъ о сборѣ въ этой именно формаци, но эта находка случайна и легко объяснима исторіей болота. Эти лишайники: *Parmelia sulcata*, *Evernia prunastri* и *Evernia thamnodes* найдены на „заростающемъ пнѣ“.

Этотъ заростающій пень свидѣтельствуетъ о смѣнѣ какой то

1) Въ описаніи формаций я буду опираться на замѣтки Какса на этикеткахъ его гербарія; эти замѣтки приведевы (болыш. частью въ кавычкахъ) ниже въ систематическомъ спискѣ въ примѣчавіяхъ къ соотвѣтствующимъ видамъ. О нѣкоторыхъ вопросахъ я бесѣдовалъ лично съ Каксомъ. Наконецъ, много соображеній можетъ дать внѣшній обликъ сборовъ, количество и т. д.

2) М. М. Юрьевъ, „Къ вопросу о взаимоотношеніяхъ между приростомъ сфагноваго ковра и сосны въ разл. формац. мох. бол.“ — въ „Труд. Студ. Науч. Круж. Физ.-Мат. Фак. СПб. Унив. 1911 г. вып. 3, стр. 87, и снимокъ на табл. № 4, на стр. 76.

3) чѣмъ въ формаци *Sph. nano-pinosum*.

стволовой формациі данной формацией и на немъ нашли послѣдній пріютъ типичные представители стволовой формациі при гибели послѣдней. Для этихъ лишайниковъ, и еще для *Parmelia physodes*, и мнѣ приходилось не разъ замѣчать подобную способность выживать при смѣнѣ субстрата, даже при переходѣ отъ стволового мѣстообитанія къ наземному.

Но слѣдуетъ замѣтить, что существованіе почвенной формациі лишайниковъ въ данномъ типѣ торфяного болота теоретически исполнѣ возможно, такъ какъ уже разъ мною указывалась *Cladonia rangiferina* „даже среди *Scheuchzerieta-Sphagnetum*“ въ болотахъ Петербургской губ.¹⁾ Этотъ лишайникъ можетъ исполнѣ успѣшно бороться съ нарастающимъ сфагномъ, достигая гигантской для него высоты; его подеціи тѣсно зажаты въ моховомъ коврѣ и здѣсь совершенно мертвы; только небольшая часть, возвышающаяся надъ сфагномъ, живетъ весьма дѣятельной жизнью.

Въ этомъ обитаніи можетъ мѣшать развитію почвенной формациі скорѣй ростъ пушицы, да слишкомъ сильная водянистость мохового ковра.

2. Лишайниковыя формациі типа *Sphagnetum nano-pinosum*.

Этотъ типъ болотъ М. М. Юрьевъ²⁾ считаетъ однимъ изъ характерныхъ для Псковской губ. и переходнымъ отъ описаннаго *Sphagnetum vagino-eriphorosum* къ *Sphagnetum magnopinosum*. Такія болота влажны и даже топки, ровны или кочковаты, со стелющейся болотной сосной съ густой кроной. „Не только стволъ сосны, но и вѣтви оказываются погребенными въ торфѣ, а торчащая на поверхности верхушка густо покрыта лишайниками“³⁾.

Несмотря на такой низкій ростъ сосны, стволовая формациія развивается, судя по коллекціи Какса, дѣйствительно великолѣпно. Нижняя граница такой формациі, благодаря своеобразному росту сосны, сильно понижается, а низовая формациія на стволахъ становится скорѣе наземной и нѣсколько смѣшивается со стволовой, тѣмъ болѣе, что низовая формациія развивается на полудкустарникахъ, у основанія стволонъ, шпяхъ. и на торчащихъ изъ сфагна или низко свѣшивающихся вѣткахъ сосенъ. Затѣмъ имѣются всѣ данныя и для развитія почвенной формациі, такъ какъ „травянистый покровъ, очень бѣдный по видовому составу,

1) В. П. Савичъ, „Изъ жизни лишайниковъ СПБ. губ.“ I. с. стр. 129—130.

2) I. с. стр. 76—77.

3) I. с. тѣ же стр.

въ тоже время слабо покрываетъ поверхность¹⁾“, а растущая здѣсь пушица уплотняетъ моховой коверъ, образуя вокругъ себя кочки, являющіяся хорошимъ пристанищемъ для почвенныхъ видовъ. Дѣйствительно, судя по коллекціи Какса, въ данномъ типѣ болота прекрасно развиты всѣ эти три формаціи, а поэтому можно думать, что этотъ типъ болотъ очень характеренъ (что указываетъ и Юрьевъ) и распространенъ въ Псковской губ.

Почвенная формація такого типа торфяного болота никогда еще у насъ такъ полно не была представлена, какъ въ коллекціи Какса. Въ близкихъ формаціяхъ къ такому типу болотъ въ Россіи были зарегистрированы: *Cladonia rangiferina* (Сукачевъ 1906²⁾, Савичъ l. c., 129), *Cladonia sylvatica* и *Cladonia alpestris* (Савичъ l. c. 130) — всего три вида, первый для Новгородской и всѣ три для Петербургской и Эстляндской губ.

Въ Псковской губ. Каксомъ найдены между прочимъ еще *Cetraria islandica*, *Cetraria hiascens* и даже *Cladonia squamosa*. Такимъ образомъ, формація эта представится для изслѣдованныхъ Каксомъ мѣстъ въ слѣдующемъ видѣ.

Въ разныхъ мѣстахъ торфяника данной формаціи отдѣльными несмѣшивающимися зарослями среди сфагна, а не на немъ, попадаются: *Cladonia rangiferina*, *Cladonia sylvatica* и *Cladonia alpestris*. Первая изъ нихъ, какъ не боящаяся слишкомъ мокраго мѣстообитанія, встрѣчается всюду, а остальные двѣ, надо полагать, ютятся ближе къ кочкамъ или вообще среди болѣе уплотненнаго ковра, т. к. они еще ни разу не были зарегистрированы для очень водянистыхъ мѣстъ болота. Во время моихъ экскурсій какъ около Ладожскаго озера, такъ и на югѣ Гдовскаго уѣзда, слѣдовательно, недалеко отъ мѣстъ, изслѣдовавшихся Каксомъ, я всегда наблюдалъ именно такое распредѣленіе этихъ видовъ. Всѣ образчики этихъ трехъ видовъ изъ такихъ мѣстообитаній чрезвычайно длинные, при очень незначительной, какъ я уже упоминалъ, живой части подеціи. Наибольшей величины достигаетъ *Cladonia rangiferina*, — 40 сантим.³⁾ въ коллекціи Какса, но живая часть ея доходила только отъ 3 до 5 сантим. Наибольшей величины живая часть достигала у

1) l. c. стр. 76.

2) В. Сукачевъ, „Матеріалы къ изученію болотъ п торфяниковъ Озерн. Обл.“ Въ „Труд. Прѣснов. Біол. Ст. СПб. Общ. Ест. 1906, Т. II, стр. 180.

3) E. Wainio и А. А. Еленкинъ приводятъ величину для *Clad. rangiferina* отъ 3-хъ до 20-ти сантим. рѣже меньшей или большей высоты, см. Wainio, Monogr. Clad. I, p. 12 и Еленкинъ, Лпш. Средн. Росс. III—IV, стр. 471.

C. alpestris, до 5—6 сантим. при переходной зонѣ въ 3 сантим., что вѣроятно обуславливалось жизнью этого лишайника въ мѣстахъ съ меньшимъ приростомъ сфагнума. Затѣмъ, по мелкимъ кочкамъ болота ¹⁾ около шейхеріевыхъ низинъ, гдѣ сфагнумъ совершенно погибъ, а изрѣдка и среди мохового ковра вмѣстѣ съ *Cladonia rangiferina* или среди послѣдней, въ крупныхъ заросляхъ встрѣчается *Cetraria hiascens* f. *dilatata* и f. *fastigiata*, вмѣстѣ или отдѣльно. Съ ними, или на такихъ же мѣстахъ съ погибшимъ сфагномъ, на небольшихъ возвышеніяхъ, часто среди отмершихъ остатковъ пушицы, также большой зарослью растутъ *Cladonia squamosa* var. *denticollis*, а иногда и var. *muricella*.

Кромѣ всѣхъ этихъ формъ здѣсь часто встрѣчается примѣсь *Cetraria islandica* f. *maculata*, но послѣдняя, по свидѣтельству Какса, распространена здѣсь слабо, и еще *Cladonia crispata*, которой собрано также не мало. Всѣ эти виды, въ отличіе отъ видовъ „оленьяго лишая“, растутъ непосредственно на сфагновомъ покровѣ, но въ небольшомъ количествѣ и живутъ здѣсь не долго.

На кочкахъ и заростающихъ пняхъ найдены: *Cladonia deformis*, *Cladonia macilenta* и та же *Cladonia crispata*. Затѣмъ нерѣдко встрѣчается всюду разбросанная по моховому ковра, свободно-живущая *Cetraria islandica* f. *vagans*.

Низовая формація лишайниковъ, какъ я уже говорилъ, развивается на болотныхъ полукустарникахъ: *Andromeda*, *Cassandra* и *Ledum* ²⁾, которыхъ въ такомъ типѣ торфяного болота встрѣчается немного; затѣмъ лишайники селятся у основанія стволовъ и на вѣточкахъ сосенъ, свѣшивающихся или торчащихъ изъ мха отъ погребенныхъ тамъ стволовъ. Формація эта выражена не особенно ярко, хотя и имѣетъ нѣсколько представителей: *Cetraria aleurites*, *Cetraria caperata* ³⁾, *Cetraria saepincola* и *Parmelia ambigua*. Особенно обильно здѣсь, повидимому, распространена *Cetraria saepincola*, которая нарушаетъ видимыя границы между данной и стволовой формаціями, взбираясь на поникающія вѣтви и вѣточки сосенъ, на которыхъ еще всегда въ изобиліи селится *Lecanora coilocarpa* var. *pinastri*.

Стволовая формація вся состоитъ изъ обычныхъ ви-

1) См. примѣч. Какса къ *Cetraria hiascens* и др. въ систематическомъ спискѣ, ниже.

2) М. Юрьевъ I. с. стр. 77.

3) Этотъ лишайникъ имѣетъ отмѣтку Какса „мало распространенъ“. Въ Петербургской губ. въ уѣздахъ Петербургскомъ, Ямбургскомъ и Гдовскомъ, наоборотъ, по моимъ наблюденіямъ, чрезвычайно обыченъ и даже характеренъ для такого рода формацій.

довъ, но богата ихъ количествомъ и интенсивнымъ развитіемъ. Стволы покрыты *Parmelia physodes* f. *labrosa*, *Usnea florida*, б. ч. var. *hirta* и немного *Parmelia sulcata*: затѣмъ смѣшанно встрѣчается: *Evernia prunastri*, *E. furfuracea*, меньше *E. thamnodes*. Всѣ эти виды переходятъ и на вѣтви, гдѣ особенно обильно развиваются еще: *Parmelia olivacea*, *P. tubulosa*, *P. subaurifera*; впрочемъ, послѣдніе виды могутъ встрѣчаться также и на стволахъ. Затѣмъ вѣтви покрыты большей частью *Lecanora coilocarpa* var. *pinastri* и часто *Cetraria saepincola*.

3. Лишайниковыя формациі типа *Sphagnetum magno-pinosum*.

Этотъ типъ болота М. Юрьевъ считаетъ (I. с. стр. 73)¹⁾ самымъ распространеннымъ въ восточномъ болотномъ районѣ Псковской губ. На немъ встрѣчается „исключительно сосна, низкорослая, корявая по виду, густо окутанная различными видами лишайниковъ“, кромѣ того на такомъ болотѣ „сосна поселяется сравнительно очень густо, причемъ около деревьевъ образуются небольшія кочки“. „Травяной покровъ густо покрываетъ поверхность... здѣсь обыкновенно встрѣчаемъ: *Oxycoccus*, *Andromeda*, *Cassandra*, *Ledum*, *Eriophorum* и др.“²⁾ „Поверхность мохового ковра въ отношеніи плотности и влажности его сильно напоминаетъ формацию *Sph. betulo-pinosum*“, т. е. поверхность всхолмлена и всхолмленія болѣе сухи и плотны (I. с. стр. 71).

Почвенная формациа лишайниковъ въ такомъ типѣ болота уже болѣе зависить въ своемъ развитіи отъ травяного покрова, чѣмъ отъ сфагна. И дѣйствительно, здѣсь исчезаютъ виды, не выносящіе развитія травы и полукустарниковъ. Такъ какъ съ не найдены *Cetraria islandica*, *Cladonia squamosa*, а относительно *Cetraria hiascens* онъ и самъ опредѣленно говоритъ: „лишайникъ распространенъ исключительно въ формациі *Sph. nano-pinosum*“. Зато попадаютъ уже новыя виды: *Peltigera polydactyla* и *Peltigera erumpens*. Найдено также немного *Cladonia rangiferina* и прежнія *Cladonia* на пняхъ, какъ *C. deformis* и *C. macilenta*, и кромѣ того *C. macilenta* var. *corticata*.

Низовая формациа состоитъ изъ тѣхъ же видовъ, что и въ предыдущемъ типѣ; особенно развита здѣсь *Cetraria aleurites*, сильно плодоносящая „при поселеніи на горизонтальномъ субстратѣ“. Послѣднее свойство было уже подмѣчено мною для другого вида изъ такой же формациі, встрѣчающагося въ Петер-

1) См. снимокъ у Юрьева I. с. № 3 на стр. 74.

2) Цитаты всѣ изъ Юрьева I. с. стр. 73 и 74.

бургской губ., а именно для *Parmelia ambigua*¹⁾. Последняя въ коллекціи Какса представлена только изъ формаціи *Sph. papirinosum*, но, по его словамъ, онъ встрѣчалъ этотъ лишайникъ въ болотныхъ формаціяхъ Псковской губ. въ большомъ количествѣ во всѣхъ болотныхъ типахъ (см. енетем. списокъ). Замѣчу, что Каксъ хорошо зналъ всѣ приводимые виды лишайниковъ, такъ какъ работалъ въ Споровомъ Гербаріи Сада въ 1911 и 1912 году надъ своими же коллекціями, знакомясь съ лишайниками и мхами болотныхъ формаціи.

Стволовая формація почти такая же, какъ и въ предыдущемъ типѣ болота; кромѣ типичной *Evernia furfuracea* здѣсь найдены еще *f. soralifera*, *Usnea florida f. minutissima* и *Biatora symmicta*. Присутствіе сравнительно большихъ сосенъ, скоро отмирающихъ (Юрьевъ л. с. 74) и дающихъ сухостой, пока его не поглотитъ моховой коверъ, прибавляетъ еще нѣсколько видовъ, особенно свойственныхъ обработанному или просто лишенному коры дереву. На такихъ сухихъ соснахъ съ отвалившейся корой много *Acolium viridescens*, *Biatora symmicta* и *Usnea florida f. minutissima*.

4. Лишайниковая формація типа *Sphagnetum betulo-caricosum*.

М. Юрьевъ объ этомъ типѣ болота не говоритъ вовсе. Несомнѣно, что такой типъ по своему названію можно отождествить съ *Betuleto-caricetum* у В. Сукачева²⁾. Въ этомъ типѣ по списку и описанію Сукачева до того развита травянистая растительность, что становится понятнымъ полное отсутствіе чисто почвенныхъ видовъ лишайниковъ въ сборахъ Какса изъ этой болотной формаціи. Что же касается древеснаго субстрата, то, повидимому, здѣсь попадается только береза или незначительная примѣсь сосны, такъ какъ и Каксъ, и Юрьевъ выделяютъ особую формацію изъ березъ съ сосной — *Sph. betulo-pinosum*, описаніе которой я опускаю благодаря неполнымъ сборамъ.

Почвенная формація лишайниковъ болота такого типа находитъ себѣ пристанище только на нѣкоторыхъ кочкахъ, лишенныхъ еще густой растительности, и на мало заросшихъ пняхъ. Здѣсь можно пайти главнымъ образомъ разные виды *Cladonia*. По коллекціи Какса это будутъ: *Cladonia cenotea var. exaltata*, *Cl. deformis*, *Cl. gracilis*, *Cl. cornuta*, *Cl. furcata* и *Cl. macilenta*; кромѣ того на одномъ сосновомъ пнѣ найдена *Ochrolechia pallescens*.

1) В. П. Савичъ, л. с. стр. 128.

2) В. Сукачевъ, л. с. стр. 187.

Низовая формація развита очень слабо, такъ какъ полукустарниковъ нѣтъ, а высокая травяная растительность часто закрываетъ внизу стволы деревьевъ, но на деревьяхъ, на кочкахъ или вообще на открытыхъ мѣстахъ попадаются образчики *Parmelia ambigua* и *Cetraria aleurites*, а на горѣлыхъ нияхъ и стволахъ много *Psora ostreata*, которая должна быть отнесена къ этой формаціи, хотя можетъ попадаться и на почвѣ.

Стволовая формація, развивающаяся на березахъ, довольно сильно отличается отъ флоры лишайниковъ на соснахъ. Здѣсь, кромѣ *Parmelia physodes* и *Usnea florida*, особенно развиты: *Parmelia olivacea*, *Xanthoria polycarpa*, *Ramalina dilacerata*, *Parmelia tubulosa*, *Lecanora varia* и *L. angulosa*. На найденныхъ сухихъ стволахъ, обнаженныхъ отъ коры сосенъ, внизу селится *Parmelia aleurites*, а выше всюду *Lecanora varia* и *Acolium viridescens*; на горѣлыхъ шияхъ, какъ я уже указалъ, *Psora ostreata*.

Въ заключеніе, обращаюсь съ просьбой ко всѣмъ тѣмъ изслѣдователямъ торфяныхъ болотъ, которые пожелаютъ передать мнѣ для обработки собранныя ими коллекціи лишайниковъ изъ разныхъ торфяниковыхъ типовъ, снабжать свои сборы замѣтками изъ наблюдений примѣнительно къ моему способу описанія торфяныхъ формацій лишайниковъ. Такая замѣтка будетъ состоять всего изъ нѣсколькихъ словъ и содержать отвѣты хотя бы только на четыре главныхъ вопроса: 1) въ какомъ типѣ торфяного болота (примѣнительно къ терминологіи Юрѣва или Сукачева)? 2) въ какой лишайниковой формаціи (примѣнительно къ моей терминологіи)? 3) интенсивность распространенія? и 4) на какомъ субстратѣ? При такомъ условіи можно будетъ связать цѣлый рядъ наблюдений, возможны сравненія и, слѣдовательно, полное изученіе интересныхъ формацій лишайниковъ торфяныхъ болотъ.

1 / XII 1913 г.

Институтъ споровыхъ растений Императорскаго
Ботаническаго Сада Петра Великаго.

II. Списокъ собранныхъ А. Р. Наксомъ лишайниковъ.

*Parmeliaceae*¹⁾.

1. *Usnea florida* (L.) Hoffm.

На *Pinus sylvestris*. Стерильно.

Лѣсъ хутора Каськово.

1) Въ этомъ и слѣдующихъ семействахъ, гдѣ вслѣдъ за видовымъ названіемъ нѣтъ ссылки на авторскія работы — слѣдуетъ подразумѣвать „Флору Лип. Средней Россіи“ Еленкина, вып. 1—4.

Var. hirta (L.) Hoffm.

На *Pinus sylvestris* въ формациі *Sphagnetum nano-pinosum*.
f. *minutissima* Mer.

Мережковский, Липи. окрестн. Ревеля, 1909, стр. 10.

Слоевище не болѣе двухъ сантиметровъ длиннѣе. На оголенной древесинѣ стволовъ сосны въ формациі *Sphagnetum magno-pinosum*.

2. Usnea barbata (L.) Hoffm.

Стерильные образчики до 46 сантиметровъ длиннѣе.

Лѣсъ хутора Каськово и заболоченный лѣсъ у деревни Квашня.

3. Bryopogon chalybeiforme (L.) Elenk.

Нити слоевища слабо окрашены, напоминая нити *B. implexum*, но не даютъ реакціи съ фѣдимъ кали. Стерильно.

На ели въ заболоченномъ лѣсу у деревни Квашня.

4. Bryopogon implexum (Hoffm.) Elenk.

Нити свѣтлыя, отъ КОН желтѣютъ. Стерильно.

На ели въ заболоченномъ лѣсу у деревни Квашня.

5. Ramalina thrausta (Ach.) Nyl.

Слоевище до 30 сантиметровъ длиннѣе съ хорошо развитыми соредіями. Стерильно.

На еляхъ у дер. Квашня и у дер. Юхова.

6. Ramalina dilacerata Hoffm.

Небольшой, плодоносный, типичный кустикъ.

На березахъ въ формациі *Sphagnetum betulo-caricosum*.

7. Evernia prunastri (L.) Ach.

Стерильно. Типичные образчики на соснахъ въ формациі *Sphagnetum nano-pinosum* и на заростающемъ мѣ въ формациі *Sphagnetum vagino-criophorosum*.

8. Evernia thamnodes (Flot.) Arn.

По свидѣтельству *Какса*, этотъ лишайникъ встрѣчается довольно часто въ формациі *Sphagnetum nano-pinosum*, на вѣтвяхъ сосенъ, почти всегда съ *Usnea florida*, но въ другихъ формацияхъ рѣже.

9. Evernia furfuracea (L.) Mann.

Есть очень интересные кустистые образчики (формациі *Sphagnetum magno-pinosum*) изъ большихъ, плотныхъ подушекъ, имѣющихъ тонкія скученныя вѣтви, отдаленно напоминающая нѣкоторыя формы оленьяго лишая. У испробованныхъ образчиковъ слоевище желтѣло отъ КОН и не мѣнялось отъ $\text{CaCl}_2 \text{ O}_2$. Въ формацияхъ: *Sphagnetum nano-pinosum* и *magno-pinosum* на стволахъ сосенъ. Стерильно.

Var. soralifera Bitter, *Zopf* въ „Beihefte Bot. Centrblt.“ 1903,

13. XIV, стр. 108. Стерильно. Сорали очень развиты. Въ формациі *Sphagnetum magno-pinosum* на соснѣ.

10. *Cetraria islandica* (L.) Ach.

f. *maculata* (Wain.) Saviez въ Извѣст. Имп. СПб. Бот. Сада 1911, № 3, стр. 84. Стерильно. Слабо распространенъ. Въ формациі *Sphagnetum nano-pinosum*.

Кромѣ того есть много образчиковъ, приближающихся къ f. *vagans* Saviez, свободно живущихъ на ковръ торфяного мха, но всѣ они имѣютъ ограниченное число лопастей и поэтому не образуютъ типичныхъ шариковъ, какъ это имѣетъ мѣсто у формъ, обитающихъ на сыпучихъ пескахъ. Найдены въ той-же формациі.

11. *Cetraria hiascens* (Fr.) Th. Fr.

f. *dilatata* (Wain.) Saviez. Лиш. собр. Поле на крайн. сѣв. Европ. Россіи. „Труды Имп. СПб. Бот. Сада“, т. XXXII, стр. 26.

f. *fastigiata* (Del.) Saviez. (Ibid.).

Обѣ формы въ большомъ количествѣ. Плодоносно.

Какъ констатируетъ: „Лишайникъ распространенъ исключительно въ формациі *Sphagnetum nano-pinosum* по мелкимъ кочкамъ около шейхеріевыхъ низинъ, въ которыхъ *Sphagnum* совершенно погнѣ, гдѣ обитаетъ также *Cladonia squamosa*. Только изрѣдка *Cetraria hiascens* находится и среди ковра *Sphagnum* вмѣстѣ съ *Cladonia rangiferina*.“

12. *Cetraria aleurites* (Ach.) Th. Fr.

По Каксу: „Лишайникъ, очень распространенный на корѣ ствола и вѣтвей сосны въ тѣхъ болотныхъ формацияхъ, гдѣ она есть. Плодоношеніе рѣдко и наблюдается оно только при поселеніи лишайника на горизонтальномъ субстратѣ“.

Собрано въ формацияхъ: *Sphagnetum magno-pinosum* и *Sphagnetum betulo-caricosum*.

13. *Cetraria saepincola* (Ehrh.) Ach.

Собрано очень много. Всѣ съ апотеціями.

По Каксу: „Очень характерный лишайникъ для формациі *Sphagnetum nano-pinosum*, гдѣ торчація изъ мха вѣтви сосны, *Lyonia* и *Ledum* покрыты сплошь этимъ лишайникомъ“.

Собранъ на *Pinus* и *Lyonia* въ упомянутой формациі.

14. *Cetraria caperata* (L.) Wain.

Образчики стерильны, мелкочешуйчаты, скученные, желтые и сильно соредіозные. Имѣется замѣтка Какса: „мало распространенъ“.

15. *Parmelia sulcata* Tayl.

Стерильно. Типично. Собрано мало.

Въ формациі *Sphagnetum nano-pinosum*.

16. *Parmelia cylisphora* (Ach.) Wain.

Стерильно. На *Alnus glutinosa* въ *Alnetum* у дер. Юхова.

17. *Parmelia perlata* (L.) Ach.

Очень хорошіе образчики. На *Alnus* и *Populus tremula* у хутора Каськово и у дер. Ростанное.

18. *Parmelia olivacea* (L.) Ach.

Съ апотеціями. По *Каксу*: „Въ данной формациі очень характерный и также весьма распространенный видъ на березѣ“.

Собранъ въ формациі *Sphagnetum betulo-caricosum*.

19. *Parmelia subaurifera* Nyl.

Стерильно. Въ формациі *Sphagnetum nano-pinosum*.

20. *Parmelia ambigua* (Wulf.) Ach.

По *Каксу*: „Лишайникъ очень распространенный на соснѣ, мелкихъ кустарникахъ (*Lyonia*, *Ledum*), но всегда безъ плодоношенія, плодоноситъ лишь въ томъ случаѣ, когда слоевище обитаетъ на горизонтальной поверхности субстрата, что является какъ бы закономъ и на что указывается и другими лишенологами¹⁾; тоже самое можно сказать и о *Cetraria aleurites*“.

Въ формациі *Sphagnetum nano-pinosum*.

21. *Parmelia physodes* (L.) Ach.

Большей частью стерильная форма f. *labrosa* Ach.

На *Pinus* въ формациі *Sphagnetum nano-pinosum*.

22. *Parmelia duplicata* (Sm.) Ach.

Образчики не типичны, мелки и съ переходами къ *P. physodes*.

На берегахъ у хутора Каськово.

23. *Parmelia tubulosa* (Schaer.) Bitter.

По *Каксу*: „встрѣчается во всѣхъ болотныхъ формацияхъ на деревьяхъ, но не часто. По большей части обитаетъ на вѣтвяхъ“.

Собрано въ формациі *Sphagnetum magno-pinosum* и *Sphagnetum betulo-caricosum*.

24. *Menegazzia pertusa* (Sehrank.) Stein.

Рѣдкій лишайникъ, насчитывающій пока очень мало мѣсто-нахожденій въ Европ. Россіи. Типично.

Собрано на березѣ въ еловомъ лѣсу хутора Каськово, им. Цевло.

Lecanoraceae.

25. *Lecanora angulosa* (Schreb.) Ach.

Немного въ формациі *Sphagnetum betulo-caricosum*, на березѣ.

26. *Lecanora coilocarpa* (Ach.) Nyl.

Var. *pinastri* (Ach.) Elenk.

На мелкихъ сосновыхъ вѣточкахъ. Нѣкоторые апотеціи имѣютъ сильно черноватый дискъ.

1) В. П. Савичъ, „Изъ жизни Лиш. Петербургск. губ.“ въ Труд. Имп. СПб. Общ. Ест., Т. XL, 1909, ч. 4, вып. 2, стр. 128.

Въ *Sphagnetum nano-pinosum* и *Sphagnetum magno-pinosum*.

27. *Lecanora varia* (Ehrh.) Ach.

Апотеціи скучены, блѣдныя.

Въ формациі *Sphagnetum betulo-caricosum*.

28. *Lecanora albella* (Pers.) Ach.

Типичныя, хорошія образчики. Длина корки слоевища 11 сантим. и ширина до 5 сантим. Апотеціи съ густымъ бѣлымъ налетомъ, розоватыя, чуть выпуклыя, теряющія края. Слоевище сѣро-бѣловатое, желтыхъ участковъ мало.

На ольхѣ въ лѣсу хутора Каськово у им. Цевло.

29. *Ochrolechia pallescens* (L.) Darbish.

У однихъ образчиковъ слоевище толстое, апотеціи до 2 мм. діам., скученныя, крепулированныя. Отъ КОН вмѣстѣ съ $\text{Ca Cl}_2 \text{ O}_2$ слоевище не мѣняется, края апотеціевъ также, а дискъ краснѣть. Образчики походятъ на *Ochrolechia parella* (L.) Mass. и видомъ, и реакціей. Не разъ мнѣ приходилось замѣчать, насколько реакція на край непостоянна и не характерна: поэтому я ей не придаю никакого значенія въ этомъ случаѣ. Гораздо важнѣе обратить вниманіе въ данномъ случаѣ на субстратъ, которымъ является древесина стараго пня сосны.

Другіе образчики съ коры осины типичны. Слоевище тонкое, апотеціи рѣдкія 1—2 мм., круглыя, съ густымъ налетомъ. Реакціи типичны.

Первыя въ *Sphagnetum betulo-caricosum*, а вторыя въ лѣсу хутора Каськово.

Theloschistaceae.

30. *Xanthoria polycarpa* (Ehrh.) Wain.

Спores 6—8 μ , ширины и до 15 μ , длины. Слоевища оранжевыя и зеленоватыя.

На березахъ въ формациі *Sphagnetum betulo-caricosum*. Рѣдокъ, по наблюденіямъ Какса.

Lecideaceae.

31. *Icmadophila ericetorum* (L.) Zahlbrk.

Найденъ Каксомъ одинъ разъ и, по словамъ послѣдняго, встрѣчается на Полнатовскихъ болотахъ рѣдко. Собранъ съ гнилого пня сосны близъ дер. Юхова.

32. *Bacidia fuscicornubella* (Hoffm.) Arn.

Var. *phaea* Th. Fr.

Спores до 50 μ , длины, но много молодыхъ мельче. КОН + Въ лѣсу хут. Каськово, им. Цевло, на осинѣ.

33. *Psora ostreata* Hoffm.

На обгорѣломъ сосновомъ пнѣ близъ Хлавицы и въ формациі *Sphagnetum betulo-caricosum*. Типично.

34. *Biatora symmicta* (Ach.) Elenk.

Въ формациі *Sphagnetum magno-pinosum* на корѣ сосны.

Cladoniaceae.

35. *Cladonia sylvatica* (L.) Hoffm.

Очень интересные болотные образчики. Подеціи достигаютъ до 10 сантиметровъ высоты, причемъ живая часть около 3—4 сантим., остальная же отмершая, и расла заката среди мха *Sphagnum*. Дерновинки очень плотныя.

Въ формациі *Sphagnetum nano-pinosum*.

36. *Cladonia rangiferina* (L.) Web.

Въ торфяныхъ болотахъ достигаетъ, какъ я уже писалъ, наибольшей величины изъ всѣхъ разновидностей „оленьяго лишая“. Образчики *Какса* высотой отъ 16 до 40 сантиметровъ, живая же часть лишь 3—5 сантиметровъ, остальная бóльшая часть погребена среди *Sphagnum*. Подеціи выше изъ бѣловатыхъ и черпватыхъ участковъ.

Въ формациі *Sphagnetum nano-pinosum*.

37. *Cladonia alpestris* (L.) Rabenh.

И этотъ „олений лишай“ достигаетъ значительной величины и даже бóльшей чѣмъ *Cl. sylvatica*. Его подеціи въ коллекціи *Какса* отъ 17 до 25 сантим. высотой, причемъ живая верхняя часть у этого вида нѣсколько бóльшая, 5—6 сантим., при переходной зонѣ въ 3 сантим., по все же на погруженную въ *Sphagnum* мертвую часть приходится до 16 сантим. Головки — тирсы растущей на болотахъ *Cl. alpestris* очень развиты и достигаютъ въ данныхъ образчикахъ 3—4½ сантим. ширины. Живая часть желтовато-зеленоватая, мертвая сѣроватая.

Въ *Sphagnetum nano-pinosum*.

38. *Cladonia macilenta* Hoffm.

КОН +. Подеціи зеленовато-середіозныя. Плодоносно.

Въ формациі *Sphagnetum nano-pinosum*, на пнѣ и въ формациі *Sph. magno-pinosum*.

Var. *corticata* Wain.

КОН +. Подеціи съ развитой корой, но середіозныя.

Въ формациі *Sphagnetum magno-pinosum*, берега оз. Дулова.

39. *Cladonia deformis* Hoffm.

Типично. Въ формациі *Sphagnetum nano-pinosum*, *magno-pinosum* и *betulo caricosum*. Съ апотеціями.

40. *Cladonia furcata* (Huds.) Schrad.

Var. *racemosa* (Hoffm.) Flk.

Подетіи сильно вѣтвисты, сѣровато-зеленоватыя; верхушки коричневатыя. Есть и съ апотеціями.

На кочкахъ въ полость смѣны *Нурпун'а* — *Sphagnum* о́мъ у дер. Перебиня и въ *Sphagnetum betulo-caricosum*.

41. *Cladonia crispata* (Ach.) Flot.

Типично. Въ формации *Sphagnetum nano-pinosum*.

42. *Cladonia squamosa* (Scop.) Hoffm.

Var. denticollis (Hoffm.) Flk.

Интересная находка для торфяного болота, да еще и въ огромномъ количествѣ. По *Каксу*: „Въ формации *Sphagnetum nano-pinosum*, по мѣстамъ съ погибшимъ *Sphagnum* на небольшихъ возвышеніяхъ, часто на отмершихъ остаткахъ *Eriophorum*, рѣже въ *Sphagnum*’ѣ.“ Также на мелкихъ кочкахъ по шейхцеріевымъ низинамъ безъ *Sphagnum* (вѣроятно изъ отмершихъ *Eriophorum*, о которыхъ говоритъ *Каксъ* выше).

Var. muricella (Del.) Wain.

Въ *Sphagnetum nano-pinosum*. Встрѣчается вмѣстѣ съ типомъ. Подетіи не кубковидны.

43. *Cladonia gracilis* (L.) Willd.

Var. dilatata (Hoffm.) Wain.

Въ формации *Sphagnetum betulo-caricosum*. Типично.

44. *Cladonia cornuta* (L.) Schaer.

Въ формации *Sphagnetum betulo-caricosum*. Типично.

45. *Cladonia fimbriata* (L.) Fr.

Var. simplex (Weis.) Flot.

Типично. Побережье оз. Дулово.

46. *Cladonia cenotea* (Ach.) Schaer.

Var. crossota (Ach.) Nyl.

Въ *Alnetum* близъ дер. Староселье.

Var. exaltata Nyl.

Среди *Polytrichum* въ формации *Sphagnetum betulo-caricosum*.

Buelliaceae.

47. *Buellia disciformis* (Fr.) Br. et Rostr.

Elenkin, Lich. fl. Rossiae, fasc. I, p. 92.

Var. major (Mass.) De-Not.

Образчики дали красную реакцію слоевища съ КОН, что интересно отмѣтить, т. к. я получилъ ее впервые за шесть лѣтъ, хотя не разъ имѣлъ дѣло съ образчиками, по вѣсѣмъ другимъ признакамъ принадлежащими къ *v. major*. На *Sorbus aucuparia* въ лѣсу хутора Каськово.

Peltigeraceae *).**48. Peltigera canina (L.) Schaer.**

На гшломъ нѣтъ осины, типично. У хутора Каськово.

49. Peltigera erumpens (Tayl.) Wain.

Elenkin, Lich. fl. Rossiae, fasc. IV, p. 151.

Діаметръ чешуй слоевища 6—7 mm. На *Sphagnum* въ формациі *Sphagnetum magno-pinosum*.

50. Peltigera polydactyla Hoffm.

Образчики листичины съ слабо блестящей верхней поверхностью или мѣстами совсѣмъ не блестящей. Жилки черноватая съ черноватыми волокнистыми ризоидами, края снизу коричневатая съ короткими ризоидами. Волокнистости и сляпія жилокъ, какъ у *P. malacea*, нѣтъ; нѣтъ также паутинистаго верха и всюду бѣлой нижней поверхности, какъ у *P. rufescens*, да и лопасти широко округлая, а не узкая какъ у послѣдней.

На *Sphagnum* въ формациі *Sphagnetum magno-pinosum*.

Collemaeeae.**51. Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl.**

Th. Fries, Lich. Arctoi p. 282.

На *Populus tremula* у хут. Каськова, им. Цевло.

Graphidaceae.**52. Graphis scripta (L.) Ach.**

Elenkin, Lich. fl. Rossiae, fasc. III, p. 127.

На *Sorbus aucuparia* у хутора Каськово. Нѣкоторые апотеціи достигаютъ 8 mm. длиною. Болѣе мелкіе на стволахъ ели и березы.

Arthoniaceae.**53. Arthonia radiata (Pers.) Ach.**

Elenkin, Lich. fl. Rossiae, fasc. III, p. 127.

На *Sorbus aucuparia* въ лѣсу у хутора Каськово им. Цевло.

Caliciaceae.**54. Acolium viridescens (Liljehl.) Wain.**

Elenkin, Ross. Med. I, p. 17.

На оголенной древесинѣ старыхъ стволовъ *Pinus silvestris* въ формациі *Sphagnetum magno-pinosum*, а также и въ *Sph. betulo-caricosum*. Типично. Собрано очень много.

*) По *Th. Fries*, Lich. Arctoi.

V. P. Savicz.

Zum Studium der Flechten und der Flechtenformationen im östl. Sumpfgebiet des Gouv. Pskow.

(Résumé.)

Verfasser bearbeitete die Flechtenkollektion des Herrn A. R. Raks aus dem Sumpfgebiet des Gouv. Pskow und beschreibt auf Grund dieser Kollektion und der Notizen des Sammlers die Flechtenformationen in einigen Torfmoortypen. Verfasser unterscheidet in jedem Typus der Torfmoore 3 Flechtenformationen: Eine — auf Torf oder Sphagnum-Teppich — Bodenformation; die andere — unter Baumstämmen und auf Halbsträuchern (Ledum, Cassandra, Andromeda) — Niederungsformation; die dritte — auf Baumstämmen — Baumstammformation.

Solche Formationen beschrieb Verfasser für folgende Torfmoortypen¹⁾: Sphagnetum vagino-eriphorum, Sphagnetum nano-pinosum, Sphagnetum magno-pinosum und Sphagnetum betulo-caricosum. Besonders vollständig und interessant ist die Beschreibung der Flechten von der Formation des Sphagnetum nano-pinosum. Sie sind wie folgt:

Bodenformation: Inmitten des Sphagnum befindet sich Cladonia rangiferina, Cl. sylvatica und Cl. alpestris, wobei sie mit dem heranwachsenden Sphagnum um's Dasein kämpfen und dabei, bei sehr unbedeutenden lebenden oberen Teil, selbst gigantische Dimensionen annehmen. Auf dem Sphagnum, auf Hümpeln befindet sich viel Cetraria hiascens f. dilatata und f. fastigiata, Cladonia squamosa var. denticollis und var. muricella; unbedeutend Cetraria islandica f. maculata und Cladonia crispata. Sodann ist überall zerstreut die frei wachsende Cetraria islandica f. vagans. Die Niederungsformation besteht aus Parmelia ambigua, Cetraria aleurites, C. saepincola und der hier wenig verbreiteten

1) Terminologie nach: M. Juriëff, „Zu der Frage von dem gegenseit. Abhängen d. Wuchses des Sphagnum-Teppichs und der Kieler“ in Travaux d. Soc. Scient. des Etudiants de la fac. nat. et mathem. à l'Univ. St. Pétersbourg. 1911, Livr. III, p. 67—88.

W. Sukatschew, „Ueber die Torfmoore des russischen Seegebietes“ in Berichte d. biolog. Süßwasserstation der Kaiserl. Naturforsch. Gesellschaft in St. Petersburg, B. II., 1906, p. 161—262.

Cetraria caperata. Die Baumstammformation, welche sich auf Kiefern entwickelt, ist dicht besetzt von *Parmelia physodes* f. *labrosa*, *Usnea florida* (meist var. *hirta*), wenig *Parmelia sulcata*, hiernach vermischt *Evernia prunastri*, *E. furfuracea*, *E. thamnodes*, auf Aesten hauptsächlich *Parmelia olivacea*, *P. tubulosa*, *P. subaurifera*. Sodann tragen alle kleine Aestchen *Lecanora coilocarpa* v. *pinastri* und öfters auf herabhängenden Aesten *Cetraria saepincola*. Desgleichen wurden auch Flechtenformationen der übrigen aufgezählten Moortypen beschrieben, soweit es eben die Sammlungen A. R. Kaks gestatten.

ИЗВѢСТІЯ

ИМПЕРАТОРСКАГО Ботаническаго Сада ПЕТРА ВЕЛИКАГО.

Начиная съ 1914 года объемъ „Извѣстій“ значительно увеличивается (приблизительно до 40 листовъ). „Извѣстія“ будутъ выходить въ числѣ 6 выпусковъ въ годъ съ необходимыми таблицами, рисунками и приложеніями.

Годовая цѣна 3 руб., для заграницы 8 марокъ или 10 франковъ.

Въ „Извѣстіяхъ“ помѣщаются: 1) оригинальныя работы по всѣмъ отдѣламъ ботаники, раньше нигдѣ не напечатанныя; 2) критическіе рефераты; 3) библіографія; 4) хроника.

Статьи принимаются объемомъ до 2—3 печатныхъ листовъ, написанныя по-русски и снабженныя краткимъ резюмѣ на французскомъ или нѣмецкомъ языкахъ. Статьи, превышающія этотъ объемъ, печатаются въ „Приложеніяхъ“ къ журналу.

Авторы получаютъ бесплатно до 50 отдѣльныхъ отписковъ.

„Извѣстія“ выходятъ подъ общей редакціей Директора Сада засл. проф. А. А. Фисшера фонъ-Вальдгейма.

Редакторами же отдѣловъ состоятъ слѣдующія лица:

- | | | |
|---|-----------|-------------------|
| 1) Систематика и географія цвѣтковыхъ . . . | редакторъ | Б. А. Федченко. |
| 2) Систематика, морфологія и біологія споровыхъ . . . | „ | А. А. Еленкинъ. |
| 3) Анатомія и фзіологія . . . | „ | Н. А. Монтеверде. |
| 4) Морфологія общая и экспериментальная . . . | „ | В. Л. Комаровъ. |
| 5) Вопросы „симбіоза“ . . . | „ | А. А. Еленкинъ. |

BULLETIN

du Jardin IMPÉRIAL Botanique de PIERRE le GRAND.

A partir de l'année 1914 les dimensions du „Bulletin“ seront considérablement augmentées (à peu-près jusqu'à 40 feuilles d'impression); il paraîtra en six fascicules par an, avec planches et figures nécessaires, et sera suivi de suppléments.

Le prix de l'abonnement est de 3 roubles par an, et pour l'étranger de 8 mares ou de 10 francs.

Le „Bulletin“ publiera: 1) des travaux originaux qui n'ont pas encore paru ailleurs, se rapportant à toutes les branches de la botanique; 2) des analyses critiques; 3) des notices bibliographiques; 4) une chronique du Jardin.

Les articles à publier ne devront pas dépasser 2—3 feuilles d'impression. Ils doivent être écrits en russe et suivis d'un court résumé en français ou en allemand. Les articles dépassant les dimensions indiquées seront imprimés dans les „Suppléments“ du journal.

Les auteurs reçoivent gratis 50 tirés à part de leurs articles.

Le „Bulletin“ paraîtra sous la rédaction en chef du Directeur du Jardin А. А. Fischer de Waldheim.

Les rédacteurs des sections seront:

- | | | |
|--|-----------|-------------------|
| 1) Systématique et géographie des plantes phanérogames . . . | rédaeteur | В. А. Федтченко. |
| 2) Systématique, morphologie et biologie des plantes cryptogames . . . | „ | А. А. Еленкинъ. |
| 3) Anatomie et physiologie . . . | „ | Н. А. Монтеверде. |
| 4) Morphologie générale et expérimentale . . . | „ | В. Л. Комаровъ. |
| 5) Questions de „symbiose“ . . . | „ | А. А. Еленкинъ. |



New York Botanical Garden Library



3 5185 00262 9440

